



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ БЕЛКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6374—66

Издание официальное

БЗ 5—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ШКУРКИ БЕЛКИ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Undressed squirrel skins.
SpecificationsГОСТ
6374—66*Взамен
ГОСТ 6374—52

Дата введения 01.07.67

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол З—93 от 17.02.93).

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белки — зверька из отряда грызунов, семейства беличьих.

2. Зимние шкурки белки имеют волосяной покров хребта и боков серого цвета различной темноты, иногда с наличием коричневой или рыжеватой полосы по хребту, черево — белое, за исключением кавказской белки, у которой оно рыжевато-желтое, а хребет — черно-бурый. Хвост — черного, черно-серого, серого, бурого (темно- или светло-бурового) или ярко-рыжеватого цветов.

3. Шкурки белки должны быть сняты трубкой с размером по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей из лап и хвоста, жировых отложений, грязи и крови с мездры и волоса; оправлены узкой трубкой мездрай наружу и законсервированы пресно-сухим способом.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения шкурки белки подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Кряжи | Главные районы распространения | Характеристика волосяного покрова и мездры |
|-------------|---|---|
| 1. Якутский | Якутская АССР, кроме девяти юго-западных районов, указанных в Ленском кряже (см. п. 5 табл. 1); Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, | Волосяной покров особо пышный и шелковистый, преимущественно темно-серой окраски, с голубоватым или пепельным оттенком вдоль хребта. Черево с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные. |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1993 г.) с изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1973 г., августе 1988 г. (ИУС 10—73, 12—88).

© Издательство стандартов, 1993

С. 2 ГОСТ 6374—66

Продолжение табл. I

| Кряжи | Главные районы распространения | Характеристика волосяного покрова и мездры |
|------------------|--|--|
| | имени Полины Осипенко, Тугуро-Чуминский, Ульческий районы Хабаровского края; Магаданская, Камчатская и Сахалинская области; Джелтулакский, Зейский районы Амурской области; Каларский и Тунгиро-Олекминский районы Читинской области | Хвосты различной окраски. Мездра плотная, эластичная |
| 2. Забайкальский | Бурятская АССР; Читинская область, кроме районов, указанных в Якутском кряже (см. п. 1 табл. I) | Волосяной покров пышный, грубоватый, преимущественно темно-серой окраски с буровато-красным оттенком, часто с резко выраженной коричневой полосой вдоль хребта. Черево с узкой ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная, грубоватая |
| 3. Амурский | Приморский, Хабаровский края и Амурская область, кроме районов, указанных в Якутском кряже (см. п. 1 табл. I) | Волосяной покров пышный, грубоватый. Окраска хребта темно-пепельного, серого цвета с легким буроватым налетом. Хвосты различной окраски. Мездра плотная. |
| 4. Енисейский | Красноярский край; Кемеровская, Томская, Новосибирская области | Волосяной покров пышный, менее шелковистый, светло-серо-голубой или темно-голубой окраски. Хвосты различной окраски. Мездра плотная |
| 5. Ленский | Иркутская область; Вилуйский, Верхне-Вилуйский, Горный, Ко-бяйский, Ленский, Ленинский, Олекминский, Орджоникидзевский, Сунтарский районы Якутской АССР | Волосяной покров пышный, средней шелковистости, серо-голубой и пепельно-серой окраски с голубоватым оттенком; встречаются шкурки с коричневатым налетом вдоль хребта. Черево с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная |
| 6. Алтайский | Горно-Алтайская автономная область - Алтайского края; Восточно-Казахстанская область Казахской ССР | Волосяной покров средней пышности и шелковистости, темно-серой окраски с буроватым или серой с голубоватым оттенком, иногда с коричневато-бурым налетом вдоль хребта; окраска захватывает и пух. Черево с узкой, резко ограниченной белой полосой; паха темные. Хвосты различной окраски. Мездра плотная |

Продолжение табл. 1

| Кряжин | Главные районы распространения | Характеристика волосяного покрова и мездры |
|-----------------------|---|--|
| 7. Обский | Тюменская и Омская области | Волосяной покров пышный, но мало шелковистый светло-серой и серой окраски с голубоватым оттенком; иногда с желтоватым налетом на хребте. Черево с широкой, не резко ограниченной белой полоской; паха белые. Хвосты различной окраски. Мездра плотная |
| 8. Северо-европейский | Башкирская АССР; Удмуртская АССР; Марийская АССР; Чувашская АССР; Татарская АССР; Мордовская АССР; Карельская АССР; Коми АССР; Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Кировская, Пермская, Куйбышевская, Ульяновская, Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Горьковская, Ленинградская, Новгородская и Калининская области | Волосяной покров средней пышности и мягкости, светло-серой и серой окраски, с голубоватым или буроватым оттенком, часто с коричневой полосой на хребте. Черево с широкой белой полосой; паха белые. Хвосты различной окраски. Мездра средней плотности |
| 9. Центральный | Калининградская, Псковская, Ярославская, Воронежская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Московская, Рязанская, Пензенская, Смоленская, Орловская, Курская, Тамбовская, Тульская и Брянская области, Эстонская ССР, Литовская ССР, Латвийская ССР, Белорусская ССР, Украинская ССР, Молдавская ССР | Волосяной покров малой пышности, грубоватый, серой окраски с буроватым оттенком, преимущественно с узкой рыжей полосой на хребте и пепельно-серой окраски с сильным рыжевато-красным оттенком, преимущественно с широкой красной полосой на хребте, окраска захватывает и пух. Черево с широкой желтовато-белой полосой; паха белые. Хвост бурой или ярко-рыжей окраски. Мездра плотная. Кроме того, встречаются шкурки с волосяным покровом низким, редким, темно-серой окраски, с узкой белой полосой на череве и черно-серым хвостом, а также шкурки черно-буровой окраски с ржаво-желтым черевом и ржаво-бурым хвостом |
| 10. Телеутка | Алтайский край, кроме Горно-Алтайской автономной области; Ка- | Волосяной покров очень пышный, но грубоватый, светло-серой окраски, иногда с желтоватым нале- |

С. 4 ГОСТ 6374—66

Продолжение табл. 1

| Кряжи | Главные районы распространения | Характеристика волосяного покрова и мездры |
|---------------|---|---|
| 11. Тувинский | захская ССР, кроме Восточно-Казахстанской области; Крымская и Курганская области; Грузинская ССР и северные районы Киргизской ССР Тувинская АССР | том на хребте. Черево с широкой белой полосой; паха белые. Хвост серой, редко — ярко-рыжей окраски. Мездра плотная. Размеры шкурок особо крупные. |

Причесание. Шкурки белки, добывшие в Закавказье, относят к Центральному кряжу.

Основным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)

5. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки белки подразделяют на сорта в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Сорта | Характеристика волосяного покрова и мездры |
|--------|---|
| Первый | Полноволосые, с развившимися направляющими и оставыми волосами, густым пухом. Мездра плотная, чистая. Допускается синева у передних лапок или на голове, или по бокам в виде двух бледно-синих узких полос, тянущихся от головы до задних лапок, иногда захватывающих и голову |
| Второй | Менее полноволосые, с недоразвившимися направляющими, оставыми и пуховыми волосами, главным образом на шейке и голове. Мездра плотная с легкой синевой по хребту или синяя до половины шкурки по верхней или нижней части хребта. Шкурки молодняка со слаборазвитыми остью и пухом; мездра тонкая, без синевы |
| Третий | Половолосые, с низким волосяным покровом. Мездра утолщенная, темно-синяя. Допускаются незначительные остатки летнего волоса от головы до передних лапок по хребту и значительные по череву от головы до задних лапок |

Причесания:

1. Ранневесенние полноволосые шкурки белки, но слегка перезрелые, с начиающим редеть волосяным покровом и суховатой мездрай без признаков синевы принимаются со скидкой 10% от стоимости первого сорта.

2. Наличие на хребте шкурки рыжеватой или коричневато-бурой полосы не понижает сортности шкурки.

6. В зависимости от наличия пороков шкурки белки подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Пороки | Группы дефектов | | |
|--|-----------------|-----------|--|
| | Малый | Средний | Большой |
| 1. Прострелы мелкой дробью на хребте, расположенные не кучно | 4—7 | 8—10 | 11—15 |
| 2. Прострелы мелкой дробью на хребте, расположенные кучно | Не допускаются | 4—7 | 8—10 |
| 3. Запекшаяся кровь на волосе* общей площадью в см ² | 5,0—10,0 | 10,1—20,0 | 20,1—30,0 |
| 4. Разрывы и швы по хребту общей длиной в см | 2,0—5,0 | 5,1—10,0 | Более 10 до однократной длины шкурки или разорванные поперек |
| 5. Плешины общей площадью в см ² | До 1 вкл. | 1,1—3,0 | 3,1—5,0 |
| 6. Дыры, прострелы пулей, вытертые места — пигментированные пятна на мездре** общей площадью в см ² | 0,4—2,0 | 2,1—4,0 | 4,1—8,0 |
| 7. Неправильная съемка | Снятые пластом | — | — |
| 8. Недостача частей шкурки | Головы с шеей | — | — |

* Кровь на волосе около места ранения, заметная со стороны мездры.

** Повреждения волосяного покрова, в результате которых со стороны мездры образовались синие пятна.

Примечание. Три прострела на череве учитывают как один на хребте.

7. На шкурках белки, относящихся к группе дефектов «малый», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурках, относящихся к группе дефектов «средний», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы, или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой

С. 6 ГОСТ 6374—66

группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний», или четырех пороков из группы дефектов «малый».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний», и двух пороков из группы дефектов «малый» шкурки переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки белки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», прелые, горелые, поврежденные молью и кожеодом, шкурки весенние перезрелые, со значительно поредевшими остью и пухом или в процессе явно выраженной линьки с выпадающим волосяным покровом, тонкой, сухой, морщинистой, желтоватой или с темными пятнами мездровой; летние с низким грубым, почти без пуха волосяным покровом, темно-синей или желтой сухой мездровой, раннеосенние, с начавшим развиваться зимним, но еще низким волосяным покровом на огузке и с летним волосяным покровом на остальной части шкурки относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. (Исключен, Изм. № 2).

10. Упаковка и маркировка шкурок белки должны производиться по ГОСТ 12266—89.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок белки в процентах к стоимости первого сорта
(рекомендованная Центросоюзом)

| Сорта | Нормальные | Группы дефектов | | |
|----------------------|------------|-----------------|---------|---------|
| | | Малый | Средний | Большой |
| Первый | 100,0 | 90,0 | 75,0 | 50,0 |
| Первый ранневесенний | 90,0 | 81,0 | 67,5 | 45,0 |
| Второй | 80,0 | 72,0 | 60,0 | 40,0 |
| Третий | 50,0 | 45,0 | 37,5 | 25,0 |

Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25% качества шкурок первого сорта группы дефектов «нормальная».

(Измененная редакция, Изм. № 2).