



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И КОРСАКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ, ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ГОСТ 14174—89

Издание официальное

Б3 9—89/766

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И
КОРСАКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ,
ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ

Технические условия

ГОСТ

14174—89

Undressed skins of fox and corsac fox
obtained by hunting Specifications

ОКП 98 7872, 98 7873 98 7874

Срок действия с 01.07.90
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки лисицы красной, черно-буровой, лисицы-крестовки, лисицы-сивушки и корсака.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки лисиц и корсака должны быть сняты трубкой, с разрезом, проходящим от фаланг пальцев задних конечностей к анальному отверстию по линии волосораздела черева и огузка, с сохранением меха головы (носиком и ушами), лап (с коготками) и хвоста, очищены от остатков мышечной, жировой ткани, сухожилий и хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; оправлены волосом наружу на правилках (приложение 1) и законсервированы пресно-сухим способом; лапы хорошо расправлены.

1.2. Шкурки лисицы красной характеризуются волосяным покровом на хребте и боках огненно-красного, бледно-алого, красно-серого, серого и светло-серого окраса. Черево красное, красно-серое, серебристое или темно-буровое.

1.3. Шкурки лисицы черно-буровой характеризуются волосяным покровом черного окраса различной интенсивности. Допускаются буроватый или бурый оттенки.

1.4. Шкурки лисицы-крестовки характеризуются волосяным покровом на хребте темно-серого окраса. На шее и плечах ярко выраженный темный крестообразный рисунок; черево и душка темно-серые; лапы темные или темно-серые, пух темно-голубой.

1.5. Шкурки лисицы-сиводушки характеризуются волосяным покровом на хребте и боках темно-бурого, темно-серого, красно-бурого и светло-бурого окраса серебристого оттенка, пух темно-голубой. На шее и лопатках имеется темный крестообразный рисунок; черево, душка, лапы темно-серые или темно-бурые.

1.6. Шкурки корсака характеризуются волосяным покровом на хребте и боках от серебристо-серого до красно-песочного, а на череве серебристо-серого окраса, пух светло-серый, светло-голубой или желто-песочный с различными оттенками.

1.7. Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки и корсака в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Характеристика волосяного покрова	Основные районы распространения
Лисица красная		
Камчатский	Пышный, плотный, шелковистый, слегка упругий, по окрасу огненно красный, красный, красно-серый, черево преимущественно красное, иногда с темно-бурым пятном, душка серебристая, пышная	Камчатская, Магаданская области, Хабаровский край, Аяно-Майский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Охотский, Ноглинский, Александрово-Сахалинский и Тымовский районы Якутская АССР
Якутский	Пышный, нежный, шелковистый, по окрасу преимущественно красный, черево красное обычно с большим темно-бурым пятном, душка серебристо-серая	
Сибирский	Пышный, шелковистый или менее шелковистый, по окрасу ярко красный, красный, светло-красный или алый, черево красное иногда с темным пятном, светло-красное, серебристо-серое или грязно-белое, душка белая, бело-голубая, светло-серая серебристая	Амурская, Иркутская, Читинская, Томская области, Тюменская область, кроме районов, расположенных к югу от линии Тюмень—Тара, Приморский, Красноярский край, Хабаровский край и Сахалинская область, кроме районов, указанных в Камчатском кряже, Бурятская и Тувинская АССР
Западно-Сибирский	Менее пышный, грубоватый, по окрасу алый или светло-алый, черево и душка бело-голубые или грязновато-белые, встречаются шкурки юго-восточных районов пышные, шелковистые и гривастые по окрасу	Алтайский край, Новосибирская, Омская, Кемеровская, Курганская, Тюменская (районы к югу от линии Тюмень—Гара) области, Казахская ССР, Кустанайская область — Федоровский, Джетыгаринский, Семиозерский и Кустанайский

Продолжение табл. 1

Наименование кряжа	Характеристика воло-сияного покрова	Основные районы распространения
Северный	светло-алые или светло персиковые	районы, Тургайская область — Джанғылдинский и Амангельдинский районы; Северо-Казахстанская область — Пресновский, Союзовский, Булаевский, Ленинский и Советский районы, Кокчетавская область — Қызылтүсский, Энбекшильдерский, Қоқшатавский, Рузаевский, Арық-Балыкский и Шугинский районы
Центральный	Пышный, шелковистый или без шелковистости; по окрасу преимущественно красный, черево того же окраса, обычно с темным пятном, душка белая, лапы с широкой темной или черной полосой	Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Горьковская (районы, расположенные к северу от р. Волги), Кировская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, Карельская, Коми, Удмуртская АССР
Южный	Пышный или менее тышиный, грубоватый, по окрасу преимущественно красный или светло-красный черево красное, бледно-красное или белое, иногда с темным пятном, душка белая, лапы рыжие с темными полосами	Ленинградская, Калининская, Новгородская, Московская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Брянская, Псковская, Смоленская, Орловская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Тульская, Рязанская, Ульяновская, Куйбышевская, Оренбургская, Калининградская, Горьковская (районы, расположенные к югу от р. Волги) области, Эстонская, Латвийская, Литовская и Белорусская ССР, Марийская, Мордовская, Чувашская, Татарская, Башкирская АССР
Семипалатинский	Низкий грубый или высокий, но редковатый, по окрасу красный, красно-серый, алый, светло-серый или серый, серо-желтый, черево белое, грязно белое или красно-серое; душка белая или грязно белая, лапы различного окраса с черными или серыми полосами	Курская, Белгородская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестанская Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Калмыцкая, Северо-Осетинская АССР, Украинская, Молдавская, Грузинская, Азербайджанская, Армянская ССР
	Пышный, шелковистый и грибастый, по окрасу преимущественно светло-желтый или светло алый	Восточно-Казахстанская, Семипалатинская, Карагандинская (Шетский район) области Казахской ССР

Продолжение табл. 1

Наименование кряжа	Характеристика волосяного покрова	Основные районы распространения
Средне-Азиатский	Низкий, грубоватый или полугрубый, редкий, матовый или шелковистый; по окрасу красно-серый, серый, альный, светло-красный или бледно-желтый	Казахская ССР, кроме областей, указанных в Западно-Сибирском и Семипалатинском кряжах, Киргизская, Узбекская, Туркменская и Таджикская ССР
		Лисица-крестовка и лисица-сиводушка
Камчатский	Пышный, особенно на шейной части и у передних лап, шелковистый, ость длинная	Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Хабаровский край (Охотский район), Якутская АССР
Северо-Сибирский	Пышный, менее шелковистый, ость длинная	Все районы, кроме указанных в Камчатском и Южном кряжах
Южный	Низкий, грубый с остью, как бы подпаленной на концах, более низкий на хребте, чем на череве	Ставропольский край (горные районы), Чечено-Ингушская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская АССР, Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР
		Корсак
Казахский	Рослый, мягкий, серебристо-серого окраса; пух светло-серый или светло-голубой	Казахская ССР, Оренбургская, Куйбышевская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Читинская области, Алтайский край, Башкирская АССР
Астраханский	Низкий, грубый, серо-песочного или красно-песочного окраса	Все районы, кроме указанных в Казахском кряже

Примечания

- Основным показателем кряжа является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком
- Шкурки караганки относят к Средне-Азиатскому кряжу.

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки лисицы черно-буровой подразделяют на цвета в соответствии с требованиями табл. 2.

1.9. В зависимости от степени серебристости волосяного покрова шкурки лисицы черно-буровой подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 2

Цвет	Характеристика окраски волосяного покрова
I	Волосяной покров черный или темный с хорошо выраженной чисто-белой серебристостью, а также чистого светло-серебристого окраса с выраженной вуалью, но с легким коричневым оттенком. Пуховые волосы темно-серые или серые.
II	Волосяной покров темно-бурый, светло-серебристый без вуали (открытая серебристость) или светло-серебристый с буроватым оттенком. Пуховые волосы темно-серые или светло-серые

Таблица 3

Группа	Серебристость волосяного покрова к длине шкурки, %
1	Св. 90,0
2	Св. 60,0 до 90,0 включ.
3	Св. 30,0 до 60,0 включ.

1.10. Шкурки лисиц и корсака в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожевой ткани шкурок
Первый	Полноволосый, густой, с развившимися кроющими и пуховыми волосами. Кожевая ткань без синевы. Допускается легкая синева по всей площади шкурки.
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимися кроющими и пуховыми волосами, особенно по хребту. Кожевая ткань синеватая.
Третий	Половолосый, редковатый, со слабо развивающимися, низкими кроющими и пуховыми волосами. Кожевая ткань синяя.

Примечание. Шкурки лисицы черно-бурой относят только к первому и второму сортам.

1.11. Шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

Размерная категория	Длина шкурки, см	Ширина шкурки, оправленной трубкой, см
1	От 85,0 и более	Не менее 12,5
2	От 60,0 до 84,9	Не менее 12,5

1.12. В зависимости от наличия пороков шкурки лисиц и корсака подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями табл. 6.

Таблица 6

Название порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1 Разрывы и швы общей длиной, см	До 10,0 включ	Св 10,0 до 25,0 включ	Св 25,0 до 50,0 включ	Св 50,0 однократной длины шкурки или перерванные полоски
2 Дыры, вытерты места общей площадью, %	До 0,5 включ	Св 0,5 до 1,0 включ	Св 1,0 до 2,0 включ	Св 2,0 до 4,0 включ
3 Сквозной волос общей площадью к площади шкурки, %	До 1,0 включ	Св 1,0 до 3,0 включ	Св 3,0 до 20,0 включ	Св 20,0 до 50,0 включ
4 Плешины общего площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,5 включ	Св 1,5 до 2,5 включ
5 Признаки линьки	Не допускаются	Позднезимние шкурки со склека поредевшей остью на боках или плечах	Ранневесенние шкурки с передевшей остью на боках или плечах, с грубоватой кожевой тканью	Ранневесенние шкурки с передевшей остью на боках или плечах, с грубоватой кожевой тканью
6 Недостатча шкурки	Части	Не допускаются	Головы или хвоста	Вырезанного черева

Продолжение табл. 6

Наименование порока	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
7 Исправильная съемка и первичная обработка	Пс дончкаются и даются	Шкуры, снятые лом, плохо обезжирен- ные, плохое просушение легорные, мороженые, жидкие	Шкуры, линзы бутоны 1 и размешанный легорные с изрезанным волосяным покровом на боках и шейной части вследствие перетянуто- сти	Комовая сушка

П р и м е ч а н и я

- 1 Допускается ушивка редывов
- 2 Пороки на голове, лапах, шее, хвосте и череве оценивают не выше норм, установленных за недостачу этих частей
- 3 При различных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), оценивают один наибольший порок
- 4 Отсутствие белого конца хвоста («типа») пороком не считают
- 5 Характеристика пороков дана в приложении 2.

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья», или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.14. Оценку шкурок лисиц и корсака проводят в соответствии с приложением 3.

1.15. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 12266.

1.16. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости».

2. ПРИЕМКА

2.1. Шкурки лисиц и корсака принимают партиями. Партией считаются любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают оценке по всем показателям внешнего вида и размеру в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см. Ширину шкурки измеряют посередине длины с погрешностью не более 0,5 см. Площадь шкурки определяют умножением ее длины на полную ширину.

3.2. Процент серебристости на шкурках лисицы черно-бурой определяют в зависимости от длины участка шкурки, на котором равномерно расположен серебристый волосяной покров:

за 100% принимают серебристость от ушей до основания хвоста;

за 90,0% — от середины шеи до основания хвоста;


за 60,0% — от нижнего края лопаток до основания хвоста;

за 30,0% — не менее $\frac{1}{3}$ длины шкурки.


3.3. Площадь пороков определяют путем вычисления площади прямоугольника, в который вписывается данный порок, с погрешностью не более 0,5 см².

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


Шкурки лисиц и корсака транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РекомендуемоеПРАВИЛКИ ДЛЯ ШКУРОК ЛИСИЦЫ ЧЕРНО-БУРОЙ (1),
ЛИСИЦЫ КРАСНОЙ, ЛИСИЦЫ-КРЕСТОВКИ, ЛИСИЦЫ-СИВОДУШКИ (2)
И КОРСАКА

Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК ЛИСИЦ И КОРСАКА

1 Вытертое место — участок шкурки частично лишенный волосяного покрова в результате механических повреждений

2 Горелая шкурка — разрушение или потеря прочности кожевой ткани плохо обезжиренной шкурки, сопровождающееся появлением коричневого оттенка в результате длительного хранения

3 Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.

4 Лежалая шкурка — шкурка с пожелтевшей или покрасневшей кожевой тканью и матовым волосяным покровом в результате длительного хранения в неблагоприятных условиях

5 Мороженая шкурка — шкурка высушенная на морозе с рыхлой, утолщенной кожевой тканью белого цвета

6 Плешина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате заболевания животного или разложения кожевой ткани

7 Прелая шкурка — разложение кожевой ткани шкурки в результате несвоевременного или неправильного хранения

8 Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.

9 Сквозной волос — обнажение корней волос

10 Шкурки, поврежденные молью, — повреждение волосяного покрова и кожевой ткани личинками моли

11 Шкурки, поврежденные гохеедом, — повреждение участков шкурки жуками и их личинками

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Таблица 7
Оценка качества шкурок лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака в процентах

Виды лисицы	1-й сорт				2-й сорт			
	Группа пороков				Группа пороков			
	первая	вто- рая	тре- тья	чет- вер- тая	пер- вая	вто- рая	тре- тья	чет- вер- тая
Лисица красная, корсак	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5
Лисица крестовка лисица сиводушка	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0

Продолжение табл. 7

Виды лисицы	3-й сорт			
	Группа пороков			
	первая	вторая	третья	четвертая
Лисица красная, корсак	50,0	45,0	37,5	25,0
Лисица-крестовка, лисица-сиводушка	50,0	45,0	37,5	25,0

Таблица 8
Оценка качества шкурок лисицы черно-буровой в процентах

Размерная категория шкурки	Цвет	Группа серебристости	Первый сорт				Второй сорт			
			Группа порока				Группа порока			
			первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
1	I	1	120,0	107,8	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
		2	96,0	86,4	72,0	48,0	76,9	69,1	57,6	38,4
		3	60,0	54,0	44,9	30,0	48,0	43,2	36,0	24,0
	II	1	91,8	82,6	68,9	45,9	73,4	66,1	53,1	36,7
		2	73,4	66,1	55,1	36,7	58,7	52,9	44,0	29,4
		3	45,9	41,3	34,4	23,0	36,7	33,6	27,5	18,4
2	I	1	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
		2	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
		3	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0
	II	1	76,5	68,9	57,3	38,3	61,2	55,1	45,9	30,6
		2	61,2	55,1	45,9	30,6	48,9	44,0	36,7	24,5
		3	38,3	34,4	28,7	19,1	30,6	27,5	23,0	15,3

Примечания.

1. Шкурки лисицы красной, черно-буровой, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков; весенние и поздневесенние с безжизненным, тусклым, поредевшим волосяным покровом, особенно на огузке, боках и плечах или с голым червом; летние с низкой грубой остью почти без пуха и темно-синей кожевой тканью; детеныш с пухлявым волосяным покровом; прелые, горячие, поврежденные молью и кожедом, а также шкурки лисицы черно-буровой, имеющие длину менее 60,0 см или ширину менее 12,5 см, с серебристостью волосяного покрова менее 30% ее длины; полуволосые с синей кожевой тканью относят к нестандартным.

Нестандартные шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака оценивают не более 25% от качества шкурок первого сорта, I-й группы пороков соответствующего кряжа, а нестандартные шкурки лисицы черно-буровой — не более 25% от качества шкурок первого сорта, I-й группы пороков, II цвета, 1-й группы серебристости, 2-й размерной категории

2. Скидка от оценки по качеству, %:

за шкурки, снятые чулком, правленые кожевой тканью наружу — 5;

за отсутствие каждой лапы — 2,5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центросоюзом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Сафонов, З. Х. Давлетов, Л. Д. Семакин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 07.12.89 № 3607

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1994 г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 14174—79

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дается ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266—89	1 15
ГОСТ 14192—77	1 16

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб 03 01 90 Подп в печ 08 02 90 1,0 усл п л 1,0 усл кр отт 0,83 уч изд л
Тир 5000 Цена 5 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1475