

Семена деревьев и кустарников.

МЕТОДЫ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Seed of trees and shrubs
 Methods of phytopathological
 analysis

ГОСТ

13056.5-76*

Взамен

ГОСТ 13056.5-67

ОКСТУ 9709

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССРР
 от 11 мая 1976 г. № 1159 срок введения установлен

с 01.07.77

Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 17.12.86 № 3895
 срок действия продлен

до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена деревьев и кустарников, предназначенные для посева, и устанавливает следующие методы фитопатологического анализа: биологический, макроскопический и центрифугирования.

1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

1.1 Биологический метод предназначен для установления внешней и внутренней зараженности семян на питательной среде или во влажной камере.

1.1.1 Внутреннюю зараженность определяют у семян абрикоса, вишни, дуба, миндаля, ореха, персика, сливы, черешни, черемухи. Внешнюю зараженность определяют у семян всех других видов

1.1; 1.1.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.2 Во влажной камере определяют зараженность семян всех видов вишни, ильмовых, клена, миндаля, персика, сливы, черешни, черемухи, ясения

На питательных средах определяют зараженность всех других видов.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением № 1,
 утвержденным в декабре 1986 г
 (ИУС 3-87).

1.2. Отбор проб

1.2.1. Перед отбором семян лотки, шпатели и совочки протирают спиртом, а бюксы и бумажные пакеты стерилизуют в течение 1 ч при температуре 130°С в сушильном шкафу.

1.2.2. Для определения внешней зараженности из разных мест среднего образца, составленного по ГОСТ 13056.1—67, отбирают: не менее 200 семян буква, каштана, лещины, фисташки, кедрового стланика, сосны корейской, сосны кедровой сибирской, из них на анализ выделяют по 100 семян; и не менее 500 семян всех других видов, из них на анализ выделяют по 200 семян.

1.2.3. Для определения внутренней зараженности из разных мест среднего образца по ГОСТ 13056.1—67 отбирают не менее 200 семян. Из них выделяют 100 семян.

1.2.2; 1.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.4. Остатки семян, выделенных из среднего образца, хранят в течение 1 месяца на случай повторения анализа.

1.3. Аппаратура, материалы и реактивы

1.3.1. Для проведения анализа применяют:

автоклав;

весы технические;

лампы бактерицидные;

микроскоп;

термостаты суховоздушные;

шкаф сушильный;

счетчик-раскладчик;

спиртовку;

бокс;

лотки;

шпатели;

совочки;

бюксы почвенные;

колбы плоскодонные немерные вместимостью 500 и 1000 мл по ГОСТ 25336—82;

респираторы по ГОСТ 17269—71;

чашки Петри по ГОСТ 25336—82;

пинцеты;

скальпели;

воронки стеклянные по ГОСТ 25336—82;

стекла предметные по ГОСТ 9284—75;

стекла покровные по ГОСТ 6672—75;

пипетки по ГОСТ 20292—74;

крафт-бумагу;

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026—76;

вату по ГОСТ 5556—81;

мешочки марлевые;

калий марганцевокислый по ГОСТ 20490—75;

спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962—67;
 спирт этиловый питьевой 95%-ный по ГОСТ 5963—67;
 спирт этиловый технический по ГОСТ 17299—78;
 воду стерилизованную или свежекипяченую;
 агар-агар по ГОСТ 17206—84 или ГОСТ 16280—70;
 кислоту лимонную 50 %-ную по ГОСТ 3652—69;
 кислоту молочную;
 калий фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198—75;
 натрий азотнокислый по ГОСТ 4168—79;
 магний сернокислый по ГОСТ 4523—77;
 калий хлористый по ГОСТ 4234—77;
 железо сернокислое окисное по ГОСТ 9485—74;
 сахарозу по ГОСТ 5833—75;

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Определение зараженности семян на питательной среде

1.4.1. Подготовка к анализу

1.4.1.1. Приготовление кислого картофельного агара

200 г вымытого, очищенного и нарезанного ломтиками картофеля заливают 1000 мл воды и кипятят в течение 40 мин, затем фильтруют. В отфильтрованную жидкость доливают воду до 1000 мл, добавляют 20 г агар-агара и подогревают до полного расплавления агара. Полученную среду разливают в колбы вместимостью 500 мл, добавляют 50 %-ную лимонную кислоту (из расчета одна капля на 10 мл среды) или концентрированную молочную кислоту (из расчета 4 мл кислоты на 1000 мл среды). Колбы заполняют средой до половины объема, закупоривают ватными пробками и стерилизуют.

1.4.1.2. Приготовление среды Чапека

1 г фосфорнокислого однозамещенного калия, 2 г азотнокислого натрия, 0,50 г сернокислого магния, 0,50 г хлористого калия, 0,01 г сернокислого окисного железа и 30 г сахарозы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г и растворяют в 500 мл воды комнатной температуры, затем добавляют 20 г агара, доливают водой до 1000 мл и подогревают до полного расплавления агара. Полученную среду разливают в колбы, закупоривают ватными пробками и стерилизуют.

1.4.1.3. Приготовление агаризированного пивного сусла

Неохмеленное пивное сусло разбавляют водой до 6—8%-ной концентрации сахара. На 1 л разбавленного сусла добавляют 20 г агар-агара и 0,15 г лимонной кислоты или 4 мл молочной кислоты и подогревают до полного расплавления агар-агара. Затем среду разливают в колбы, закупоривают ватными пробками и стерилизуют.

Перед употреблением ватные пробки стрелизуют в течение 1 ч при температуре 130°C в сушильном шкафу.

П р и м е ч а н и е При необходимости очистки агар-агара от примесей его помещают в двойной марлевый мешочек и замачивают на 15—20 ч в воде. Затем мешочек с агар агаром промывают в проточной воде или путем частой смены воды (не менее 8—10 раз) в течение 2—3 ч

1.4.1 За. Приготовление древесной среды для выявления гриба-возбудителя сосудистого микоза дуба.

200 г мелко нарезанных веток дуба высыпают в колбу, заливают 1000 мл воды, выдерживают в течение 12 ч при комнатной температуре, стерилизуют затем фильтруют. Объем полученного фильтрата доводят водой до 1000 мл, добавляют 20 г агар-агара. Полученную среду стрелизуют в колбах, закупоренными ватными пробками.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.4.1.4. Стерилизацию питательных сред проводят в автоклаве паром

под давлением 1,0 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 30 мин или под давлением 1,5 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 20 мин. За начало стерилизации принимают время, когда достигнуто необходимое давление,

без давления (три раза по 1 ч через сутки). За начало стерилизации принимают момент обильного выхода пара. В перерывах стерилизуемые питательные среды держат при температуре 25—30°C

1.4.1.5 Чашки Петри, пипетки, кружочки из фильтровальной бумаги стерилизуют в течение 1 ч при температуре 130°C в сушильном шкафу. Боксы перед разливом среды и раскладкой семян дезинфицируют бактерицидными лампами, а терmostаты перед загрузкой обрабатывают спиртом с последующим обжиганием спиртовым факелом

1.4.1.6. Воду стерилизуют в автоклаве под давлением 1,0 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 30 мин или под давлением 1,5 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 20 мин или кипятят в колбах, закрытых ватными пробками в течение 30 мин с момента закипания.

1.4.2 Проведение анализа

1.4.2.1. Разлив питательной среды в чашки Петри и раскладку семян производят в боксе. Толщина слоя среды в чашке Петри должна быть 3—4 мм. Семена раскладывают на застывшую питательную среду.

1.4.2.2. (Исключен, Изм. № 1).

1.4.2.3. В чашку Петри раскладывают по 50 мелких семян сосны, ели, шелковицы, спиреи, жимолости, бузины и других, близких к ним по размерам, или по 25 крупных семян пихты, караганы, яблони, груши и других, близких к ним по размерам, и по 5—10 семян клена, ореха и других, близких к ним по размерам семян.

1.4.2.4. Раскладку семян производят пинцетом или при помощи счетчика-раскладчика. При раскладке пинцетом семена раскладывают рядами по трафарету, подложенному под чашки Петри. Пинцет периодически дезинфицируют спиртом и огнем.

1.4.2.5. Для раскладки семян счетчиком-раскладчиком применяют насадки с отверстиями диаметром от 0,3 до 1,4 мм в зависимости от крупности семян, например:

- для семян пузыреплодника — 0,3—0,4 мм;
- » » жимолости — 0,5—0,6 мм;
- » » ели и сосны — 0,7—0,8 мм;
- » » груши, лиственницы, яблони — 1,0—1,2 мм,
- » » караганы, робинии — 1,4 мм.

1.4.2.6. После тщательного перемешивания семена насыпают сошником на продезинфицированную спиртом и обожженную огнем рабочую поверхность насадки, включают счетчик-раскладчик, удаляют пинцетом лишние семена и заполняют семенами незанятые отверстия насадки. Затем насадку с семенами подносят к поверхности питательной среды, не прикасаясь к ней, и выключают счетчик-раскладчик.

1.4.2.7. На чашках Петри карандашом по стеклу проставляют номер образца и дату раскладки семян.

1.4.2.8. Чашки Петри с разложенными семенами заворачивают в крафт-бумагу, пропитанную в автоклаве, и помещают на 5—6 суток в термостат с постоянной температурой 25—28°C.

1.4.2.9. Просмотр семян производят на шесть или семь сутки. При определении наиболее распространенных грибов руководствуются рекомендуемыми приложениями 1—3.

При просмотре семян необходимо надевать респираторы или марлевые повязки

1.4.2.10. Определение грибов

Сапротитные грибы родов *Aspergillus*, *Mucor*, *Penicillium*, *Rhizopus*, *Trichoderma*, *Hormiscium* определяют визуально по форме и цвету колоний, а также по цвету их обратной стороны.

Сапротитные грибы других родов определяют сначала визуально по ярко выраженным колониям, затем под микроскопом с малым увеличением.

Паразитные грибы родов *Alternaria*, *Fusarium*, *Verticillium*, *Phomopsis*, *Botrytis*, *Pythium de Baryanum*, *Rhizoctonia* определяют только под микроскопом.

1.4.2.11. При сомнении в правильности определения грибов небольшую часть развившейся колонии исследуют в капле воды или 0,01 %-ной уксусной кислоты под микроскопом при малом и большом увеличениях. Если споры грибов не обнаружены, то после определения других грибов чашки Петри оставляют на свету еще на 1—2 суток, затем колонии просматривают под микроскопом.

1.4.3. Обработка результатов

1.4.3.1. При просмотре каждой чашки Петри производят учет зараженности семян отдельно каждым паразитным и сапроптическим грибом. Учету подлежат все колонии грибов, образовавшиеся на семенах и вокруг них.

Колонии паразитных грибов учитывают отдельно по каждому роду гриба в процентах от количества разложенных семян. Вычисления производят до целого числа.

Колонии сапроптических грибов учитывают в процессе просмотра семян и оценивают их зараженность каждым грибом по степени встречаемости:

единичная — до 5% зараженных семян;

слабая — до 25% зараженных семян;

средняя — до 50% зараженных семян;

сильная — более 50% зараженных семян.

1.5. Определение зараженности семян во влажной камере

1.5.1. Подготовка к анализу

1.5.1.1. Приготовление влажной камеры

В чашки Петри по размеру дна чашки укладывают по два-три кружка фильтровальной бумаги и стерилизуют их в автоклаве под давлением 1,0 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 30 мин или под давлением 1,5 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 20 мин или в сушильном шкафу в течение 1 ч при 130°C.

После стерилизации фильтровальную бумагу в чашках Петри увлажняют стерилизованной или свежекипяченой водой до полной влагоемкости при помощи пипетки, слегка приоткрывая при этом с одного края крышку чашки.

Увлажнение считают нормальным, если при наклоне чашки с кружков стекают мелкие капли воды.

1.5.1.2. (Изменен, Изм. № 1).

1.5.1.3. Перед раскладкой семена обеззараживают с поверхности путем:

быстрого проведения через пламя спиртовки с помощью пинцета;

путем опускания в спирт на 1 мин;

путем стерилизации 0,5 %-ным раствором марганцевокислого калия в течение 1 ч с последующим промыванием стерилизованной или свежекипяченой водой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.2. Проведение анализа

1.5.2.1. Обеззараженные семена пинцетом раскладывают во влажную камеру.

1.5.2.2. Дальнейший анализ проводят в соответствии с пп. 1.4.2.7—1.4.2.11 и 1.4.3.

2. МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД

2.1. Макроскопический метод применяют для определения внешних изменений, вызванных развивающимися грибами в семенах всех видов березы, ольхи, дуба, тополя, ели и караганы древовидной.

Примечание. У семян всех видов березы и ольхи зараженность грибами другими методами не определяют.

2.2. Анализ проводят одновременно с определением чистоты семян по ГОСТ 13056.2—67.

2.3. Аппаратура и материалы

2.3.1. Для проведения анализа применяют:

лупу по ГОСТ 25706—83;

пинцет.

2.4. Проведение анализа

Навеску семян осматривают невооруженным глазом или с помощью лупы и выделяют деформированные семена, а также семена со склероциями и с явно выраженным спороношением.

2.5. Признаки, по которым устанавливают зараженность, и способы учета зараженности указаны в таблице.

Порода	Признаки зараженности
Береза	Склероции в виде черного подковообразного ободка в верхней части семени
Ольха	Склероции в виде черного ободка вокруг семени. Деформация — семена сильно увеличены в объеме (воздушные)
Дуб	Склероции в виде черного или бурого цвета, губчатой структуры, или серый мицелий, выступающий на треснувшей кожуре желудя. На поверхности кожуры желудя сильно выступающие бугорки, которые образуют звездообразный разрыв кожуры
Тополь	Деформация — семена сильно увеличены в объеме (воздушные)
Ель	На внешней или внутренней стороне чешуек шишки многочисленные шаровидные плотные эцидии оранжевого или темно-коричневого цвета — ржавчина
Карагана древовидная	На сморщеных семенах склероции — матово-черные бугорки

2.6. Обработка результатов

2.6.1. Зараженность семян всех видов березы, ольхи, караганы древовидной, дуба и тополя учитывают в процентах от массы навески по ГОСТ 13056.2—67.

2.6.2. Зараженность семян всех видов ели определяют только по тому: обнаружена ржавчина или не обнаружена.

3. МЕТОД ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ

3.1. Метод центрифугирования используют для ускоренного или предварительного фитопатологического анализа семян. Этим методом определяют только наличие спор грибов родов *Alternaria*, *Fusarium*, *Helminthosporium*, *Stemphylium*, *Mycogone*, *Trichothecum*, находящихся на поверхности семян.

3.2. Аппаратура, материалы и реактивы

3.2.1. Для проведения анализа применяют:

центрифугу,

микроскоп;

пипетки;

пробирки по ГОСТ 25336—82;

колбы плоскодонные по ГОСТ 25336—82;

стекла предметные по ГОСТ 9284—75;

стекла покровные по ГОСТ 6672—75;

воду стерилизованную или свежекипяченую.

3.3. Подготовка к анализу

3.3.1. Для анализа из разных мест среднего образца, отобранного по ГОСТ 13056.1—67, берут две пробы по 100 семян.

3.3.2. Колбы и пробирки обеззараживают в автоклаве под давлением 1,0 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 30 мин или под давлением 1,5 Па ($\text{кг}/\text{см}^2$) в течение 20 мин.

3.4. Проведение анализа

3.4.1 Пробы помещают в стерильные колбы, заливают 10—20 мл воды комнатной температуры и взбалтывают. Семена с гладкой поверхностью взбалтывают в течение 5 мин, с шероховатой — в течение 10 мин.


После взбалтывания суспензию от каждой пробы сливают в стерильные пробирки центрифуги, заполняя каждую пробирку на $\frac{1}{2}$ вместимости и подвергают центрифугированию в течение 3 мин. Частота вращения центрифуги должна быть 50—60 об/мин. Если в центрифуге не все пробирки заняты, то свободные пробирки заполняют для равновесия чистой водой до того же уровня. По окончании центрифугирования воду из каждой пробирки сливают, оставляя слой воды 1,5—2,0 см, осадок взмучивают и из него готовят пять препаратов. Для каждого препарата берут пипеткой одну каплю взвеси, помещают ее на предметное стекло и покрывают покровным стеклом.

3.5. Препараты просматривают под микроскопом по всей площади покровного стекла и устанавливают наличие спор и род грибов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ПАРАЗИТНЫЕ ГРИБЫ — ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИОННОГО ПОЛЕГАНИЯ
ВСХОДОВ


Ботритис — *Botritis cinerea* Pers.



а—конидиеносцы с конидиями; б—конидии.

Черт 1


Питиум — *Pythium de Baryanum* Hesse



а зооспорангий, б ооспора в антериций

Черт 2


Альтернария — *Alternaria Nees*



Конидиеносцы с цепочками конидий

Черт 3


Фузариум — *Fusarium Link*



а—конидиеносцы с конидиями б—макроконидии, в—микро-
конидии г—хламидоспоры—промежуточные и в цепочках.

Черт 4

Вертициллиум — *Verticillium Nees*




конидиеносец с конидиями на
концах

Черт. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

**САПРОФИТНЫЕ ГРИБЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАГНИВАНИЕ СЕМЯН
ПРИ ХРАНЕНИИ**


Пенициллиум —*Penicillium Link*



Конидиеносец с цепочками конидий

Черт. 1


Аспергиллус —*Aspergillus mich*



Конидиеносцы с конидиями

Черт. 2

Моноспориум —*Monosporium Bonorden*



Конидиеносец с одиночными конидиями

Черт. 3


Спикария —*Spicaria Harting*



Конидиеносец с цепочками из конидий

Черт. 4


Ризопус — *Rhizopus Ehrenb*



а—спорангисеносцы со спорангиями, б—столоны, в—ризоиды.

Черт 5


Эдоцефалум — *Oedocephalum Preuss*



а—конидиеносцы с головками конидий; б—хламидоспоры

Черт. 6


Гормисциум —*Hormiscium Kunze*



Цепочки конидий

Черт. 7


Кладоспориум —*Cladosporium Link*



Конидиеносцы с конидиями

Черт. 8


Монилия — *Monilia Pers*



Конидиеносцы с цепочками конидий

Черт. 9


Трихотециум — *Trichothecium Link*



Конидиеносцы с конидиями

Черт. 10


Цилиндроцефалум — *Cylidrocephalum Lindau*



а—спорангий; *б*—споры, *в*—столбик, *г*—хламидоспоры, *д*—спорангеноносец со спорангиями

Черт. 11


Мукор — *Mucor Mich*



Конидиеносцы с конидиями

Черт. 12


Гельминтоспориум —*Helmintosporium* Link



Конидиеносцы с конидиями


Черт. 13

Цефалоспориум —*Cephalosporium* Corda




Конидиеносцы с конидиями

Черт. 14

Триходерма —*Trichoderma Pers*

Конидиеносцы с конидиями


Черт. 15

Стемфилиум —*Stemphylium Wallr*

а—конидиеносец с конидиями б—конидии

Черт. 16


Пуллулария —*Pullularia* Berkh



a—тонкостенные гифы с конидиями; *б*—гифы с толстостенными клетками

Черт. 17

Хетомиум —*Chaetomium* Kunze




а—перитеций; *б*—волосок гри большом увеличении

Черт. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

**ГРИБЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЗАГНИВАНИЕ СЕМЯН В РЕЗУЛЬТАТЕ
АНТИСАНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ**


Сордария —*Sordaria Ces. et de Not*



а—перителий; б—сумка с аскоспорами

Черт. 1


Пилоболус —*Pilobolus Tode*



а—спорангииеносец; б—оболочка спорангия

Черт. 2


Глиокладиум — *Gliocladium Corda*



Конидиеносцы со слизистым шаровидным скоплением
конидий


Черт. 3

Тамнидиум — *Thamnidium Link*




Спорангииеносец со спорангиями (спорангиолями) а—при малом увеличении, б—при большом увеличении

Черт. 4

Стизанус —*Stysanus Corda*Хетостилум —*Chaetostylum Fresenii*

Коремни с конилями
а—при малом увеличении, б—при большом
увеличении


Черт. 5



Спорангии и бесплодные остирия

Черт. 6

Хетокладиум —*Chaetocladium Brefeldii*



Грозди конёдний
Черт. 7