



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ХОРЯ БЕЛОГО,
ХОРЯ ЧЕРНОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11146—65

Издание официальное

**ШКУРКИ ХОРЯ БЕЛОГО,
ХОРЯ ЧЕРНОГО НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Undressed skins of white fitch and black fitch.
Specifications

**ГОСТ
III46—65***

Взамен
ОСТ НКЗаг 416,
ОСТ НКЗаг 418
и ГОСТ 6506—53

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 2 февраля 1965 г. Срок введения установлен

с 01.01. 1966 г.

Проверен в 1978 г. Срок действия продлен

до 01.01. 1984 г.

Насоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки белого и черного хоря из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки белого хоря имеют блестящую высокую чернобуро-бурую ость, пух белый или желтоватый. Хвост двухцветный, у основания светлый, желтоватый, конечная часть — чернобурого цвета.

Шкурки черного хоря имеют блестящую черно-бурую длинную ость с палево-ржавой подпушью. Хвост сплошь черно-буровой окраски.

3. Шкурки должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста, хрящей из ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены без повреждения корней волос и законсервированы пресно-сухим способом.

Шкурки белого хоря должны быть оправлены мездрай наружу, с затяжкой в длину (без излишней перетяжки); допускается правка шкурок на правилах; шкурки черного хоря правят волосом наружу на правилах установленной формы с соблюдением отношения ширины шкурки (по мэдре) к ее длине как 1 : 6.

1—3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. В зависимости от качества волосяного покрова шкурок белого хоря установлены кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1979 г.) с изменением № 1,
утвержденным в феврале 1979 г. (ИУС 4—1979 г.).

© Издательство стандартов, 1980

Таблица 1

Кряжи	Характеристика волосяного покрова шкурок	Районы распространения
1. Оренбургский	Высокий, средней густоты,шелковистый, концы остьевых волос черные или с коричневым оттенком. Пух белый или желто-серый	Казахская ССР (кроме Южно-Казахстанской обл.), Оренбургская обл., Башкирская АССР, Восточная и Западная Сибирь (кроме районов Бурятской АССР и Читинской обл.)
2. Саратовский	Высокий, менее густой, недостаточно шелковистый, цвет концов остьевых волос черно-коричневый. Пух желтовато-серый	Саратовская, Воронежская, Тамбовская, Куйбышевская и Волгоградская обл., Татарская АССР, Чувашская АССР и Марийская АССР
3. Юго-Восточный	Менее высокий, редковатый и грубоватый. Пух светло-желтый, концы остьевых волос рыжевато-коричневого цвета	Украинская ССР, Ростовская и Астраханская обл., Краснодарский и Ставропольский края
4. Среднеазиатский	Очень высокий, густой, мало шелковистый. Пух светло-желтый, цвет концов остьевых волос черно-смолистый	Туркменская ССР, Таджикская ССР, Узбекская ССР, Южно-Казахстанская обл., Казахской ССР, Читинская обл. и Бурятская АССР

5. По размерам шкурки белого и черного хорей должны соответствовать требованиям табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурок	Шкурки белого хоря				Шкурки черного хоря, правленные на правилках	
	оправленные трубкой		правленные на правилках			
	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский		
Длина, см		Площадь, см ²				
Крупный	Более 45	Более 40	Более 600	Более 400	Более 600	
Средний	Более 35 до 45 вкл.	Более 30 до 40 вкл.	Более 450 до 600 вкл.	Более 300 до 400 вкл.	Более 450 до 600 вкл.	

Продолжение табл. 2

Размер шкурок	Шкурки белого хоря				Шкурки черного хоря, правленные на правилках	
	оправленные трубкой		правленные на правилках			
	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский	Кряжи: Оренбургский и Саратовский	Кряжи: Юго-Восточный и Среднеазиатский		
	Длина, см		Площадь, см ²			
Мелкий	До 35	До 30	До 450	До 300	До 450	

Примечания:

1. Длину шкурок измеряют от междуглазья до корня хвоста.
2. Площадь шкурок определяют умножением длины шкурки от междуглазья до корня хвоста на среднюю ее ширину.
3. (Исключен, Изм. № 1).
- (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкурки белого и черного хорей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Описание волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосые с высокой, частой, блестящей остью и густым пухом. Хвост пушистый. Мездра чистая. У белого хоря допускается синева на лапках и легкая синева на череве между передними лапками
Второй	Менее полноволосые, с недоразвившимися остью и пухом. Хвост менее пушистый. У белого хоря допускается синева на лапках и на груди; у черного — легкая синева на огузке, голове и лапках
Третий	Половолосые с низкими, наполовину развивающимися остью и пухом. Хвост слабо опущен. Мездра у белого хоря синеватая, у черного — синяя

7. (Исключен, Изм. № 1).
8. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкурки хорей по наличию пороков подразделяют на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектности		
	«Малый дефект»	«Средний дефект»	«Большой дефект»
1. Разрывы общей длиной, % к длине шкурки	Более 10 до 25 вкл.	Более 25 до 50 вкл.	Более 50 до однократной длины; шкурки, перерванные поперец
2. Дыры или вытертые места, % к общей площади	До 0,5 вкл.	Более 0,5 до 1 вкл.	Более 1 до 2 вкл.
3. Плешины, % к общей площади	—	До 0,5 вкл.	Более 0,5 до 1 вкл.
4. Сквозняк, % к пло-	Не допускается	До 10 вкл.	Более 10 до 25 вкл.
щади шкурки			
5. Признаки линьки	—	Позлышезимние со слегка поредевшими остью и пухом на шейной части, мездра слегка утолщенная	Ранневесенние, перезрелые с поредевшими остью и пухом на боках, огузке и на шейной части; мездра утолщенная
6. Отсутствие частей шкурки	Головы	Головы с шеей	—
7. Неправильная первичная обработка	Съемка пластом	—	Комовая сушка

Примечание. Разрывы шкурки общей длиной до 10% длины шкурки включительно дефектом не считаются.

9. В шкурках, относимых к группе «малый дефект», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурках, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурках, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект», либо четырех пороков группы «малый дефект», или одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект».

10. Шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», шкурки весеннего, летнего,

раннеосеннего боя с сильно поредевшим волосяным покровом, с грубой остью, почти без пуха, с низкой остью, с едва начавшим развиваться пухом, а также шкурки детенышей, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относятся к несортовым и оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% от стоимости первого сорта).

Примечание. Шкурки белого хоря несезонного времени боя (весенние, летние и раннеосенние), а также шкурки детенышей добыче и приемке не подлежат.

11. Упаковка и маркировка шкурок хорей должна производиться по ГОСТ 12266—66.

10, 11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

**оценки качества шкурок хорей в процентах к стоимости шкурок первого сорта крупного размера
(рекомендована Центросоюзом)**

Размеры шкурок	Сорта											
	Первый			Второй			Третий					
	Нормальные	Группы дефектности		Нормальные	Группы дефектности		Нормальные	Группы дефектности		«Малый дефект»	«Средний дефект»	«Большой дефект»
		«Малый дефект»	«Средний дефект»		«Малый дефект»	«Средний дефект»		«Малый дефект»	«Средний дефект»			
Крупный	100	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5

Скидки в процентах от зачетной стоимости:

за отсутствие хвоста — 5;

за съемку чулком — 5;

за плохо обезжиренные, непросушенные, плесневелые — 10.

Редактор Н. Е. Шестакова
Технический редактор Ф. И. Шрайбштейн
Корректор В. А. Ряукайте

Сдано в наб. 10.01.80 Подп. в печ. 21.03.80 0,5 п. л. 0,37 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Сдана «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3,
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14 Зак. 1031

Изменение № 2 ГОСТ 11146—65 Шкурки хоря белого, хоря черного невыделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.88 № 3000

Дата введения 01.02.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7886.

Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом, шкурки весенние с сильно поредевшим воло-

(Продолжение см. с. 296)

29

(Продолжение изменения к ГОСТ 11146—65)

сяным покровом, летние с грубым почти без пуха волосяным покровом, раннеосенние с низкой остью, с едва начавшим развиваться пухом, детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным».

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)