

ГОСТ 7067—88

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

---

---

## ВИКА ЯРОВАЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАГОТОВКАХ И ПОСТАВКАХ

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2010

**ВИКА ЯРОВАЯ****Требования при заготовках и поставках**

Common yetch.  
Requirements for state purchases and deliveries

**ГОСТ  
7067—88**

МКС 67.060  
ОКП 97 1651

**Дата введения 01.07.90**

Настоящий стандарт распространяется на семена яровой вики, заготовляемые и поставляемые государственной заготовительной системой для переработки на комбикорма и на кормовые цели.

**1. ТИПЫ**

1.1. В зависимости от цвета семян яровую вику подразделяют на типы, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Номер и наименование типа	Характеристика цвета семян	Примерный перечень сортов, характеризующих тип	Содержание семян других типов, %, не более
I — Белая	В массе ровный белый, иногда со светло-розовым или зеленоватым оттенком. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных оттенков этого цвета, не нарушающих общего тона	Южно-Уральская 153, Белоzemянная	2,0
II — Серая	В массе ровный серый разных оттенков. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных цветов, не нарушающих общего тона	Лыговская 60	5,0
III — Коричневая	В массе ровный коричневый разных оттенков. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных цветов, не нарушающих общего тона	Саранская местная, Камалинская 611, Лыговская 31—292, Красноуфимская 49	5,0

1.2. Яровую вику, не соответствующую установленным нормам по содержанию семян других типов, определяют как «смесь типов» с указанием состава в процентах.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми производят расчет за заготовляемые семена яровой вики, указаны в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Норма
Влажность, %	15,0
Сорная примесь, %	3,0
Зерновая примесь, %	2,0
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается

Издание официальное

Перепечатка воспрещена  
© Издательство стандартов, 1988  
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

2.2. Ограничительные нормы для заготовляемых семян яровой вики указаны в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	20,0
Сорная примесь, %, не более	8,0
в том числе:	
галька	1,0
вредная примесь	1,0
в числе вредной примеси:	
спорыни	0,5
горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис ланцетный (по совокупности)	0,1
вязель разноцветный	0,1
гелиотроп опущенноплодный	0,1
триходесма седая	
Зерновая примесь, %, не более	Не допускается
в том числе проросшие семена	15,0
Зарожденность вредителями хлебных запасов	5,0
	Не допускается, кроме зараженности клещом

2.3. Ограничительные нормы для поставляемых семян яровой вики указаны в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	16,0
Сорная примесь, %, не более	5,0
в том числе:	
минеральная примесь	1,0
вредная примесь	0,2
в числе вредной примеси гелиотроп опущенноплодный и триходесма седая	Не допускаются
Зерновая примесь, %, не более	15,0
Зарожденность вредителями хлебных запасов	Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени

2.4. Заготовляемые и поставляемые семена яровой вики должны быть в здоровом, негреющем состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).

2.5. Остаточные количества пестицидов в семенах яровой вики не должны превышать максимально допустимых уровней, установленных Минздравом СССР.

#### 2.6. Состав основных семян, сорной и зерновой примесей

2.6.1. К основным семенам относят целые и поврежденные семена яровой вики, по характеру повреждений и выполненности не относящиеся к сорной или зерновой примеси.

2.6.2. К сорной примеси относят:

весь проход через сито с отверстиями диаметром 2,0 мм;

в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм:

минеральную примесь — гальку, шлак, руду, комочки земли и т. п.;

органическую примесь — пленки, части стеблей, листьев, оболочек и т. п.;

вредную примесь — головню, спорынию, семена, пораженные нематодой, плевел опьяняющий, горчак ползучий, софору лисохвостную, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опущенноплодный, триходесму седую;

семена и зерна всех дикорастущих и других культурных растений, за исключением неиспорченных семян гороха, фасоли, чечевицы, нута, сои и зерен овса, ячменя, пшеницы и ржи;

испорченные семена яровой вики — все с явно испорченными семядолями;

испорченные семена гороха, фасоли, чечевицы, нута, чины, сои и зерна овса, ячменя, пшеницы и ржи, отнесенные согласно стандартам на эти культуры по характеру повреждений к сорной примеси.

2.6.3. К зерновой примеси относят в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм:

а) семена яровой вики:

### **С. 3 ГОСТ 7067—88**

изъеденные и битые, если осталось менее половины семени, проросшие — семена с вышедшим наружу ростком и (или) корешком или с утраченным ростком и (или) корешком, но деформированные, с явно измененным цветом оболочки вследствие прорастания,

давленые,

недозрелые,

поврежденные — семена с частично измененным цветом семядолей в результате самосогревания, сушки и поражения болезнями (загнившие, заплесневевшие);

б) целые, здоровые, а также поврежденные семена гороха, фасоли, чечевицы, нута, сои и зерна овса, ячменя, пшеницы и ржи, отнесенные согласно стандартам на эти культуры по характеру повреждений к зерновой примеси.

### **3. ПРИЕМКА**

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 13586.3.

3.2. Яровую вику, содержащую примесь семян и зерен других культурных растений более 15,0 % массы семян вместе с примесями, принимают как смесь яровой вики с другими культурами с указанием состава в процентах.

3.3. Яровая вика с содержанием испорченных и поврежденных семян, относимых соответственно к сорной или зерновой примеси, более 1,0 % должна сопровождаться заключением ветеринарной службы Госагропрома СССР о возможности ее использования на кормовые цели с указанием, на какие виды комбикормов и в каком соотношении.

3.4. Контроль за остаточными количествами пестицидов проводят в соответствии с порядком, установленным Госагропромом СССР по согласованию с Минздравом СССР.

### **4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА**

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 13586.3.

4.2. Определение запаха и цвета — по ГОСТ 10967.

4.3. Определение влажности — по ГОСТ 13586.5.

4.4. Определение зараженности вредителями хлебных запасов — по ГОСТ 30483.

4.5. Определение сорной и зерновой примесей — по ГОСТ 30483.

4.6. Определение типового состава — по ГОСТ 10940.

4.7. Определение пестицидов — по методам, утвержденным Минздравом СССР.

### **5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

5.1. Яровую вику размещают, транспортируют и хранят в чистых, сухих, без постороннего запаха, не заряженных вредителями хлебных запасов транспортных средствах и зернохранилищах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта, санитарными правилами и условиями хранения, утвержденными в установленном порядке.

5.2. При размещении, транспортировании и хранении семян вики учитывают следующие состояния:

#### **по влажности**

с о с т о я н и е	в л а ж н о с т ь, %
сухое	не более 15,0
средней сухости	15,1—17,0
влажное	17,1—20,0
сырое	20,1 и более

#### **по засоренности**

с о с т о я н и е	с о р и я    п р и м е с ь, %	з е р н о в а я    п р и м е с ь, %
чистое	не более 1,0	не более 3,0
средней чистоты	1,1—3,0	3,1—5,0
сорное	3,1 и более	5,1 и более

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством хлебопродуктов СССР****РАЗРАБОТЧИКИ**

Г. С. Зелинский, К. А. Чурусов, Р. З. Гуревич

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 № 4358****3. ВЗАМЕН ГОСТ 7067—74****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 10940—64	4.6
ГОСТ 10967—90	4.2
ГОСТ 13586.3—83	3.1, 4.1
ГОСТ 13586.5—93	4.3
ГОСТ 30483—97	4.4, 4.5

**5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)****6. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Декабрь 2009 г.