



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ШКУРКИ НОРКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

**ГОСТ 7908—69**

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ШКУРКИ НОРКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Undressed mink skins

**ГОСТ  
7908—69\*****Взамен  
ГОСТ 7908—61**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 28 февраля 1969 г. № 293 срок введения установлен  
**с 01.07.70**

Постановлением Госстандарта СССР от 26.03.87 № 976  
срок действия продлен до

**01.07.89****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки норки клеточного разведения и норки вольной (добытой охотой).

Шкурки норки подразделяют:

по сортам — на первый, второй и третий (для шкурок вольной норки);

по группам дефектов — на «малую», «среднюю» и «большую»; шкурки норки клеточного разведения — по цветам и размерам.

Кроме того, шкурки вольной норки — по краям.

Шкурки норки клеточного разведения, имеющие особо густые пуховые волосы длиной на хребте не менее 20 мм и равномерно расположенные по всей площади шкурки, кроме черева, остевые волосы, по длине значительно превышающие пуховые волосы, относят к соболиным (длинноволосым) шкуркам.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**


2. Шкурки должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап и хвоста, очищены от прирезей мяса, сухожилий, костей; фаланги пальцев тщательно удалены от шкурки; волосяной покров и мездра хорошо обезжирены без повреждений корней волос; очищены от грязи и

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в октябре 1979 г. (ИУС 11—79).

**© Издательство стандартов, 1988**

крови с мездры и волоса; опрaвлены волосом наружу на правилках установленной формы (см. чертеж) и законсервированы пресносухим способом с симметрично растянутым в ширину и припосаженным по длине хвостом; передние лапы заправлены внутрь шкурки, допускается удаление коготков; ступни задних лап вывернуты мездрой наружу, коготками внутрь в форме мешочка («кулачка»).



Номер правилки	Размеры в мм									
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Р
1	350	28	30	40	51	58	65	78	1200	15
2	300	25	28	37	48	56	63	74	1100	15
3	250	24	26	34	44	54	58	68	1000	14
4	210	23	25	32	42	45	45	58	900	14

3. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки норки делят на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурки
Первый	Полноволосый, развившийся, блестящий, с густыми остью и пухом. Мездра чистая. Допускается легкая синева на оушке шириной до 3 см от его края, хвосте и лапах.
Второй	Менее полноволосый, блестящий, с недоразвившимся остью и пухом. Хвост недостаточно опушенный. Мездра с легкой синевой до передних лап у клеточной норки и по всей площади шкурки вольной норки.
Третий (для вольной норки)	Полуволосый, ровный, густой, блестящий, хвост мало опушенный. Мездра синяя.

Примечание. Сортность шкурки белых, серебристо-голубых, сапфировых, «голубой ирис» и других голубых цветов определяют по качеству волосяного покрова без учета мездры.

4. В зависимости от наличия пороков шкурки норки подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование пороков	Группы дефектов		
	малая	средняя	большая
1. Разрывы и швы общей длиной в % к длине шкурки:			
для клеточной норки	5,1—15,0	15,1—40,0	40,1 до однократной длины шкурки или шкурки, перерванные поперек
для вольной норки	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до однократной длины шкурки или шкурки, перерванные поперек
2. Дыры, вытертые места, битая или сеченая ость в % к общей площади шкурки	До 1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Плешины общей площадью в % к площади шкурки	Не допускаются	До 0,5	0,6—2,0
4. Участки с невылинявшими летними рыжими волосами в % к общей площади шкурки:			
для клеточной норки	До 0,5	0,6—2,0	2,1—4,0
для вольной норки	1,1—3,0	3,1—5,0	5,1—10,0
5. Четко выраженная закрученность вершин кроющих волос общей площадью в % для клеточной норки	10,1—20,0	20,1—30,0	30,1—50,0
6. Признаки линьки (ранневесенней)	Не допускаются	Шкурки полноволосые, со слегка поредевшей остью и пухом на боках или шейной части	—

Наименование пороков	Группы дефектов		
	малая	средняя	большая
7. Недостача частей шкурки:			
для клеточной норки	—	Головы	Головы с шеей или вырезанного черева
для вольной норки	Головы	Головы с шеей, вырезанного черева	—
8. Неправильная съемка, правка и первичная обработка:			
для клеточной норки	Плохо обезжиренные по мездре или волосу, загрязненные. Нестандартная правка	Шкурки особокрупных размеров с изрезанным волосом на боках и шейной части вследствие перетянутости	Снятые пластом. Комовые
для вольной норки	Снятые пластом. Плохо обезжиренные волосы	—	Комовые
9. Обиажение волоса-ных луковиц (сквозной волос) общей площадью к площади шкурки в %	1,1—3,0	3,1—7,0	7,1—20,0
10. Закусы на мездре, расположенные кучно, общей площадью в % к площади шкурки	1,1—3,0	3,1—6,0	6,1—10,0
11. Пятна или полосы белого цвета на череве шкурок клеточной норки (за исключением душки и промежуности) шириной в см:			
клеточная норка (кроме гомоголубых, гомокоричневых и босжемчужных)	2,1—4,0	Более 4,1	—

Продолжение табл. 2

Наименование пороков	Группы дефектов		
	малая	средняя	большая
12. Шкурки клеточной норки цвета черного с коричневым черевом или красноватым оттенком черева	Допускается	—	—
13. Шкурки клеточной норки цвета темно-коричневого излишне осветленные (светло-коричневые) или имеющие светло-коричневое с красноватым оттенком черево	Допускается	—	—
14. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточных норок: белых, сапфировых, «голубой ирис» и голубых	Слегка желтоватый	Желтоватый	Желтый
15. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточных норок: «алеутских» и серебристо-голубых	Коричневатый	Коричневый	—
16. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточных норок: «паломинно», розовых, жемчужных, янтарь-сапфировых («хоуп») и гонокоричневых	Оранжевый и ярко-оранжевый однотонный	Оранжевый и ярко-оранжевый неоднотонный	—
17. Нежелательный оттенок меха шкурок клеточных норок: «топаз», «пастель», гонокоричневых и темно-коричневых	Буро-желтый	—	—

## Примечания:

1. При разных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), учитывают наибольший порок.

Шкурки, имеющие вытертое место и желтизну на череве между задними лапами (в промежности) шириной до 10 мм и длиной до 30 мм принимают без скидок.

2. Отдельно расположенные закусы на мездre шкурки норки при их оценке не учитывают.

5. На дефектных шкурках допускают не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускают:

на шкурках, относимых к группе дефектов «малая», не более одного порока, предусмотренного для этой группы;

на шкурках, относимых к группе дефектов «средняя», наличие не более одного порока группы дефектов «средняя» или двух пороков группы дефектов «малая»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большая», наличие не более одного порока группы дефектов «большая» или двух пороков группы дефектов «средняя», или четырех пороков группы дефектов «малая».

При наличии на шкурках одного порока из группы дефектов «средняя» и двух пороков из группы дефектов «малая» шкурки переводят в группу дефектов «большая».

6. Шкурки, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы дефектов «большая», а также прелые, горелые, поврежденные молью или кожеедом, принимают с зачетом не более 25 % стоимости первого сорта крупного размера соответствующего цвета.

7. Шкурки клеточной норки, весенние и поздневесенние, со значительно поредевшим волосным покровом, с рыжеватой остью, или с выпадающим волосом, с желтой грубоватой мездрой; летние с низким грубым волосным покровом, почти без пуха, с сухой мездрой; осенние полуволосые с синей мездрой; раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости; детенышей с пухлявым волосом относят к несортным и оценивают не более 25 % стоимости первого сорта крупного размера соответствующего цвета.

Шкурки вольной норки, добытой в несезонное время, приемке не подлежат.

8. Шкурки норки клеточного разведения по окраске (цвету) волосного покрова должны соответствовать требованиям табл. 3.

Таблица 3

Цвет шкурок	Описание окраски (цвета) подсыяного покрова шкурок
Черные	Черный или почти черный по всей площади шкурки, пух темно-серый с голубоватым оттенком. Допускается легкий коричневатый оттенок вершин пуховых волос

Цвет шкурок	Описание окраски (цвета) волосяного покрова шкурок
<p>Темно-коричневые</p> <p>Голубые: «алеутские», «голубой ярис», сапфировые, «вио- лет», гомоголубые Янтарьсапфировые («хо- уп»)</p>	<p>Темно-коричневый или коричневый, пух темно-серый или серо-голубой с коричневым оттенком</p> <p>Кроющие и пуховые волосы голубого цвета различной интенсивности</p> <p>Бежево-дымчатый различной интенсивности с выраженным голубым оттенком. Пух голубой различной интенсивности</p>
Жемчужные	<p>Бежево-дымчатый различной интенсивности с голубоватым оттенком. Пух чисто бледно-голубой (жемчужные).</p> <p>Бледный бежево-дымчатый с голубоватым оттенком. Пух почти белый. На различных частях шкурки имеются седые кроющие волосы, гармонирующие с общим тоном окраски (босжемчужные)</p>
Розовые	Бледный коричнево-дымчатый с розовым оттенком. Пух почти белый с голубоватым оттенком
Лавандовые	Светло-коричневый с голубовато-лиловым оттенком
Серебристо-голубые	Чистый пепельно-голубой различной интенсивности. Пух голубой различной интенсивности
Белые	Кроющие и пуховые волосы чистого белого цвета
Крестовки черные	Кроющие волосы белые и черные: последние образуют на хребте и плечах рисунок в виде полного или неполного креста. Черво чисто-белое. Пух белый
Гомокоричневые	Вершины кроющих волос светло-коричневые или бежевые. Пух почти белый
«Паломинио»	Бежевый и светло-бежевый. Пух светло-голубой
«Топаз»	Светло-коричневый с дымчато-голубым оттенком. Пух серо-голубой
«Пастель»	Коричневый с голубовато-серым оттенком различной интенсивности. Пух серо-голубой со слегка коричневатыми вершинами

Примечание. Шкурки клеточной норки других цветов принимают по соглашению между заинтересованными организациями.

9. Размеры шкурок норки клеточного разведения должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Наименование размера	Длина шкурок	Ширина шкурок
Особо крупные А	70 и более	Не менее 7,5
Особо крупные Б	От 65 до 69,9	Не менее 7,0
Крупные	От 54 до 64,9	Не менее 6,5
Средние	От 47 до 53,9	Не менее 6,0
Мелкие	От 40 до 46,9	Не менее 5,0

Примечание. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину — по линии, проходящей через среднюю точку ее длины.

Длину пуховых волос собольных норок измеряют на изгибе хребтовой части шкурки металлической линейкой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

10. Шкурки клеточной норки длиной менее 40 см оценивают не более 25 % стоимости первого сорта крупного размера соответствующего цвета.

11. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения шкурки вольной норки подразделяют по кряжам в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

Наименование кряжей	Районы распространения	Характеристика волосяного покрова
Сибирский	Дальний Восток, Восточная и Западная Сибирь и другие районы СССР	Особо пышный, шелковистый, блестящий, темно-коричневого и коричневого цвета различной интенсивности. Пух серо-голубой.
Северный	Европейская часть СССР, за исключением районов, вошедших в кавказский, сибирский кряжи	Шкурки крупного размера. Менее пышный, блестящий, шелковистый, по цвету темно-коричневый и коричневый с серо-голубым пухом
Кавказский	Украинская ССР, Азербайджанская, Грузинская и Армянская ССР, Дагестанская АССР, Чечено-Ингушская, Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская АССР, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, южные районы Волгоградской области	Рослый, голубоватый, по цвету коричневый, светло-коричневый с рыжеватым налетом, со светло-серым пухом

12. Упаковка и маркировка шкурок норки должна производиться по ГОСТ 12266—66.

Шкурки самцов и самок клеточной норки сортируют и упаковывают отдельно.

При заготовке шкурок норки в первичных заготовительных организациях допускается объединять шкурки самцов и самок.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок норки клеточного разведения  
и вольной к стоимости первого сорта в процентах  
(рекомендована МСХ СССР)

Сорта	Нормальные	Группы дефектов		
		малая	средняя	большая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

Скидки от зачетной стоимости в %:  
за отсутствие каждой лапы — 2;  
за отсутствие хвоста — 3.

ТАБЛИЦА

оценки шкурок норки клеточного разведения  
по размерам по отношению к стоимости первого сорта  
в процентах

Особо крупные А	Особо крупные Б	Крупные	Средние	Мелкие
135	120	100	80	60

Дефекты на мехе головы, шеи, хвоста, лап и черева оценивают не выше скидок, установленных за недостаю этих частей.

Изменение № 2 ГОСТ 7908—89 Шкурки норки невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.89 № 1710

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Шкурки норки невыделанные, добытые охотой. Технические условия».

Raw mink skins obtained by hunting. Specifications. Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7882.

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки вольной норки, добытые охотой. Шкурки норки подразделяют: по сортам — на первый, второй и третий; по группам пороков — на «первую», «вторую», «третью» и «четвертую»; по краям — на «Сибирский», «Северный» и «Кавказский».

Пункт 3. Таблица 1. Графа «Наименование сорта». Исключить слова: «(для вольной норки)» и примечание.

Пункт 4. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечаний):

Таблица 2

Наименование пороков	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы и швы общей длиной, в % к длине шкурки	До 10,0 включ.	Св. 10,0 до 25,0 включ.	Св. 25,0 до 50,0 включ.	Св. 50,0 и до однократной длины шкурки или шкур, порванные поперек
2. Дыры, вытертые места, битая или сеченая ость, в % к общей площади шкурки	Не допускаются	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.
3. Плешины общей площадью, в % к площади шкурки	Не допускаются	Не допускаются	До 0,5	Св. 0,5 до 2,0 включ.
4. Участки с невылинявшими летними рыжими волосами, в % к общей площади шкурки	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 5,0 включ.	Св. 5,0 до 10,0 включ.
5. Признаки линьки (ранневесенней)	—	—	Шкурки полноволосые, со слегка поредевшей остью и пухом на боках или шейной части	—
6. Недостача частей шкурки	—	Головы	Головы с шей, вырезанного черепа	—

(Продолжение см. с. 262)

Наименование пороков	Группы			
	первая	вторая	третья	четвертая
7. Неправильная съемка, правка и первичная обработка	—	Снятые пластом. Плохо обезжиренные	—	Комовые
8. Сквозной волос общей площадью, в % к площади шкурки	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 7,0 включ.	Св. 7,0 до 20,0 включ.
9. Закусы на кожаной ткани, расположенные кучно, общей площадью, в % к площади шкурки	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 6,0 включ.	Св. 6,0 до 10,0 включ.

дополнить примечанием — 3: «3. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста, ширину по линии, проходящей через среднюю точку ее длины».

Пункты 5, 6 изложить в новой редакции: «5. На шкурках, относящихся ко «второй» группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы.

На шкурках, относящихся к «третьей» группе, допускается не более одного порока группы «третья» или два порока группы «вторая».

На шкурках, относящихся к «четвертой» группе допускается не более одного порока группы «четвертая» или два порока группы «третья» или четыре порока группы «вторая».

При отнесении шкурок ко «второй», «третьей» или «четвертой» группам пороки, допущенные для «первой» группы, не учитывают.

6. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для «четвертой» группы пороков, раннее снесенные с едва начавшим развиваться пухом, почти без ости, шкурки детенышей с пухлявым волосным покровом, а также прелые, горелые, поврежденные молью и кожедом, относят к нестандартным и оценивают не более 25 % от качества первого сорта «первой» группы пороков соответствующего края».

Пункт 7. Первый абзац исключить.

Пункты 8—10 исключить.

Пункт 11 дополнить примечанием (после табл. 5): «Примечание. Основным показателем края является характеристика волосного покрова. Районы распространения являются дополнительной характеристикой».

Пункт 12. Второй абзац исключить.

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 263)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7908—69)

**«ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**Обязательное**

**Т а б л и ц а**  
**оценки качества шкурок вольной норки, %**

Сорт	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100,0	90,0	75,0	50,0
Второй	80,0	72,0	60,0	40,0
Третий	50,0	45,0	37,5	25,0

(Продолжение см. с. 264)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7908—69)

Скидка от оценки по качеству, %:

2 — за отсутствие каждой лапы;

3 — за отсутствие хвоста.

Пороки на мехе головы, шеи, хвоста, лап и черева оценивают не выше скидок, установленных за недостатку этих частей».

(ИУС № 9 1989 г.)

Редактор *Т. В. Смыка*  
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*  
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 28.10.87 Подп. в печ. 30.03.88 0,75 усл. в. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,59 уч. изд. л.  
Тираж 2000 Цена 3 коп

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3013