


СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12565—67
Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ШКУРКИ ГОРНОСТАЯ И ЛАСКИ НЕВЫДЕЛАННЫЕ Ermine and weasel skins undressed	Взамен ГОСТ 6373—52 и ОСТ НКЗар 401 Группа С82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 3 коп.

Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25/I 1967 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.
---------------------	--	--------------------------------

Перепечатка воспрещена



4. В зависимости от качества волосяного покрова, состояния мездры и районов распространения горностая шкурки подразделяют на кряжи в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры шкурок
1. Березовский	Тюменская и Омская области	Белоснежный, блестящий, густой, высокий и шелковистый. Мездра плотная
2. Барабинский	Новосибирская, Томская, Оренбургская, Свердловская, Курганская, Челябинская области; Алтайский край, кроме Горно-Алтайской автономной области; Казахская ССР	Белоснежный и белый, блестящий, густой, высокий, шелковистый. Мездра плотная и менее плотная

Шкурки горностая и ласки невыделанные

ГОСТ 12565-67

Продолжение

Наименование края/района	Главные районы распространения	Характеристика волосистого покрова и мездры шкурок
3. Енисейский	Красноярский край, кроме Таймырского и Эвенкийского национальных округов; Тувинская АССР; Горно-Алтайская автономная область Алтайского края; Кемеровская область	Белый, менее густой. Мездра плотная
4. Якутский	Якутская АССР; Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Амурская области; Приморский край; Иркутская область; Верхне-Буреинский, Николаевский, Охотский, Полино-Осинниковский, Ульчский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы Хабаровского края; Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский районы Читинской области; Таймырский и Эвенкийский национальные округа Красноярского края; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Белый, блестящий, густой и более высокий. Мездра менее плотная
5. Забайкальский	Бурятская АССР, Хабаровский край, Читинская область, кроме районов, указанных в Якутском крае	Белый, менее густой. Мездра менее плотная
6. Печорский	Ижемский, Печорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемский, Ухтинский, Удорский, Иитинский, Воркутинский, Княжпогостский и Усть-Куломский районы Коми АССР; Ненецкий национальный округ и Мезенский район Архангельской области	Белоснежный, блестящий, густой и шелковистый. Мездра плотная
7. Северный	Коми АССР и Архангельская область, кроме районов, указанных в Печорском крае; Пермская область; Удмуртская АССР; Кировская, Вологодская, Мурманская, Ульяновская области; Карельская АССР; Башкирская АССР; Татарская АССР	Белый, менее блестящий. Мездра плотная

ГОСТ 12565-67

Шкурки горностая и ласки невыделанные

Продолжение

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волоссяного покрова и мездры шкурок
8. Северо-Центральный	Остальные районы Европейской части СССР, кроме указанных в Северном и Печорском кряжах	Белый, менее густой, низкий и грубо-ватый. Мездра плотная

Примечания:

1. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относят к тому кряжу, которому они соответствуют по качеству волоссяного покрова.

2. Шкурки ласки по кряжам не подразделяют.

5. По размерам шкурки горностая должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Размер шкурок	Кряжи				
	Березовский	Барабинский	Печорский	Енисейский, Северный, Северо-Центральный	Якутский, Забайкальский
площадь в см ²					
Крупный	Более 320	Более 300	Более 280	Более 260	Более 175
Средний	Более 250 до 320 вкл.	Более 240 до 300 вкл.	Более 220 до 280 вкл.	Более 200 до 260 вкл.	Более 130 до 175 вкл.
Мелкий	До 250 вкл.	До 240 вкл.	До 220 вкл.	До 200 вкл.	До 130 вкл.

Примечания:

1. Шкурки ласки по размерам не подразделяют.

2. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волоссяного покрова и мездры шкурки горностая и ласки делят по сортам в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волоссяного покрова и мездры шкурок		
	горностая	ласки	
		белой	светло-коричневой
Первый	Полноволосый, с развивающимся волоссяным покровом, частой остью и густым пухом, чисто белой окраски. Мездра чистая, тонкая	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, чисто белой окраски. Мездра чистая, плотная	Полноволосый, с частой остью и густым пухом, светло-коричневой окраски. Мездра чистая, тонкая

Шкурки горностая и ласки невыделанные

ГОСТ 12565-67

Продолжение

Сорта	Качество волоссяного покрова и мездры шкурок		
	горностая	ласки	
		белой	светло-коричневой
Второй	Полноволосый, с развивающимся волосяным покровом, но с наличием редко разбросанных черных волосков (бусость), особенно заметных у основания хвоста и на лобике. Мездра чистая, но несколько утолщенная	Менее полноволосый, с недоразвивающимся остью и пухом, с наличием незначительной бусости, особенно заметной на хвосте и лобике. Мездра чистая, утолщенная	Менее полноволосый, с недоразвивающимся остью и пухом, по окраске темнее, чем в первом сорте. Мездра темная, утолщенная
Третий	Менее полноволосый, с недостаточно развивающимся волосяным покровом, с незначительной бусостью. Хвост у основания и лобик сероватые. Мездра утолщенная	—	—

7. В зависимости от наличия пороков шкурки горностая и ласки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	малый	средний	большой
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	До 10,0	10,1—20,0	20,1—50,0 вкл.; шкурки, переваренные полепрек
2. Дыры к площади шкурки в %	До 0,5	0,6—1,1	1,1—2,0 вкл.
3. Плещины к общей площади шкурки в %	Не допускаются	До 0,5	0,6—1,0

Продолжение

Пороки	Группы дефектов		
	малый	средний	большой
4. Прострелы дробовые	До 3	4-5	6-10
5. Запекшаяся кровь на мездре или на волосе к площади шкурки в %	Не допускается	До 1,0	1,1-2,0
6. Признаки линики шкурок	Не допускаются	Ранневесенние, чисто белые, но с незначительно поредевшими остью и пухом. Мездра утолщен- ная с желтым оттенком	-

Примечания:

1. Шкурки ласки по наличию пороков делят на две группы дефектов: «средний» и «большой». Шкурки ласки, имеющие пороки, не превышающие нормы, установленные для шкурок горностая группы дефектов «малый», дефектами не считаются.

2. Один дробовой прострел на участках меха головы или лапах на шкурках горностая или продольный разрез по череву между передними лапами длиной до 5 см вкл. дефектами не считаются.

3. Шкурки горностая с дробовыми прострелами более одной пробоиной (независимо от их количества) на участках меха головы до шеи относятся к группе дефектов «малый» и шкурки с дробовыми прострелами более трех пробоин (независимо от их количества) на участках меха головы и шеи относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на остальной части шкурки.

8. В дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При совокупности одного порока, относимого к группе дефектов «средний» и двух пороков из группы дефектов «малый», шкурки переводят в группу дефектов «большой».

9. Шкурки, имеющие пороки, которые превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также пре-

лые, горелые, поврежденные молью и кожеедом оцениваются не более 25% от стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки горностая и ласки весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом, с погрубевшей темной мездрой, летние почти без пуха (чалые), раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, шкурки горностая темнобусые относят к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок горностая и ласки производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок горностая в процентах к стоимости шкурки
первого сорта крупного размера (рекомендованы Центросомозом)

Размеры шкурок	Сорт I				Сорт II				Сорт III			
	Первый		Второй		Третий		Четвертый		Пятый		Шестой	
	Нормальное	Группы дефектов										
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	22,5	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок ласки в процентах к стоимости шкурки
первого сорта

Сорт	Нормальное	Группы дефектов		
		средний	большой	бездефектный
Первый	100,0	75,0	50,0	50,0
Второй	50,0	37,5	—	25,0

Складки от зачетной стоимости в %:

за ярко выраженную желтизну или затряпанность волос (кроме хвоста) 10

за правку пластом 10

за отсутствие хвоста (у горностая) 5

за отсутствие головы до шеи 10

за отсутствие головы с шеей 25

КОНТР. 2К3

Изменение № 1 ГОСТ 12565-67 Шкурки горностая и ласки невыделанные
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.08.88 № 3000

Дата введения 01.02.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия».
«Specifications».

Под наименованием стандарта приставить код: ОКП 98 7884, ОКП 98 7885.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, горе-

(Продолжение см. с. 298)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12565-67)

лые, поврежденные молью и кожеедом, шкурки весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом, с погрубевшей темной мездрой, летние почти без пуха, раннеосенние с едва начавшим развиваться пухом, шкурки горностая темно-бурые относят к нестандартным».

Пункт 10 исключить.

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)