



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОВЦЫ И КОЗЫ ДЛЯ УБОЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПИТАННОСТИ

ГОСТ 5111—55

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

БЗ 9-93 1610 =

ОВЦЫ И КОЗЫ ДЛЯ УБОЯ

Определение упитанности

ГОСТ

5111—55*

Взамен

ГОСТ 5111—49
и ГОСТ 6366—52

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 13 октября 1955 г. Срок введения установлен

01.01.56

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2396 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт применяется при определении упитанности овец и коз, заготавливаемых и сдаваемых для убоя.

1. Овцы и козы, заготавливаемые и сдаваемые для убоя, должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства.

2. По упитанности овцы и козы подразделяются на три категории: высшую, среднюю и нижесреднюю. Определение категорий упитанности производится в соответствии с нижеследующими требованиями:

Категория упитанности	Овцы	Козы
Высшая	Мускулатура спины и поясницы на ощупь хорошо развита; остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, холка может выступать; отложения подкожного жира хорошо прощупываются на пояснице; на спине и ребрах отложения жира умеренные. У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте значительные отложения жира; курдюк хорошо наполненный	Мускулатура развита хорошо; остистые отростки спинных и поясничных позвонков прощупываются и слегка выступают; холка выступает, отложения подкожного жира хорошо прощупываются на пояснице и ребрах

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1986 г. (ИУС 11—86)

© Издательство стандартов, 1994

Категория упитанности	Овцы	Козы
Средняя	<p>Мускулатура спины и поясницы на ощупь развита удовлетворительно, моклоки и остистые отростки поясничных позвонков слегка выступают, а остистые отростки спинных позвонков заметно выступают; на пояснице прощупываются умеренные отложения подкожного жира, на спине и ребрах жировые отложения незначительные. У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых овец на хвосте умеренные жировые отложения; курдюк недостаточно наполнен</p>	<p>Мускулатура развита удовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, а также моклоки выступают; холка выступает значительно; подкожные жировые отложения прощупываются на пояснице и ребрах</p>
Ниже-средняя	<p>Мускулатура на ощупь развита неудовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков и ребра выступают; холка и моклоки выступают значительно; отложения подкожного жира не прощупываются. У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых овец на хвосте имеются небольшие жировые отложения</p>	<p>Мускулатура развита неудовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, ребра и моклоки значительно выступают, отложения подкожного жира не прощупываются</p>

3. Овцы и козы, не соответствующие требованиям ниже средней упитанности, относятся к тощим.

4. Споры по определению упитанности овец и коз разрешаются путем проведения контрольного убоя. Определение упитанности овец и коз в этом случае производится по качеству мяса контрольных животных в соответствии с нижеследующими характеристиками:

Категория упитанности	Баранина	Козлятина
Высшая	<p>Мышцы развиты хорошо; кости не выступают, за исключением остистых отростков позвонков в области холки; подкожный жир покрывает тушу; допускаются просветы в области холки</p>	<p>Мышцы развиты хорошо; остистые отростки спинных позвонков слегка выступают; подкожный жир покрывает тушу с просветами в области холки и таза</p>

Категории утилитности	Баранина	Козлятина
Средняя	<p>У курдючных овец в курдюке и жирнохвостых овец на хвосте имеются значительные отложения жира</p> <p>Мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки позвонков в области спины и холки выступают; подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на спине и слегка на пояснице; на ребрах, в области крестца и таза допускаются просветы</p>	<p>Мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки спинных позвонков выступают; умеренные отложения подкожного жира покрывают тушу на пояснице и ребрах</p>
Ниже- средняя	<p>У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте имеются умеренные отложения жира</p> <p>Мышцы развиты неудовлетворительно; кости заметно выступают; на поверхности туши местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать</p> <p>У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте имеются небольшие жировые отложения</p>	<p>Мышцы развиты неудовлетворительно; кости заметно выступают; подкожные жировые отложения могут отсутствовать</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1.)

Редактор *Т. И. Василенко*
 Технический редактор *Н. С. Гришанова*
 Корректор *Л. Я. Митрофанова*

Сдано в наб. 15.07.94 Подп. в печ. 15.08.94 Усл. в. л. 0,23. Усл. кр.-отт. 0,25.
 Уч.-изд. л. 0,23. Тираж 252 экз. С 1575

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1422