

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА

**Метод определения массовой концентрации
приведенного экстракта**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2000

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным учреждением — Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИ ПБ и ВП), Техническим комитетом по стандартизации ТК 91 «Пивоваренная, безалкогольная и винодельческая продукция», Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхозпрана России и Рабочей группой, образованной в рамках программы TACIS

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27 июня 2000 г. № 168-ст

3 Настоящий стандарт гармонизирован с Регламентом ЕЭС 2676/90 Комиссии от 17 сентября 1990 г. (Официальный вестник Европейских Сообществ от 03.10.90), устанавливающим методы анализа, действующие в Сообществе, в области производства вина, приложение, глава 4 «Общий сухой экстракт»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ИЗДАНИЕ (март 2009 г.) с Поправкой (ИУС 5—2008)

© ИПК Издательство стандартов, 2000
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И СЫРЬЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВА

Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта

The alcohol production and raw material for it producing.
Method of total extract determination

Дата введения 2001—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на алкогольную продукцию и сырье для ее производства: вина, виноматериалы, спиртные напитки и соки для промышленной переработки (далее — продукт) и устанавливает метод определения массовой концентрации приведенного экстракта.

Метод основан на определении массовой концентрации общего экстракта с помощью пикнометра по относительной плотности продукта и относительной плотности его дистиллята. Массовую концентрацию приведенного и остаточного экстракта вычисляют на основании полученного значения общего экстракта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8756.0—70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию

ГОСТ 13192—73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров

ГОСТ Р 51144—98 Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб

ГОСТ Р 51619—2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности

(Поправка).

3 Определение

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

общий экстракт: Массовая концентрация сухих веществ, грамм на кубический дециметр (грамм на литр), которые не улетучиваются при перегонке;

приведенный экстракт: Массовая концентрация общего экстракта, грамм на кубический дециметр (грамм на литр), за вычетом массовой концентрации сахаров;

остаточный экстракт: Массовая концентрация приведенного экстракта, грамм на кубический дециметр (грамм на литр), за вычетом массовой концентрации титруемых кислот в пересчете на винную или яблочную кислоту.

4 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 8756.0, ГОСТ Р 51144.

5 Проведение определения

Относительную плотность продукта и относительную плотность его дистиллята определяют с помощью пикнометра по ГОСТ Р 51619.

Если известна объемная доля этилового спирта исследуемого продукта, то относительную плотность его дистиллята определяют в соответствии с приложением А.

Массовую концентрацию сахаров определяют по ГОСТ 13192.
(Поправка).

6 Обработка результатов

6.1 Для определения массовой концентрации общего экстракта предварительно вычисляют относительную плотность водного раствора экстракта продукта d_{20}^{20} по формуле

$$d_{20}^{20} = 1,000 + (d_b - d_d), \quad (1)$$

где 1,000 — коэффициент плотности воды;

d_b — значение относительной плотности продукта при 20 °C;

d_d — значение относительной плотности дистиллята при 20 °C.

Массовую концентрацию общего экстракта в продукте, грамм на кубический дециметр (грамм на литр), находят по величине относительной плотности водного раствора экстракта продукта d_{20}^{20} , указанной в таблице 1.

Таблица 1 — Массовая концентрация общего экстракта в продукте

| Относительная плотность d_{20}^{20} , с точностью до второго десятичного знака | Третий десятичный знак значения относительной плотности | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Массовая концентрация общего экстракта, г/дм ³ (г/л) | | | | | | | | | | |
| 1,00 | 0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 15,4 | 18,0 | 20,6 | 23,2 |
| 1,01 | 25,8 | 28,4 | 31,0 | 33,6 | 36,2 | 38,8 | 41,3 | 43,9 | 46,5 | 49,1 |
| 1,02 | 51,7 | 54,3 | 56,9 | 59,5 | 62,1 | 64,7 | 67,3 | 69,9 | 72,5 | 75,1 |
| 1,03 | 77,7 | 80,3 | 82,9 | 85,5 | 88,1 | 90,7 | 93,3 | 95,9 | 98,5 | 101,1 |
| 1,04 | 103,7 | 106,3 | 109,0 | 111,6 | 114,2 | 116,8 | 119,4 | 122,0 | 124,6 | 127,2 |
| 1,05 | 129,8 | 132,4 | 135,0 | 137,6 | 140,3 | 142,9 | 145,5 | 148,1 | 150,7 | 153,3 |
| 1,06 | 155,9 | 158,6 | 161,2 | 163,8 | 166,4 | 169,0 | 171,6 | 174,3 | 176,9 | 179,5 |
| 1,07 | 182,1 | 184,8 | 187,4 | 190,0 | 192,6 | 195,2 | 197,8 | 200,5 | 203,1 | 205,8 |
| 1,08 | 208,4 | 211,0 | 213,6 | 216,2 | 218,9 | 221,5 | 224,1 | 226,8 | 229,4 | 232,0 |
| 1,09 | 234,7 | 237,3 | 239,9 | 242,5 | 245,2 | 247,8 | 250,4 | 253,1 | 255,7 | 258,4 |
| 1,10 | 261,0 | 263,6 | 266,3 | 268,9 | 271,5 | 274,2 | 276,8 | 279,5 | 282,1 | 284,8 |
| 1,11 | 287,4 | 290,0 | 292,7 | 295,3 | 298,0 | 300,6 | 303,3 | 305,9 | 308,6 | 311,2 |
| 1,12 | 313,9 | 316,5 | 319,2 | 321,8 | 324,5 | 327,1 | 329,8 | 332,4 | 335,1 | 337,8 |
| 1,13 | 340,4 | 343,0 | 345,7 | 348,3 | 351,0 | 353,7 | 356,3 | 359,0 | 361,6 | 364,3 |
| 1,14 | 366,9 | 369,6 | 372,3 | 375,0 | 377,6 | 380,3 | 382,9 | 385,6 | 388,3 | 390,9 |
| 1,15 | 393,6 | 396,2 | 398,9 | 401,6 | 404,3 | 406,9 | 409,6 | 412,3 | 415,0 | 417,6 |

Примечание — Поправка на четвертый десятичный знак относительной плотности, приведенный в таблице 1, дана в таблице 2.

Таблица 2

| Четвертый десятичный знак значения относительной плотности | Общий экстракт, г/дм ³ (г/л) |
|--|---|
| 1 | 0,3 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,8 |
| 4 | 1,0 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 2,3 |

Пример. Относительная плотность водного раствора общего экстракта d_{20}^{20} 1,1046.

В таблице 1 значению d_{20}^{20} 1,104 соответствует 271,5 г/дм³ общего экстракта. В таблице 2 значению d_{20}^{20} 0,0006 соответствует 1,6 г/дм³ общего экстракта. В этом случае массовая концентрация общего экстракта будет:

$$271,5 + 1,6 = 273,1 \text{ г/дм}^3.$$

6.2 Массовую концентрацию приведенного экстракта в продукте, приготовленного без использования сахарозы, B_1 , г/дм³ (г/л), вычисляют по формуле

$$B_1 = (A - B). \quad (2)$$

Массовую концентрацию приведенного экстракта в продукте, приготовленного с использованием сахарозы, B_2 , г/дм³ (г/л), вычисляют по формуле

$$B_2 = A - \Gamma - [(D - \Gamma)0,95], \quad (3)$$

где А — массовая концентрация общего экстракта в продукте, г/дм³;

Б — массовая концентрация сахаров в продукте, г/дм³;

Д — массовая концентрация сахаров в продукте, г/дм³, определенная с проведением инверсии;

Г — массовая концентрация сахаров в продукте, г/дм³, определенная без проведения инверсии.

Вычисления проводят до второго десятичного знака. За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение двух результатов параллельных определений, округленное до первого десятичного знака.

Если массовая концентрация приведенного экстракта в продукте равна минимально допустимому или превышает его не более чем на 1 г/дм³, то при расчете величины общего экстракта вводится поправка на массовую концентрацию летучих кислот по формуле

$$d_{20}^{20} = 1 + [(d_a - 0,00014 a) - d_a], \quad (4)$$

где a — массовая концентрация летучих кислот в продукте, г/дм³.

(Поправка).

7 Метрологические характеристики

7.1 Сходимость

Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности $P = 0,95$ не должно превышать 0,7 г/дм³ (г/л).

7.2 Воспроизводимость

Допускаемое абсолютное расхождение между результатами двух измерений, полученных для одной партии в разных лабораториях, при доверительной вероятности $P = 0,95$ не должна превышать 1,4 г/дм³ (г/л).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Относительная плотность водно-спиртового раствора в зависимости от объемной доли этилового спирта

Таблица А.1

| Относительная плотность водно-спиртного раствора d_{20}^{20} | Объемная доля этилового спирта, % | Относительная плотность водно-спиртного раствора d_{20}^{20} | Объемная доля этилового спирта, % | Относительная плотность водно-спиртного раствора d_{20}^{20} | Объемная доля этилового спирта, % |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 0,9889 | 8,03 | 0,9839 | 19 | 0,9789 | 16,64 |
| 8 | 12 | 8 | 28 | 8 | 73 |
| 7 | 20 | 7 | 36 | 7 | 82 |
| 6 | 28 | 6 | 45 | 6 | 91 |
| 5 | 36 | 5 | 54 | 5 | 17,01 |
| 4 | 44 | 4 | 62 | 4 | 10 |
| 3 | 8,52 | 3 | 71 | 3 | 19 |
| 2 | 60 | 2 | 80 | 2 | 28 |
| 1 | 68 | 1 | 89 | 1 | 38 |
| 0 | 76 | 0 | 97 | 0 | 47 |
| 0,9879 | 85 | 0,9829 | 13,06 | 0,9779 | 17,56 |
| 8 | 93 | 8 | 15 | 8 | 66 |
| 7 | 9,01 | 7 | 24 | 7 | 75 |
| 6 | 10 | 6 | 32 | 6 | 85 |
| 5 | 18 | 5 | 41 | 5 | 94 |
| 4 | 26 | 4 | 50 | 4 | 18,03 |
| 3 | 34 | 3 | 59 | 3 | 13 |
| 2 | 43 | 2 | 67 | 2 | 22 |
| 1 | 9,51 | 1 | 76 | 1 | 32 |
| 0 | 59 | 0 | 85 | 0 | 41 |
| 0,9869 | 9,68 | 0,9819 | 94 | 0,9769 | 18,50 |
| 8 | 76 | 8 | 14,03 | 8 | 60 |
| 7 | 84 | 7 | 12 | 7 | 69 |
| 6 | 92 | 6 | 21 | 6 | 79 |
| 5 | 10,01 | 5 | 30 | 5 | 88 |
| 4 | 09 | 4 | 39 | 4 | 98 |
| 3 | 17 | 3 | 48 | 3 | 19,08 |
| 2 | 26 | 2 | 56 | 2 | 17 |
| 1 | 34 | 1 | 65 | 1 | 26 |
| 0 | 42 | 0 | 74 | 0 | 36 |
| 0,9859 | 10,51 | 0,9809 | 14,83 | 0,9759 | 46 |
| 8 | 59 | 8 | 92 | 8 | 55 |
| 7 | 67 | 7 | 15,01 | 7 | 65 |
| 6 | 76 | 6 | 10 | 6 | 74 |
| 5 | 84 | 5 | 19 | 5 | 84 |
| 4 | 92 | 4 | 28 | 4 | 93 |
| 3 | 11,00 | 3 | 37 | 3 | 20,02 |
| 2 | 09 | 2 | 46 | 2 | 12 |
| 1 | 17 | 1 | 55 | 1 | 21 |
| 0 | 26 | 0 | 64 | 0 | 31 |
| 0,9849 | 11,34 | 0,9799 | 15,73 | 0,9749 | 40 |
| 8 | 43 | 8 | 82 | 8 | 50 |
| 7 | 51 | 7 | 91 | 7 | 59 |
| 6 | 60 | 6 | 16,00 | 6 | 68 |
| 5 | 68 | 5 | 09 | 5 | 78 |
| 4 | 77 | 4 | 18 | 4 | 87 |
| 3 | 85 | 3 | 27 | 3 | 97 |
| 2 | 94 | 2 | 36 | 2 | 21,06 |
| 1 | 12,02 | 1 | 45 | 1 | 15 |
| 0 | 11 | 0 | 55 | 0 | 24 |

Окончание таблицы А.1

| Относительная плотность водно-спиртного раствора $d_{3,20}^{20}$ | Объемная доля этилового спирта, % | Относительная плотность водно-спиртного раствора $d_{3,20}^{20}$ | Объемная доля этилового спирта, % | Относительная плотность водно-спиртного раствора $d_{3,20}^{20}$ | Объемная доля этилового спирта, % |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 0,9739 | 21,33 | 4 | 70 | 0,9709 | 24,06 |
| 8 | 42 | 3 | 80 | 8 | 15 |
| 7 | 52 | 2 | 89 | 7 | 24 |
| 6 | 61 | 1 | 98 | 6 | 33 |
| 5 | 70 | 0 | 23,07 | 5 | 42 |
| 4 | 79 | 0,9719 | 23,16 | 4 | 51 |
| 3 | 88 | 8 | 25 | 3 | 24,60 |
| 2 | 98 | 7 | 34 | 2 | 69 |
| 1 | 22,07 | 6 | 43 | 1 | 77 |
| 0 | 16 | 5 | 52 | 0 | 86 |
| 0,9729 | 22,25 | 4 | 61 | 0,9699 | 24,95 |
| 8 | 34 | 3 | 70 | 8 | 25,04 |
| 7 | 43 | 2 | 79 | | |
| 6 | 52 | 1 | 88 | | |
| 5 | 61 | 0 | 97 | | |

УДК 663.5.001.4:006.354

ОКС 67.080.10
67.160.10

Н79

ОКСТУ 9108

Ключевые слова: алкогольная продукция, сырье для ее производства, общий, приведенный, остаточный экстракт, проведение определения, обработка результатов, метрологические характеристики

Поправка к ГОСТ Р 51620—2000 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|-----------------------------------|--|--|
| Раздел 2. После второго абзаца | — | ГОСТ 13192—73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров |
| Раздел 5. После последнего абзаца | — | Массовую концентрацию сахаров определяют по ГОСТ 13192. |
| Пункт 6.2. Первый абзац | <p>Массовую концентрацию приведенного экстракта в продукте B, $\text{г}/\text{дм}^3$ ($\text{г}/\text{л}$), вычисляют по формуле</p> $B = (A - \bar{B}), \quad (2)$ <p>где A — массовая концентрация общего экстракта в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$;</p> <p>\bar{B} — массовая концентрация сахаров в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$ (известна заранее).</p> | <p>Массовую концентрацию приведенного экстракта в продукте, приготовленного без использования сахарозы, B_1, $\text{г}/\text{дм}^3$ ($\text{г}/\text{л}$), вычисляют по формуле</p> $B_1 = (A - \bar{B}). \quad (2)$ <p>Массовую концентрацию приведенного экстракта в продукте, приготовленного с использованием сахарозы, B_2, $\text{г}/\text{дм}^3$ ($\text{г}/\text{л}$), вычисляют по формуле</p> $B_2 = A - \bar{G} - [(D - \bar{G})0,95]. \quad (3)$ <p>где A — массовая концентрация общего экстракта в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$;</p> <p>\bar{B} — массовая концентрация сахаров в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$;</p> <p>D — массовая концентрация сахаров в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$, определенная с проведением инверсии;</p> <p>\bar{G} — массовая концентрация сахаров в продукте, $\text{г}/\text{дм}^3$, определенная без проведения инверсии.</p> |
| формула (3) | (3) | (4) |

(ИУС № 5 2008 г.)