



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ
ЧЕРНЫЙ НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8748—70

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ ЧЕРНЫЙ
НЕВЫДЕЛАННЫЙ**

Технические условия

Undressed pure-breed black karakul.
Specifications

**ГОСТ
8748-70***

Взамен
ГОСТ 8748-58

ОКП 98 4438

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21.07.70 г. № 1105 срок введения установлен

с 01.01.72

Постановлением Госстандарта от 11.02.87 № 224
срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

«

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец черной окраски.

Примечания:

1. Шкурки ослабленной черной пигментации (зейтуни) относят к черным.
2. Шкурки с цекицами (пятнами) общей площадью более 12 см² относят к пестрым.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Чистопородный черный каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков различной формы, которые покрывают всю площадь шкурки;

шерсть покрыта каракульскими завитками, длина волоса в расплющенном состоянии не более 30 мм. Волосяной покров головы и ножек имеет муаристый рисунок или завитки. На задних ножках, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост широкий у основания, суженный к концу, с характерным для каракульских ягнят придатком на конце, покрытым упругими или рыхлыми расплетистыми каракульскими завитками;

завитки подразделяют:

по ширине на:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (февраль 1987 г.) с изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1971 г., июне 1984 г.; Пост. № 2263 от 29.06.84 г., августе 1986 г. (ИУС 12-71, 10-84, 11-86).

узкие — до 4 мм включ., средние — свыше 4 до 8 мм включ., широкие — свыше 8 мм;

по длине на:

короткие — от 12 до 20 мм включ., средние — свыше 20 до 30 мм включ.; длинные — свыше 30 мм.

3. Шкурки должны быть:

сняты пластом путем ровного продольного разреза по средней линии горла и черева, с сохранением площади шкурки с головы до конца хвоста и с ножек до копыт;

без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;

очищены от прирезей мяса, жира, сухожилий, хрящей из ушей, хвоста и ножек;

законсервированные сухо-соленым или квашеным способами. Шкурки, законсервированные сухо-соленым способом, должны быть хорошо обезжирены, без повреждений корней волос, очищены от грязи, крови с мездры и волоса, симметрично расправлены, без складок на самой шкурке и конечностях.

Шкурки, законсервированные способом квашения, должны быть хорошо проквашены хлебными квасами, иметь белую, без каких-либо пятен мездру, симметрично расправлены без складок, бугров и морщин. Волосяной покров должен быть хорошо очищен от квасов, мучной пыли и других загрязнений.

4. (Исключен, Изм. № 2).

5. В зависимости от площади шкурки каракуля подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2*

Размер	Площадь шкурок, см ²	
	сухо-соленых	квашеных
Крупный	Св. 1400	Св. 1250
Средний	Св. 900 до 1400 включ.	Св. 800 до 1250 включ.
Мелкий	От 700 до 900 включ.	От 650 до 800 включ.
Особо мелкий	От 500 до 700 включ.	От 450 до 650 включ.

6. Чистопородный черный каракуль подразделяют на группы и сорта в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Группа	Сорт	Наименование сорта каракуля	Характеристика группы каракуля
Жакетная	Отборный	Жакет I	Преобладание полу-круглых вальковатых и бобастых завитков с от-
	Первый	Жакет I Кирпук Жакет толстый	

* Табл. 1 (Исключена, Изм. № 2).

Продолжение табл. 3

Группа	Сорт	Наименование сорта каракуля	Характеристика группы каракуля
Кавказская	Второй	Жакет московский Жакет II	четко выраженным общим рисунком
	Первый	Кавказский толстый I	Завитки преимущественно бобастой формы с некоторой пересложностью волоса
	Второй	Кавказский тонкий I Флера	
Ребристо-плоская	Первый	Ребристый тонкий I Ребристый толстый I Плоский тонкий I	Преобладание гравий и ребристых вальцов или плоских завитков
	Второй	Ребристый толстый II Ребристый тонкий II Плоский II Крупнозавитковый	
—	Третий	Партионный Кавказский тонкий III Кавказский толстый III Плоский III Ребристый тонкий III Ребристый толстый III Фигура	—

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Сортность чистопородного черного каракуля определяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосистого покрова, типа завитков и кожевой ткани
Жакетная	Отборный	Жакет I	Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, полукруглые вальцы, средние по ширине, длинные и средние по длине. Рисунок четкий параллельно-концентрический или параллельно-прямой. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
	Первый	Жакет I	Густой, шелковистый, блестящий. На всей площади шкурки плотные, упругие, средние по ширине длинные вальцы или на огузке и хребте средние по ширине длинные и средние по длине завитки, переходящие на боках в средние по длине вальцы. Допускается незначительное количество гравий. Кожевая ткань тонкая или утолщенная

Продолжение табл. 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика водосяного покрова, типа завитков и кожевой ткани
Кавказская	Второй	Кирпук	Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте упругие, длинные и средние по длине узкие вальки впереди между узкими гравиками, переходящими на боках в короткие узкие вальки или гравики. Кожевая ткань тонкая
		Жакет толстый	Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте плотные, упругие, широкие, длинные, средние и короткие вальки, переходящие на боках в короткие вальки и боб с незначительным количеством гравиков. Кожевая ткань утолщенная или толстая
		Жакет Московский	Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте недостаточно плотные и упругие вальки, средние по ширине и длине, переходящие на боках в короткие вальки и боб, допускается незначительное количество гравиков. Кожевая ткань тонкая
		Жакет II	Недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. На огузке и хребте средние по длине и ширине, недостаточно плотные и упругие вальки, переходящие на боках в слабозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное количество гравиков. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
	Первый	Кавказский толстый I	Густой, шелковистый, блестящий, несколько переросший. На огузке и хребте в преобладающем количестве плотные и недостаточно плотные широкие, средние и короткие вальки с незначительным количеством гравиков, переходящие на боках в короткие вальки и боб, а также плотный боб по всей площади шкурки. Кожевая ткань толстая
	Второй	Кавказский тонкий I	Густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий, несколько переросший. На огузке и хребте недостаточно плотные, средние по ширине короткие вальки, переходящие на боках в средний боб, гравики или кольцо. Кожевая ткань утолщенная
	Флера	—	Недостаточно густой, слабошелковистый, слабо блестящий. Завитки в основном мелкие. На огузке и хребте недостаточно

Продолжение табл. 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосистого покрова, типа завитков и кожевой ткани
Ребристо-плоская	Первый	Ребристый тонкий I	Статочно упругие, средние или узкие короткие вальки, иногда вперемежку с грибками, переходящие на боках в кольцо или горошек, или боб на огузке и хребте, переходящий на боках в кольцо и горошек. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
		Плоский тонкий I	Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте упругие, узкие и средние по ширине, длинные и средние по длине ребристые вальки или грибки, а также шкурки с такими же завитками, вперемежку с полукруглыми вальками. На боках средние и короткие по длине ребристые вальки и грибки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
		Плоский толстый I	Густой, шелковистый, блестящий. На огузке и хребте средние по ширине, длинные и средние по длине плоские вальки вперемежку с плоскими грибками, переходящие на боках в короткие плоские вальки и грибки. Кожевая ткань тонкая или утолщенная
		Ребристый толстый I	Густой, шелковистый, блестящий. На основной площади широкие, длинные, средние и короткие ребристые вальки или грибки, а также шкурка с такими же завитками вперемежку с полукруглыми вальками. На боках широкие, средние и короткие по длине грибки и ребристые вальки вперемежку с бобом. Кожевая ткань толстая
Ребристо-плоская	Второй	Ребристый тонкий II	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки узкие и средние, недостаточно плотные грибки или грибки на огузке и хребте вперемежку с неполно завитыми вальками и ласами на боках. Кожевая ткань тонкая или утолщенная

Продолжение табл. 4

Группа	Сорт	Наименование сорта	Характеристика волосистого покрова, типа завитков и кожевой ткани
Третий		Ребристый толстый II	Густой или недостаточно густой, слабошелковистый, недостаточно блестящий. Завитки крупные, широкие гравики по всей площади или гравики на огузке и хребте, переходящие на боках в более крупные гравики и ласы. Кожевая ткань толстая
		Крупнозавитковый	Густой, шелковистый или малошелковистый, блестящий или слегка стекловидно-блестящий. На огузке и хребте широкие, несколько придавленные короткие вальки вперемежку с крупными бобами или широкими гравиками, переходящими на боках в короткие гравики и придавленный боб. Кожевая ткань толстая
		Плоский II	Недостаточно густой, шелковистый, блестящий. На огузке плоские вальки и гравики, переходящие на хребте в еще более плоские вальки, а на боках в ласы. Мездра тонкая или утолщенная
			Густой и недостаточно густой малошелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый. На огузке слабоупругие или рыхлые широкие короткие вальки, разных размеров бобы, гравики, кольца. На хребте и боках расплетистые гравики, кольца, штопор, горошек и ласы

Примечание. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее наименование сорта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. В зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки каракуля подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

9. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:
на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая».

10. Шкурки каракуля принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

11. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида и размерам.

12. Площадь шкурки определяют путем умножения ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину посередине шкурки (черт. I приложения 1).

13. Упаковка и маркировка шкурок каракуля — по ГОСТ 13223—67.

14. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

15. Шкурки каракуля транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

9—15. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

Таблица 5

Наименование порока	Группа	
	первая	вторая
Деформация волосяного покрова (залеченный волос, завитки неясно выраженной формы — волюкообразные, вихрастые, сильно прижатые), см ² :		
на осужке и хребте	До 80 включ.	Св. 80 до 150 включ.
на других частях шкурки	До 120 включ.	Св. 120 до 250 включ.
Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте, ножках, общей длиной, см	Св. 5 до 20 включ.	Св. 20 до 50 включ.
Дыры, вытертые места, выхваты с краев, общей площадью, см ²	До 40 включ.	Св. 40 до 120 включ.
Отсутствие частей шкурки	Головы или хвоста	Головы с шеей
Молеедина, тавро несмыываемое, ржавое пятнисто, кожеедина, общей площадью, см ²		
Разрез неправильный	Не допускается	До 120
Плешинка, прелина, теклюсть волоса, ороговение кожевой ткани, комовая сушка, гаря жировая	Не допускается	Допускается
Не допускается	Не допускается	Не допускается

Приложения:

1. Разрывы, ломины, швы, подрезы, кроме находящихся на голове, хвосте и ножках, общей длиной до 5 см пороком не считаются.


2. Характеристика пороков приведена в справочном приложении 2.

3. Головоахость (без признаков прелин) пороком не считаются.


(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Справочное

Контуры правильно снятой и расправленной каракульской шкурки и места измерений шкурки для определения площади



Черт. 1
Топография каракульской шкурки



1 — огурок (крестец); 2 — хребет (спина);
3 — бока; 4 — шея; 5 — голова; 6 — края
(чрево); 7 — хвост; 8 — сухой придаток
хвоста; 9 — задние ножки; 10 — передние
ножки; 11 — пахи; 12 — скакательные су-
ставы.

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Наименование порока	Характеристика порока
Вытертое место	Участок шкурки, частично или полностью лишенный волосяного покрова в результате механического воздействия
Выхваты краев	Вырезы или отрывы краев частей шкурок, имеющих товарную ценность
Орогование кожевой ткани	Орогование и ломкость кожевой ткани в результате ее сильного обезвоживания при сушке на солнце, около горячей печи или в сушилках при высокой температуре
Дыра	Сквозной разрез с потерей площади или вырез части шкурки
Комовая сушка	Шкурки, высушенные в нерасправленном состоянии
Кожеедина	Поражение участков шкурки жуками-кожеедами и их личинками
Ломины	Трещины на лицевой стороне кожевой ткани из-за сильного натяжения или резкого перегиба шкурки
Молеедины	Повреждения волосяного покрова или кожевой ткани шкурки (эпидермиса) личинками моли
Разрезы, прорези и подрезы	Линейные отверстия в кожевой ткани без потери площади шкурки или подрезы кожевой ткани глубиной более 1/3 толщины кожевой ткани
Прелины и теклость волоса	Разложение кожевой ткани шкурок в результате запоздалого или неправильного консервирования, а также хранения в сыром помещении. Как правило, это сопровождается теклостью (выпадением) волос
Плешина	Участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, парша, стригущий лишай и др.), небрежной первичной обработки или неправильного хранения шкурки
Разрез неправильный	Разрез шкурки при съемке ее с животного, проведенный правее или левее белой линии живота
Ржавое пятно	Сквозное или проникающее глубоко внутрь кожевой ткани шкурки темно-коричневое пятно, проявляющееся в результате длительного соприкосновения влажного сырья с металлическими предметами. Поверхностные ржавые пятна со стороны кожевой ткани, счищаемые ножом, пороком не считаются
Тавро (несмыываемое)	Метка, нанесенная на волосяной покров шкурки масляной краской или гудроном
Гарь жировая	Ломкость кожевой ткани зажиренной шкурки вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры

(Измененная редакция, Изд. № 3).

Редактор *A. A. Зимовнова*

Технический редактор *M. M. Герасименко*

Корректор *L. B. Сницарчук*

Сдано в наб. 19.12.86 Подп. в печ. 29.04.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,73 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 439.