

СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12419—66
Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ШКУРКИ КОЛОНКА И СОЛОНГОЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ Kolinsky and solongoi skns undressed	Взамен ГОСТ 6372—52 и ГОСТ 6487—53 Группа С82

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки колонка и солонгоя (горного колонка) из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки колонка имеют волосяной покров рыжевато-желтого цвета, а шкурки солонгоя — с более низким волосяным покровом песочно-желтого цвета.

3. Шкурки колонка и солонгоя должны быть сняты чулком с головы, с закрытым огузком или трубкой, с сохранением меха головы (с носиком), лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, хрящей и сухожилий, костей из лап и хвоста; очищены от грязи и запекшейся крови с мездры и волоса; оправлены мездрай наружу на правилах установленной формы с отношением ширины шкурки к ее длине 1:8 (для шкурок колонка) и 1:7 (для шкурок солонгоя) и законсервированы пресно-сухим способом; мездра должна быть хорошо обезжирена без повреждения корней волос.

4. В зависимости от качества волосяного покрова и районов распространения колонка шкурки подразделяются по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наменование кряжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездры
1. Амурский	Амурская область, кроме Джалтулакского, Зейского и Тыгдинского районов; Приморский край; Амурский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, им. Лазо, Нанайский, Ульчский, Хабаровский районы Хабаровского края и Еврейская автономная область	Густой, высокий, грубоватый
Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 17/XII 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.

Продолжение

Наименование краяжей	Главные районы распространения	Характеристика волосяного покрова и мездра
2. Тобольский	Новосибирская, Томская, Тюменская, Омская, Свердловская, Курганская и Челябинская области	Высокий, густой и малошёлковистый. Мездра плотная и менее плотная
3. Башкирский	Башкирская АССР; Татарская АССР; Пермская область	Менее густой, мездра плотная
4. Енисейский	Красноярский и Алтайский края; Тувинская АССР; Кемеровская область; Казахская ССР	Высокий, шелковистый. Мездра менее плотная
5. Якутский	Якутская АССР; Бадайбинский, Братский, Жигаловский, Катанский, Качугский, Казачинский, Ленский, Киренский, Нижне-Илимский, Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Нижнеудинский районы Иркутской области; Каларский, Тунгокоченский, Тунгиро-Олекминский районы Читинской области; Джелтулакский и Зейский районы Амурской области; Хабаровский край, кроме районов, указанных в Амурском крае; Северо-Байкальский и Баунтовский районы Бурятской АССР	Густой, шелковистый. Мездра плотная
6. Забайкальский	Иркутская, Читинская области и Бурятская АССР, кроме районов, указанных в Якутском крае; Тыглишский район Амурской области	Густой, малошёлковистый. Мездра плотная

Примечание. Шкурки, поступившие из районов, не перечисленных в табл. 1, относятся к тому краю, которому они соответствуют по качеству волосяного покрова.

Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

ГОСТ 12419-66

5. По размерам шкурки колонка и солонгоя должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование прядей	Площадь шкурок в см ²		
	Крупный	Средний	Мелкий
Шкурки колонка			
1. Амурский	Более 525	Более 425 до 525 вкл.	До 425 вкл.
2. Тобольский	Более 475	Более 350 до 475 вкл.	До 350 вкл.
3. Башкирский	Более 480	Более 380 до 480 вкл.	До 380 вкл.
4. Енисейский	Более 400	Более 325 до 400 вкл.	До 325 вкл.
5. Якутский	Более 340	Более 260 до 340 вкл.	До 260 вкл.
6. Забайкальский	Более 300	Более 225 до 300 вкл.	До 225 вкл.
Шкурки солонгоя			
	Более 250	Более 150 до 250 вкл.	До 150 вкл.

Примечание. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее от середины междуглазья (по средней линии хребта) до корня хвоста на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

6. В зависимости от качества волосяного покрова и мездры шкурки колонка и солонгоя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Сорта	Качество волосяного покрова и мездры шкурок	
	колонка	солонгоя
Первый	Полноволосый, развившийся, с высокой частотой остью и густым пухом. Мездра без синевы. Хвост пушистый	Полноволосый, развившийся, с частотой остью и густым пухом. Мездра чистая

Продолжение

Сорта	Качество волосинного покрова и мездры шкурок	
	коловка	солонгоя
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитившимися остью и пухом. Мездра с легкой синевой по хребту от огузка до половины шкурки. Хвост недостаточно опущен	Полуволосый, с недостаточно развитившимися и низкими остью и пухом. Мездра синеватая
Третий	Полуволосый со слабо развитившимися и низкими остью и пухом. Мездра синяя. Хвост слабо опущен	

7. В зависимости от наличия пороков шкурки подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	До 10,0 вкл.	10,1-20,0	20,1-50,0; шкурки, перерванные пополам
2. Дыры и выщерты места в процентах к общей площади шкурки	До 1,0	1,1-2,0	2,1-4,0
3. Плещиши в процентах к общей площа-ди шкурки	Не допускаются	До 1,0	1,1-2,0

Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

ГОСТ 12419-66

Продолжение

Пороки	Группы дефектов		
	Малый	Средний	Большой
4. Прострелы дробовые:			
шкурки колонка	От 2-5	6-8	9-12
шкурки солонгоя	До 3 вкл.	4-5	6-8
5. Признаки линьки	Не допускаются	Ранневесенние с редкотым водосяным покровом на боках или шейной части. Мездра утолщенная, с темной полоской у огузка	—

Приложение. Шкурки с дробовыми прострелами у колонка от 2 до 5, у солонгоя до 3, независимо от их количества на голове до шеи относятся к группе дефектов «малый»; шкурки колонка с прострелами от 6 до 8, а у солонгоя от 4 до 5, независимо от их количества на голове и шее относятся к группе дефектов «средний» при отсутствии пороков на остальной части шкурки.

8. На шкурках, относимых к группе дефектов «малый», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов.

На шкурках, относимых к группе дефектов «средний», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «малый».

На шкурках, относимых к группе дефектов «большой», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний», или одного порока группы дефектов «средний» и двух пороков группы дефектов «малый».

9. Шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы дефектов «большой», а также прелые, горелые, поврежденные молью оцениваются не более 25% стоимости первого сорта крупного размера.

10. Шкурки колонка и солонгоя весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом; летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха; раннеосенние с едва начавшими развиваться остью и пухом; шкурки детенышей с пухлявым волосом относятся к нестандартным.

11. Упаковку и маркировку шкурок колонка и солонгоя производят по ГОСТ 12266—66.

ТАБЛИЦА

оценки качества шкурок в процентах к стоимости шкурок первого сорта крупного размера (переноминирована Центросоюзом)

Колонок

Размеры шоколада	Сорт						Третий					
	Первый			Второй			Группы дефектов					
	Группы дефектов	Малый	Средний	Большой	Группы дефектов	Малый	Средний	Большой	Группы дефектов	Малый	Средний	Большой
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	56,3	50,7	42,2	28,1	37,5	33,8	28,1	18,8
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	37,5	33,8	28,1	18,8	25,0	22,5	18,8	12,5

Союз ГОИ

Размер шкуры	Сорта							
	Первый			Второй				
	Группы лефектов		Группы лефектов		Малый	Средний		
Нормальная	Малый	Средний	Большой	Нормальная				
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	50,0	45,0	37,5	25,0
Средний	75,0	67,5	56,3	37,5	37,5	33,8	28,1	18,8
Малый	50,0	45,0	37,5	25,0	25,0	22,5	18,8	12,5

Складки в процентах от затяжной стоимости шкурок колонка 1 и складки в процентах от стоимости хвоста — колонка 2: за нестандартную правку — 100; за отсутствие головы с шеей — 25,0.

РАЗРАБОТАН Центросоюзом

Начальник Главкоопжирсырье Потапов С. В.

Исполнитель ст. экономист-товаровед Лукашов Н. И.

ВНЕСЕН Центросоюзом

Член правления Центросоюза Потапов С. В.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом легкой промышленности Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Начальник отдела Богатов А. В.

Ст. инженер Берсенева З. К.

УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Шусева, 4.

Сдано в наб. 22/XII 1966 г. Подп. в печ. 6/1 1967 г. 0,5 п. л. Тир. 10000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лигин пер., 6. Зак. 3035

Контр. ЭКЗ.

Изменение № 1 ГОСТ 12419—66 Шкурки колонка и солонгоя невыделанные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.08.88 № 3001

Дата введения 01.02.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия», «Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 98 7883.

Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки прелые, го-

(Продолжение изменения к ГОСТ 12419—66)

релые, поврежденные молью, шкурки весенние и поздневесенние с сильно поредевшим волосяным покровом или выпадающим волосом, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, раннеосенние с едва начавшимися развииваться остью и пухом, шкурки детенышей с пухлявым волосяным покровом относят к нестандартным».

Пункт 10 исключить.

Приложение. Таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Нестандартные шкурки оценивают не более 25 % качества шкурок первого сорта крупного размера группы дефектов «нормальная».

(ИУС № 12 1988 г.)