

Семена деревьев и кустарников  
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ

Seed of trees and shrubs.  
Methods for determination  
of germination

ГОСТ  
13056.6-75\*

Взамен  
ГОСТ 13056.6-68

ОКСТУ 9709

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 5 марта 1975 г. № 584 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.06.85 № 1720  
срок действия продлен

до 01.01.91

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на семена деревьев и кустарников, предназначенные для посева, и устанавливает методы определения всхожести.

**1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ**

1.1. Всхожесть семян — способность семян образовывать нормально развитые проростки. Энергия прорастания семян — способность семян быстро и дружно прорастать.

1.2. Всхожесть и энергию прорастания определяют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и выражают процентом нормально проросших семян от общего количества семян, взятых для испытания.

1.3. Нормально проросшие семена — семена, развиившие здоровые корешки длиной не менее длины семени, а у саксавала и солянки — полностью развернувшиеся, тронувшиеся в рост и увеличившиеся по длине здоровые зародыши.

П р и м е ч а н и е. При проращивании семян дуба черешчатого, конского каштана обыкновенного и ореха грецкого в сосудах или ящиках к нормально проросшим семенам относят также семена, наклонувшиеся в день окончательного учета.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (октябрь 1987 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1985 г.  
(ИУС 9-85).

1.4. Ненормально проросшие семена — семена, у которых корешки к установленному дню подсчета всхожести не достигли степени развития корешков нормально проросших семян; семена, проростки которых имеют ненормально увеличенные семядоли и укороченные корешки; семена, проросшие со стороны, противоположной кончику корешка, с уродливыми или поврежденными корешками или ростками.

1.5. Здоровые семена — семена, которые к установленному дню подсчета всхожести не проросли, но имеют здоровый вид и характерные для данного вида состояние и окраску зародыша и эндосперма по ГОСТ 13056.8—68.

1.6. Твердые семена (у бобовых) — семена, которые в лабораторных условиях определения всхожести остались ненабухшими и не изменили внешнего вида.

1.7. Запаренные семена — семена, потерявшие всхожесть после пребывания в условиях повышенной температуры и влажной среды. К запаренным (у хвойных) относят семена с упругим водянисто-серым (стекловидным) или бурым эндоспермом и мертвым зародышем белого цвета.

1.8. Загнившие семена — семена с мягким разложившимся эндоспермом или семядолями, с загнившим зародышем, с частично или полностью загнившим корешком.

1.9. Беззародышевые семена — семена, не имеющие зародыша по биологическим причинам.

1.10. Зараженные энтомологическими вредителями семена — семена, внутри которых находится вредитель в любой фазе развития (личинки, куколки, взрослого насекомого).

## 2. ОТБОР ПРОБ

2.1. После проведения анализа семян на чистоту по ГОСТ 13056.2—67 из чистых семян, тщательно их перемешивая, производят подряд без выбора отбор проб для определения всхожести семян.

Если образец семян представлен только для определения всхожести, из него выделяют навеску, из навески — чистые семена, из чистых семян отбирают пробы для определения всхожести.

2.2. Количество проб по 100 семян в каждой для определения всхожести указано в приложении.

2.3. При возникновении разногласий, а также при проверке соблюдения требований государственных стандартов для определения всхожести семян одновременно производят два анализа с количеством проб в каждом анализе, установленным для семян исследуемого вида.

2.4. Пробы семян для одного анализа отбирают из чистых семян первой навески, выделенной из образца, а пробы для параллельного анализа отбирают из чистых семян второй навески, выделенной из остатка образца семян.

### 3. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

3.1. Для проведения испытания применяют:

- аппараты для проращивания семян на свету;
- термостаты суховоздушные;
- ящики деревянные и металлические оцинкованные сосуды с отверстиями 0,3—0,5 см в дне и стенках;
- регулятор температуры автоматический — для поддержания переменной температуры;
- приставка постоянной температуры или устройство усилительное для контактных термометров и термоконтакторов УКТ-4 У2— для поддержания постоянной температуры;
- счетчик-раскладчик, приспособленный для раскладки семян деревьев и кустарников или пинцет;
- чашки Петри по ГОСТ 25336—82;
- подкладки круглые из белой фланели или байки с фитилями;
- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—76;
- песок кварцевый;
- опилки;
- крошка торфяная;
- спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962—67 или спирт этиловый питьевой 95%-ный по ГОСТ 5963—67. Допускается использовать спирт этиловый технический (гидролизный) по ГОСТ 17299—78;
- индиокармин;
- калий йодистый по ГОСТ 4232—74;
- йод по ГОСТ 4159—79;
- тетразол (2, 3, 5-трифенилтетразолий хлорид).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

4.1. Дно, внутренние стенки и подносы аппаратов и дно сосудов и ящиков, предназначенных для проращивания семян, промывают водой и обдают кипятком. Непосредственно перед раскладкой семян верхнюю часть подноса перед размещением на ней круглых подкладок с фитилями протирают спиртом. Перед проращиванием семян в термостате его камеру и полки протирают спиртом.

Стеклянные колпачки и чашки Петри моют в горячей воде и насухо вытирают чистым полотенцем. В тех случаях, когда проращи-

вают зародыши, извлеченные из семян, внутренние стенки стеклянных колпачков протирают спиртом.

Подкладки с фитилями дезинфицируют кипячением в воде не менее 10 мин непосредственно перед раскладкой семян на проращивание. После употребления подкладки несколько раз промывают в воде и дважды кипятят. После первого кипячения воду сливают, подкладки заливают чистой водой и снова кипятят, а затем высушивают.

4.2. Мыть аппарат для проращивания семян и менять в нем воду необходимо не реже одного раза в неделю. Температура воды при смене должна быть не ниже 18—20°C. Уровень воды в аппаратах поддерживают на 2—3 см ниже ложа для семян. Одновременно со сменой воды в аппаратах производят замену ложа для проращивания семян в случаях его заплесневения или подсыхания. Два раза в год, перед началом массового поступления образцов на анализ и после окончания массовой проверки семян, все аппараты для проращивания семян тщательно очищают металлическими мочалками или жесткими щетками и моют.

4.3. Песок просеивают через решето с отверстиями диаметром 1,0 мм. Оставшийся на решете песок промывают и прокаливают. Прокаливание песка заканчивают, когда полоска бумаги, помещенная в песок, обугливается. При повторном использовании песок опять просеивают и прокаливают.

4.4. Фильтровальную бумагу нарезают по размеру стеклянного колпачка или чашки Петри и укладывают на круглые подкладки в два-три слоя.

Ложе допускается приготавливать из кружков фильтровальной бумаги в два-три слоя — для семян со сроком проращивания 3, 5, 7, 10 дней и в три-четыре слоя — для семян со сроком проращивания более 10 дней. В качестве фитиля применяют полоски фильтровальной бумаги в два слоя.

Фильтровальную бумагу, песок, опилки, торфянную крошку увлажняют непосредственно перед раскладкой семян на проращивание. Фильтровальную бумагу увлажняют, спуская ее в свежекипяченую воду, и затем дают стечь избытку воды. Песок, опилки, торфянную крошку увлажняют до 60% полной влагоемкости, обдавая их кипятком. При этом из песка при сжатии его в руке вода не выделяется, а из опилок или торфянной крошки вода должна выступать медленно, каплями; при разжатии руки песок, опилки или торфянная крошка должны сохранять приданную им форму.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Всхожесть и энергию прорастания семян определяет проращиванием.

5.2. Чистые семена подготавливают к проращиванию и прорашивают в соответствии с условиями определения всхожести (см. приложение).

5.3. Скарифицируют семена в сухом состоянии только со стороны, противоположной корешку зародыша. Допускается перед скарификацией семена промыть в проточной воде и подсушить до состояния сыпучести.

5.4. Семена, проращиваемые без предварительного намачивания, допускается непосредственно перед проращиванием промывать. Промывают семена на металлической сетке проточной водой в течение нескольких секунд.

5.5. Семена намачивают в воде, имеющей температуру 18—20°C. При намачивании семян в течение двух и более суток ежедневно меняют воду. Установленный срок намачивания плодов и семян может быть изменен в зависимости от степени их набухания.

5.6. По истечении срока намачивания семена промывают водой три-четыре раза и раскладывают счетчиком-раскладчиком или пинцетом на ложе для проращивания так, чтобы они не соприкасались между собой. На одно ложе раскладывают 100 семян, а если они не помещаются — 50 или 25 семян и менее. Семена фисташки настоящей и дуба черешчатого раскладывают на ложе в аппарате для проращивания поверхностью среза вниз. При проращивании семян дуба черешчатого, конского каштана обыкновенного и ореха грецкого в сосудах или ящиках семена раскладывают рядами, отделяя один ряд от другого слоем песка, опилок или торфяной крошки.

5.7. Мелки и средней крупности сыпучие семена (хвойные, бобовые, плодовые семечковые и т. п.) раскладывают на ложе для проращивания счетчиком-раскладчиком, несыпучие семена всех видов и крупные сыпучие семена раскладывают на ложе для проращивания пинцетом.

5.8. Семена, которые по условиям определения всхожести (см. приложение) перед проращиванием намачивают или промывают в проточной воде, перед раскладкой счетчиком-раскладчиком подсушивают до состояния сыпучести.

5.9. При раскладке семян счетчиком-раскладчиком применяют насадки с числом отверстий на рабочей поверхности:

100 — для семян пузыреплодника, жимолости, шелковицы, ели, сосны и семян других видов, близких к ним по размерам;

50 — для семян лиственницы, биоты, караганы, робинии, облепихи и других близких к ним по размерам.

Насадки должны иметь отверстия диаметром в миллиметрах:

0,4 — для семян пузыреплодника;

0,5—0,6 — для семян жимолости и шелковицы;

0,7—0,8 — для семян ели и сосны;

1,0—1,2 — для семян лиственницы;

1,4 — для семян биоты, караганы, облепихи, робинии.

5.10. Для раскладки семян счетчиком-раскладчиком сухие или подсушенные семена после тщательного их перемешивания насыпают совочком на рабочую поверхность насадки не включенного в электросеть счетчика-раскладчика. Затем включают счетчик-раскладчик, наклоняют насадку набок, удаляют пинцетом лишние семена и добавляют по одному семени в незанятые отверстия насадки.

5.11. Переносят семена с рабочей поверхности насадки на ложе для проращивания одним из указанных ниже способов:

насадку с семенами подносят к заранее подготовленному ложу и выключают прибор;

сверху на насадку с семенами укладывают влажные кружки фильтровальной бумаги и, как только бумага плотно притягивается, счетчик-раскладчик выключают, а кружки фильтровальной бумаги с семенами пинцетом переносят на приготовленные подкладки с фитилями.

5.12. Для удаления влаги с рабочей поверхности насадки ее протирают сухим чистым полотенцем или сухим ватным тампоном. После раскладки семян одного образца рабочую поверхность насадки счетчика-раскладчика, совочек и пинцет протирают спиртом.

5.13. Каждую пробу семян нумеруют. На колпачке или чашке Петри первой пробы карандашом по стеклу проставляют номер образца семян и дату раскладки семян на проращивание. На всех кружках фильтровальной бумаги простым карандашом проставляют номер образца семян и порядковый номер пробы семян.

5.14. При проращивании семян в сосудах или ящиках номер образца семян, порядковый номер пробы и дату закладки семян проставляют на каждом сосуде или ящике. Сосуды и ящики накрывают стеклянными пластинками.

5.15. При проращивании семян необходимо:

поддерживать определенную температуру в аппаратах и термостатах (см. приложение), проверяя ее в течение рабочего дня три раза (при переменной температуре — в начале, середине и конце первого режима работы автоматического регулятора температуры; при постоянной — в начале, середине и конце рабочего дня);

проверять увлажненность ложа (подкладок с фитилями, фильтровальной бумаги, песка, опилок, торфяной крошки), не допуская его подсыхания и переувлажнения;

промывать семена и заменять ложе для проращивания при появлении плесени на ложе и семенах;

при промывке семян воду менять до прекращения ее помутнения;

не допускать снижения температуры в помещении, где проращивают семена, ниже 15°C.

5.16. Началом проращивания считают день, следующий за днем раскладки семян. Окончанием проращивания считают день учета всхожести семян, указанный в приложении.

5.17. Учет результатов проращивания производят в дни, установленные для семян соответствующих видов (см. приложение). Допускается производить дополнительные промежуточные учеты результатов проращивания семян с обязательной отметкой об этом в карточке анализа.

5.18. Каждый день учета нормально проросшие и явно загнившие семена удаляют с ложа и отмечают в карточке анализа отдельно по каждой пробе количество семян:

нормально проросших, удаленных с ложа;

явно загнивших, удаленных с ложа;

непроросших, оставленных на ложе.

Перед выемкой семян с отдельного ложа кончик пинцета протирают ватным тампоном, смоченным в спирте.

5.19. В день окончательного учета всхожести (см. приложение) оставшиеся на ложе семена отдельно по каждой пробе взрезывают вдоль зародыша, определяют число здоровых, ненормально проросших, твердых (у бобовых), загнивших, запаренных (у хвойных), беззародышевых и пустых, зараженных энтомологическими вредителями семян, и полученные данные заносят в карточку анализа.

По окончании проращивания семян в сосудах или ящиках семена выбирают на сито, промывают водой, производят учет всхожести и результаты отмечают в карточке анализа.

Если на день окончательного учета осталось более 30% непроросших полнозернистых семян, то зародыши непроросших семян первой пробы окрашивают индигокармином по ГОСТ 13056.7—68.

5.20. Разрешается снятие семян до окончания срока проращивания, установленного настоящим стандартом (см. приложение), с обязательной отметкой об этом в карточке анализа и в документе о качестве в случаях:

явного загнивания оставшихся непроросших семян;

достижения нижней нормы 1-го класса всхожести семян (только в течение 2 месяцев до начала весеннего сева и в течение всего периода весеннего сева), а для семян ильмовых, саксаула и солянки — независимо от сроков проверки.

5.21. Разрешается продолжить проращивание семян на 5—10 дней против установленного настоящим стандартом срока, если на окончательный день учета процент всхожести оказался ниже предельной нормы кондиционности, но в сумме с процентом здоровых непроросших семян (при взрезывании) или жизнеспособных (при окрашивании) остатка первой пробы равен или больше этой нормы. В этом случае окончательный подсчет всхожести производят по результатам проращивания оставшихся проб (без учета результатов первой пробы).

## 6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Всхожесть, энергию прорастания и все категории непроросших семян вычисляют как среднее арифметическое результатов проращивания отдельных проб семян и выражают в процентах. Вычисления производят с точностью до целых чисел.

6.2. При определении всхожести семян расхождения между результатами проращивания семян отдельных проб должны быть не более указанных в табл. 1.

Таблица 1

Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, % при проращивании		Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, % при проращивании	
	четырех проб по 100 семян	трех проб по 100 семян		четырех проб по 100 семян	трех проб по 100 семян
99; 2	5	4	81—83; 18—20	15	14
98; 3	6	5	78—80; 21—23	16	15
97; 4	7	6	77; 24	17	15
96; 5	8	7	73—76; 25—28	17	16
95; 6	9	8	71—72; 29—30	18	16
93—94; 7—8	10	9	67—70; 31—34	18	17
91—92; 9—10	11	10	64—66; 35—37	19	17
89—90; 11—12	12	11	56—64; 38—45	19	18
87—88; 13—14	13	12	51—55; 46—50	20	18
84—86; 15—17	14	13			

6.3. Для определения допускаемых расхождений вычисляют с точностью до целого числа средний арифметический процент всхожести из числа всех проб, взятых для проращивания, и затем по среднему арифметическому проценту всхожести находят в табл. 1 в зависимости от числа исследованных проб допускаемое расхождение. Затем определяют максимальное фактическое расхождение между показателями всхожести крайних по величине проб и сравнивают его с допускаемым.

**Пример.** Всхожесть семян отдельных проб оказалась равной 76; 80; 81; 87 %, а средняя всхожесть — 81 %. Для средней всхожести 81 % максимально допускаемое расхождение составляет 15 %, а максимальное фактическое расхождение — 11 % (87—76).

Вывод: анализ повторять не следует.

6.4. Определение всхожести повторяют:

а) при расхождении результатов проращивания отдельных проб на величину, большую, чем допускаемое расхождение. Если при повторном определении результаты проращивания отдельных проб окажутся в пределах допускаемых расхождений, то процент всхожести, энергию прорастания и всех категорий непроросших семян вычисляют по данным последнего определения. Если при пов-

торном определении всхожести расхождения между результатами проращивания отдельных проб снова окажутся больше допускаемого, то средние арифметические проценты всхожести, энергии прорастания и всех категорий непроросших семян вычисляют по результатам двух определений, т. е. по восьми или шести пробам;

б) при получении всхожести семян ниже нормы 3-го класса на 5% и менее. Если при повторном определении всхожесть снова оказалась ниже нормы 3-го класса, процент всхожести, энергии прорастания и всех категорий непроросших семян вычисляют как среднее арифметическое результатов двух определений, т. е. по восьми или шести пробам. Если при повторном определении семена по всхожести окажутся кондиционными, то процент всхожести, энергии прорастания и всех категорий непроросших семян вычисляют по данным последнего определения.

6.5. При определении всхожести по двум анализам из одного и того же образца расхождения между средними арифметическими показателями всхожести семян каждого анализа должны быть не более указанных в табл. 2. В этом случае окончательный процент всхожести, энергии прорастания и всех категорий непроросших семян определяют как среднее арифметическое результатов проращивания семян двух анализов, т. е. по восьми или шести пробам. Если расхождение между показателями всхожести семян двух анализов превышает допускаемое, то проращивание следует повторить еще один раз. В этом случае проценты всхожести, энергии прорастания и всех категорий непроросших семян вычисляют по данным повторного определения.

Таблица 2

Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, %	Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, %
98—99; 2—3	2	77—84; 17—24	6
95—97; 4—6	3	60—76; 25—41	7
91—94; 7—10	4	51—59; 42—50	8
85—90; 11—16	5		

**Пример.** Всхожесть семян первого анализа (из четырех или трех проб по 100 семян) составила 86%, всхожесть семян второго анализа этого же образца — 90%; средний арифметический процент всхожести из двух анализов — 88%. Для средней всхожести 88% допускаемое расхождение составляет 5%, фактическое — 4% (90—86).

Вывод: повторное проращивание производить не следует.

6.6. При сравнении всхожести семян двух образцов от одной и той же партии семян расхождения между показателями всхожести семян двух анализов должны быть не более указанных в табл. 3.

Таблица 3

Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, %	Среднее арифметическое всхожести, %	Допускаемое расхождение, %
99; 2	2	82—86; 15—19	7
97—98; 3—4	3	76—81; 20—25	8
94—96; 5—7	4	70—75; 26—31	9
91—93; 8—10	5	60—69; 32—41	10
87—90; 11—14	6	51—59; 42—50	11

**Пример.** Всхожесть семян первого образца составила 92 %, а всхожесть семян второго образца от той же партии семян — 94%; средний арифметический процент всхожести семян двух образцов — 93%. Для средней всхожести 93% максимально допускаемое расхождение составляет 5%, а фактическое — 2% (94—92).

**Вывод:** оба анализа признаются правильными.

**Примечание.** При сравнении всхожести семян из образца, отобранным представителем контрольного органа, со всхожестью семян из образца, отобранного от этой же партии уполномоченным предприятием, допускаемое расхождение (по табл. 3) устанавливают по показателю всхожести семян образца, отобранным представителем контрольного органа.

## УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для пророщивания	Предварительная подготовка перед пророщиванием	Ложе для пророщивания	Температура пророщивания, °C	Освещенность	Дни очередных учетов результа-тов пророщива-ния	Срок опреде-ления, сут.		Примечания
							Энергия прораста-ния	Всхожесть	
1. Айлант высочай-ший (плоды) <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	3	Плоды намачива-ют на 18—24 ч и из-влекают семена	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	Допускается: перед освобожде-нием семян плоды не намачивать; извлеченные семе-на намачивать на 2—3 ч
2. Акация серебристая или мимоза се-ребристая <i>Acacia dealbata</i> Link	3	Семена скарифи-цируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	3; 5; 7	5	7	Допускается ска-рифицированные се-мена намачивать на 3 ч
3. Альбиция ленко-ранская или акация шелковая* <i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	3	То же	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30 20—24	С	3; 5; 7	5	7	То же
4. Аморфа кустар-никовая* <i>Amorpha fruticosa</i> L.	3	Семена извлекают из бобов, скарифи-цируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10	Допускается: скарифицирован-ные семена намачи-вать на 3 ч;

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результа-тов проращива-ния	Энергия прорасти-ния		
5. Аммодендрон Конноли <i>Ammodendron Connollyi</i> Bge.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	за 5 дней до окончания срока проращивания здоровые непроросшие семена скарифицировать Допускается скарифицированные семена намачивать на 3 ч.
6. Багряник китайский <i>Cercidiphyllum sinense</i> Rehd. et Wils.	4	Семена скарифицируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	3; 5; 7; 10; 15	5	15	То же
7. Багряник японский <i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb et Zucc.	4	То же	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	»
8. Береза белая китайская <i>Betula albo-sinensis</i> Burk.	4	»	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	25	—
9. Береза бородавчатая <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	3	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результа-тов проращива-ния	Энергия прорасти-ния	
10. Береза бумажная <i>Betula papyrifera</i> Marsh.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
11. Береза грабolistная <i>Betula grossa</i> Sieb. et Zucc.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
12. Береза даурская или черная дальневосточная <i>Betula dahurica</i> Pall.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
13. Береза пушистая <i>Betula pubescens</i> Ehrh.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15
14. Береза ребристая или желтая дальневосточная <i>Betula costata</i> Trautv.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
15. Береза Шмидта или железная <i>Betula Schmidtii</i> Rgl.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорацивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °С	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результатов прорашивания	Энергия прорастания	
16. Береза Эрмана или каменная <i>Betula Ermanii</i> Cham.	4	—	Апп, НБ	20→30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
17. Биота восточная <i>Biota orientalis</i> Endl.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	5; 7; 10; 15; 20	10	20
18. Бобовник аниги- ролистный или золотой дождь <i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	3	Семена скарифицируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20—24	С	2; 3; 5; 7	5	7
19. Болотный кипарис обыкновенный <i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30
20. Вяз гладкий (плоды) <i>Ulmus laevis</i> Pall.	3	Семена прорашивают в крылатках или извлеченные из крылаток	Апп, НБ	20→30	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорацивания	Предварительная под- готовка перед прораци- ванием	Ложе для прорацивания	Температура прорацивания, °C	Освещенность	Дни очередных учетов результа- тов прораци- вания	Срок опреде- ления, сут.	
							Энергия прораста- ния	Вско- жесть
21. Вяз листоватый, берест или карагач (плоды) <i>Ulmus foliacea</i> Gilib.	3	Семена извлекают из крылаток	Апп, НБ	20↔30	С 2; 3; 5; 7	3	7	Допускается семена перед прорациванием намачивать на 18—24 ч
22. Вяз перистоветвистый, туркестанский карагач (плоды) <i>Ulmus pinnato-gammosa</i> Dieck.	3	Семена прорашивают в крылатках или извлеченные из крылаток	Апп, НБ	20↔30	С 2; 3; 5	3	5	Допускается семена в крылатках или извлеченные из крылаток перед прорациванием намачивать на 18—24 ч
23. Вяз мелколистный (плоды) <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	3	То же	Апп, НБ	20↔30	С 2; 3; 5	3	5	То же
24. Вяз приземистый или ильмовник (плоды) <i>Ulmus pumila</i> L.	3	Семена в крылатках или извлеченные из крылаток промывают в проточной воде	Апп, НБ	20↔30	С 2; 3; 5; 7; 10	5	10	»
25. Вяз шершавый или ильм горный (плоды) <i>Ulmus scabra</i> Mill.	3	То же	Апп, НБ	20↔30	С 3; 5; 7; 10; 15	5	15	»
26. Гибискус изменчивый <i>Hibiscus mutabilis</i> L.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20↔30	С 7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40;	15	40	—

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут		Примечания	
						Дни очередных учетов результатов проращивания	Энергия прорастания		
27. Гибискус сирийский <i>Hibiscus syriacus</i> L.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
28. Гледичия обыкновенная <i>Gleditschia triacanthos</i> L.	3	Семена скарифицируют и намачивают на 6—18 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	2; 3; 5; 7	5	7	Допускается скарифицированные семена перед проращиванием не намачивать, а промыть в проточной воде
29. Дейция шершавая <i>Deutzia scabra</i> Thunb.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
30. Дрок испанский <i>Genista hispanica</i> L.	3	Семена скарифицируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	Допускается скарифицированные семена намачивать на 3 ч
31. Дрок красильный <i>Genista tinctoria</i> L.	3	То же	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	То же
32. Дуб черешчатый* <i>Quercus robur</i> L.	3	Желуди промывают в проточной воде, освобождают от кожуры и срезают $\frac{1}{3}$ семядолей со стороны, противоположной корешку зародыша	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	При внутрихозяйственной проверке и проверке выездными лабораториями допускается определять доброта-качество по ГОСТ 13056.8—68

Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результата проращивания	Энергия прорастания	
33. Ель аянская** <i>Picea jezoensis</i> Carr.	4	Желуди промывают в проточной воде и освобождают от семенной кожуры	П; О; К	20	Т	10	—	20
34. Ель восточная <i>Picea orientalis</i> (L.) Link.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	10	20
35. Ель Глена <i>Picea Glehni</i> Mast.	4	То же	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
36. Ель колючая <i>Picea pungens</i> Engelm.	4	»	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
37. Ель корейская <i>Picea koraiensis</i> Nakai	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
38. Ель сербская <i>Picea omorica</i> Purk.	4	То же	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
39. Ель сибирская** <i>Picea obovata</i> Ldb.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	10	20

В случае срочного высея или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорашивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °C	Оспецифичность	Срок определения, сут.		Примечания
						Энергия прорастания	Всхожесть	
40. Ель обыкновенная или европейская** <i>Picea excelsa</i> Link.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15	10	15
41. Ель тяньшанская** <i>Picea tianschanica</i> Rupr.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15, 20	10	20
41а. Ель Шренка** <i>Picea Schrenkiana</i> F. et. M.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	10	20
42. Ель Энгельмана <i>Picea Engelmanni</i> Engelm.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
43. Жарновец мельчатый <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm	3	Семена скарифицируют и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	5	15
44. Жимолость Максака <i>Lonicera Maackii</i> Maxim.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	15	30
45. Жимолость Рупрехта <i>Lonicera Ruprechtiana</i> Rgl.	4	То же	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	15	30

В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7-68

То же

»

—

—

—

—

—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результата проращивания	Энергия прорастания		
46. Жимолость съедобная <i>Lonicera edulis</i> Turcz, ex Freyn	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	15	30	—
47. Жимолость татарская <i>Lonicera tatarica</i> L.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	15	30	Всходость семян определяют через 1—2 месяца после их созревания
48. Ива (все виды) <i>Salix</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	1; 2; 3; 4; 5	2	5	—
49. Инжир, фильтровое дерево <i>Ficus carica</i> L.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
50. Кампсис укореняющийся <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	4	То же	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
51. Карагана древовидная или акация желтая <i>Caragana arborescens</i> Lam.	4	Семена промываются в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 25	7	20	Всходость семян определяют через 1—2 месяца после их созревания
52. Катальпа бигнониевидная (плоды) <i>Catalpa bignonioides</i> Walt.	3	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	—

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °С	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результата проращивания	Энергия прорастания		
53. Катальпа прекрасная (плоды) <i>Catalpa speciosa</i> Ward.	3	—	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	Допускается крылатки перед проращиванием семян намачивать на 18—24 ч
54. Кельрейтерия метельчатая <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	3	Семена скарифицируют с плоской стороны, намачивают на 24—48 ч и извлекают для проращивания зародыши	Апп, НБ	20⇒30	С	2; 3; 5; 7;	3	7	—
55. Кипарис аризонский <i>Cupressus arizonica</i> Greene	4	—	Апп, НБ	20—24	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
56. Кипарис вечнозеленый <i>Cupressus sempervirens</i> L.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
57. Кипарис Говена или калифорнийский <i>Cupressus Goveniana</i> Gord.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40	10	40	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч
58. Кипарис крупноплодный <i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40	15	40	—

Наименования видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результатов проращивания	Энергия прорастания		
59. Кипарис лузитанский* <i>Cupressus lusitana</i> Mill.	4	—	Апп, НБ	20—24 20 $\rightleftharpoons$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч
60. Кипарис надутый или гималайский <i>Cupressus torulosa</i> D. Don.	4	—	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40	15	40	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч
61. Кипарис плакучий <i>Cupressus funebris</i> Endl.	4	—	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40	15	40	То же
62. Кипарисовик горохоплодный <i>Chamaecyparis pisifera</i> Sieb. et Zucc.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40	15	40	—
63. Кипарисовик Лавсона* <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Andr.) Parl.	4	—	Апп, НБ	20—24 20 $\rightleftharpoons$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
64. Конский каштан обыкновенный <i>Aesculus hippocastanum</i> L.	3	Семена намачиваются на 3—5 суток	П, О, К	20	Т	10	—	20	При внутрихозяйственной проверке и проверке выездными лабораториями допускается определять доброкачественность по ГОСТ 13056.8—68

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная под- готовка перед проращи- ванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок опреде- ления, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результа- тов проращива- ния	Энергия прораста- ния		
65. Криптомерия японская <i>Cryptomeria japonica</i> Don.	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
66. Лагерстремия индийская <i>Lagerstroemia indica</i> L.	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
67. Леспедеца дву- цветная <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	4	Семена заливают горячей водой (70 °C) и оставляют в ней на 20 ч	Апп, НБ	20→30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
68. Лжетсуга сизая <i>Pseudotsuga glauca</i> Mayg	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
69. Лжетсуга тиско- листная <i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Poir.) Britt.	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
70. Ликвидамбар смолоносный или ам- бровое дерево <i>Liquidambar styraciflua</i> L.	4	То же	Апп, НБ	20→30	С	3; 5; 7; 10; 15	5	15	—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорашивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.			Примечания
						Дни очередных учетов результа-тов прорашива-ния	Энергия прораста-ния	Всхожесть	
70а. Лиственница амурская** <i>Larix amurensis</i> Kolesn.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
71. Лиственница Гмелина** <i>Larix Gmelinii</i> (Rupr) Carr.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
72. Лиственница европейская** <i>Larix decidua</i> Mill.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	То же
72а. Лиственница Каяндерса** <i>Larix Cajanderi</i> Mayr.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	»
72б. Лиственница Комарова** <i>Larix Komarovii</i> Kolesn.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	»
73. Лиственница сибирская** <i>Larix sibirica</i> Ldb.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	»

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результа-тов проращива-ния	Энергия прорасти-ния		
73а. Лиственница ольгинская** <i>Larix olgensis</i> A. Henzy.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	В случаях срочно-го высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
73б. Лиственница охотская** <i>Larix ochotensis</i> Kolesn.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	То же
74. Лиственница Сукачева** <i>Larix Sukaczewii</i> Djil.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	»
74а. Лиственница Чекановского** <i>Larix Czekanovskii</i> Szaf.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15	7	15	»
75. Лиственница японская** <i>Larix leptolepis</i> Gord.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	3	20	В случаях срочно-го высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68. Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная под- готовка перед проращи- ванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок опреде- ления, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результа- тов проращива- ния	Энергия прораста- ния	
76. Лох восточный <i>Elaeagnus orientalis</i> L.	3	Косточки намачи- вают на 4 суток, ос- вобождают семена и намачивают их еще на 2—3 ч, затем ос- вобождают от оболо- чек часть семени в области кончика ко- решка	Апп, НБ	20⇒30	C 2; 3; 5; 7	3	7	При необходимости допускается из- менять срок намачи- вания косточек и се- мян
77. Лох колючий <i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	3	То же	Апп, НБ	20⇒30	C 2; 3; 5; 7; 10	3	10	То же
78. Лох серебристый <i>Elaeagnus argentea</i> Pursh	3	»	Апп, НБ	20⇒30	C 2; 3; 5; 7; 10	3	10	»
79. Лох узколистный* <i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	3	»	Апп, НБ	20⇒30	C 2; 3; 5; 7; 10	3	10	»
		Семена, освобож- денные от косточек, намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	C 3; 5; 7; 10; 15	7	15	За пять дней до окончания проращи- вания у здоровых не- проросших семян ос- вобождают от оболо- чек часть семени в области кончика ко- решка

Наименования видов	Количество проб по 100 семян для прорашивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °C	Осерщенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						дни очередных учетов результа-тов прорацива-ния	Энергия прораста-ния		
80. Маакия амурская <i>Maackia amurensis</i> Purp. et Maxim.	3	Семена скарифицируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	Допускается скарифицированные семена намачивать на 3 ч
81. Маклюра оранжевая <i>Maclura aurantiaca</i> Nutt.	3	Семена намачивают на 24 ч, снимают верхнюю оболочку и семена снова намачивают на 2—18 ч, после чего снимают тонкую коричневую оболочку, извлекают зародыши и их прорашивают	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10	Допускается семена перед освобождением от верхней оболочки не намачивать
82. Облепиха крушиновая <i>Hippophae rhamnoides</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	7; 10; 15; 20; 25	10	25	Всходкость свежесобранных семян определяют не ранее 1 февраля. Разрешается выдача документа о качестве семян до 1 февраля при получении показателя всхожести 1-го или 2-го класса
83. Олеандр обыкновенный <i>Nerium oleander</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10	—

Наименования видов	Количество проб по 100 семян для прорашивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результатов прорашивания	Энергия прорастания	
84. Ольха пушистая <i>Alnus hirsuta</i> Turcz.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15
85. Ольха серая или белая <i>Alnus incana</i> (L.) Moench	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15
86. Ольха черная или клейкая <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15
87. Орех гречкий <i>Juglans regia</i> L.	3	Семена намачивают на 3—4 суток, затем у них ножом или настольными тискками приоткрывают половинки скорлупы и в образовавшуюся щель вставляют распорку (кусочек спички)	П, О, К	⇒ 20	Т	10	—	20
88. Осина <i>Populus tremula</i> L.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	1; 2; 3; 4; 5	2	5

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результатов проращивания	Энергия прорастания		
89. Османтус пахучий или маслина душистая <i>Osmanthus fragrans</i> (Thunb.) Lour.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10	—
90. Павловния войлочная <i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	4	—	Апп, НБ	20 30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
91. Паркинсония колючая <i>Parkinsonia aculeata</i> L.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
92. Пихта бальзамическая <i>Abies balsamea</i> Mill.	4	То же	Апп, НБ	20 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
93. Пихта белокорая или почкочешуйная <i>Abies nephrolepis</i> Maxim.	4	»	Апп, НБ	20 30	С	7; 10; 15; 20; 25	10	25	—
94. Пихта камчатская или тонкая <i>Abies gracilis</i> Kom.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результатов проращивания	Энергия прорастания	
95. Пихта сахалинская <i>Abies sachalinensis</i> Mast.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25	10	25
96. Пихта сибирская* <i>Abies sibirica</i> Ldb.	4	—	Апп, НБ	20⇒30 20—24	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20
								В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
97. Пихта цельнолистная <i>Abies holophylla</i> Maxim.	4	Семена намачиваются на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10; 15; 20; 25	10	25
98. Платан восточный <i>Platanus orientalis</i> L.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10
99. Платан западный <i>Platanus occidentalis</i> L.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10
100. Платан кленолистный <i>Platanus acerifolia</i> Willd.	4	—	Апп, НБ	20⇒30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10
								»

## Продолжение

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорацивания	Предварительная подготовка перед прорациванием	Ложе для прорацивания	Температура прорацивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов розуль гутов прорацивания	Энергия прорастания		
101. Пузыреплодник калинолистный <i>Physocarpus opulifolia</i> (L.) Maxim.	3	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20; 25	10	25	Всходжест семян определяют через 1—2 месяца после их созревания
102. Пузырник древовидный <i>Colutea arborescens</i> L.	4	Семена скарифицируют и промывают в проточной воде	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	Допускается скарифицированные семена намачивать на 3 ч
103. Ракитник ренсбургский <i>Cytisus ratisbonensis</i> Schaeff.	3	То же	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10	То же
104. Ракитник чернеющий <i>Cytisus nigricans</i> L.	4	Семена скарифицируют и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10	—
105. Робиния лжеакация или акация белая* <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	3	Семена перед прорациванием скарифицируют	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30 20—24	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10	Допускается скарифицированные семена: промывать в проточной воде; намачивать на 3 ч
106. Саксаул белый, песчаный (плоды)* <i>Halohylon persicum</i> Bge.	4	Плоды намачивают на 24—48 ч, затем освобождают зародыши и их прорачивают	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30 20—24	С	1; 2; 3	1	3	Допускается в условиях выездных лабораторий определять всходжест на аппаратах без подогрева, т. е. при комнатной температуре

Наименования видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °С	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результата проращивания	Энергия прорастания	
107. Саксаул черный солончаковый, безлистный (плоды)* <i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkw.) Iljin.	4	Плоды намачивают на 24—48 ч, затем освобождают зародыши и их проращивают	Апп, НБ	20→30 20—24	С 1; 2; 3	1	3	Допускается в условиях выездных лабораторий определять всхожесть ча аппаратах без подогрева, т. е. при комнатной температуре
108. Секвойя вечнозеленая <i>Sequoia sempervirens</i> Endl.	4	—	Апп, НБ	20→30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч
109. Секвойя гигантская <i>Sequoia gigantseum</i> Lindl.	4	—	Апп, НБ	20→30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	То же
110. Секуринега полукустарниковая <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С 5; 7; 10; 15; 25	7	20	Всхожесть семян определяют также по ГОСТ 12038—84
111. Сирень обыкновенная <i>Syringa vulgaris</i> L.	3	—	Апп, НБ	20—24	С 5; 10; 15; 20	15	20	—
112. Смирновия туркестанская <i>Smirnovia turkestanica</i> Bge.	4	Семена скарифицируют и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С 3; 5; 7; 10; 15	5	15	—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результата проращивания	Энергия прорастания		
113. Сосна алеппская <i>Pinus halepensis</i> Mill.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	В случаях срочного высея или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
114. Сосна Банкса** <i>Pinus Banksiana</i> Lamb.	4	—	Апп, НБ	20→30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
115. Сосна густоцветная <i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	7; 10; 15; 20; 20; 30	10	30	В случаях срочного высея или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
116. Сосна горная <i>Pinus montana</i> Mill.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	В случаях срочного высея или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
117. Сосна крючковатая <i>Pinus hamata</i> D. Sosn.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная под- готовка перед проращи- ванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °С	Освещенность	Дни очередных учетов результа- тов проращива- ния	Срок опреде- ления, сут.		
							Энергия прораста- ния	Всходжест- вие	
118. Сосна крым- ская* <i>Pinus Pallasiana</i> Lamb.	4	—	Апп, НБ	20⇒30 20—24	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизне- способность по ГОСТ 13056.7—68
119. Сосна Мурея <i>Pinus Murrayana</i> Balf.	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15, 20	7	20	—
120. Сосна обыкно- венная <i>Pinus silvestris</i> L.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизне- способность по ГОСТ 13056.7—68
121. Сосна погре- бальная <i>Pinus funebris</i> Kom.	4	Семена намачива- ют на 18—24 ч	Апп, НБ	20⇒30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
122. Сосна смолис- тая <i>Pinus resinosa</i> Ait.	4	То же	Апп, НБ	20⇒30	С	5; 7; 10; 15, 20	7	20	В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизне- способность по ГОСТ 13056.7—68
123. Сосна Тунбер- га <i>Pinus Thunbergii</i> Parl.	4	»	Апп, НБ	20⇒30	С	7; 10, 15; 20, 25; 30	10	30	То же

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °С	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результа-тов проращива-ния	Энергия прорасти-ния		
124. Сосна черная австрийская* <i>Pinus nigra</i> Arn.	4	—	Апп, НБ	20→30 20—24	С	5; 7; 10; 15; 20	7	20	В случае срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
125. Сосна эльдар-ская <i>Pinus eldarica</i> Medw.	4	—	Апп, НБ	20—24	С	7; 10; 10; 20; 25; 30	15	30	Допускается семена перед проращиванием промывать в проточной воде. В случаях срочного высева или отправки семян допускается определять жизнеспособность по ГОСТ 13056.7—68
126. Софора япон-ская <i>Sophora japonica</i> L.	3	Семена скарифицируют и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20→30	С	3; 5; 7; 10	5	10	—
127. Солянка Па-лецкого, кара-черкез (плоды)* <i>Salsola Paletzkiana</i> Litw.	4	Плоды намачивают на 24—48 ч, затем освобождают зародыши и их проращивают	Апп, НБ	20→30 20—24	С	1; 2; 3	1	3	Допускается в условиях выездных лабораторий определять всхожесть на аппаратах без подогрева, т. е. при комнатной температуре

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов проращивания	Энергия проращивания	
128. Солянка Рихтера, черкез, геокчеркез (плоды)* <i>Salsola Richteri</i> Karel.	4	Плоды намачивают на 24—48 ч, затем освобождают зародыши и их проращивают	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30 20—24	С 1; 2; 3	1	3	Допускается в условиях выездных лабораторий определять всхожесть на аппаратах без подогрева, т. е. при комнатной температуре
129. Таволга дубровколистная <i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 1; 2; 3; 4; 5	3	5	—
130. Таволга иволистная <i>Spiraea salicifolia</i> L.	4	То же	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
131. Таволга серая <i>Spiraea cinerea</i> Lbl.	4	»	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	—
132. Таволга японская <i>Spiraea japonica</i> L. f.	4	—	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч
133. Тополь (все виды) <i>Populus</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 2; 3; 4; 5	2	5	—
134. Туя западная <i>Thuja occidentalis</i> L.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\rightleftharpoons$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	7	20	—

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для прорашивания	Предварительная подготовка перед прорашиванием	Ложе для прорашивания	Температура прорашивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания	
						Дни очередных учетов результа-тов прорашива-ния	Энергия прораста-ния		
135. Туя складчатая или гигантская <i>Thuya plicata</i> D. Don.	4	Семена намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 30	С	7; 10; 15; 20; 25; 30	10	30	—
136. Фисташка настоящая <i>Pistacia vera</i> L.	3	Семена намачивают на 18—24 ч, снимают плодовую оболочку и снова намачивают на 18—24 ч, после чего отрезают 1/3 семядолей со стороны, противоположной корешку зародыша, и часть семени с кончиком корешка освобождают от всех оболочек	Апп, НБ	20 30	С	2; 3; 5; 7; 10	5	10	Допускается: семена перед удалением плодовой оболочки не намачивать; выездными лабораториями определять доброкачественность по ГОСТ 13056.8—68
137. Чингиль серебристый <i>Halimodendron halodendron</i> (Pall.) Voss.	4	Семена скарифицируют и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 30	С	2; 3; 5; 7; 10	3	10	—
138. Чубушник вечный <i>Philadelphus coronarius</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 30	С	3; 5; 7; 10; 15	7	15	—
139. Шелковица белая, тут* <i>Morus alba</i> L.	4	—	Тп, НБ	35	Т	5; 7; 10; 15; 20	10	20	Допускается семена перед прорашиванием намачивать на 18—24 ч

Наименования видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Срок определения, сут.		Примечания
						Дни очередных учетов результа-тов проращива-ния	Энергия прораста-ния	
140. Шелковица черная* <i>Morus nigra</i> L.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	10	20	Допускается семена перед проращиванием намачивать на 18—24 ч То же
			Тп, Б	35	Т 5; 7; 10; 15; 20	10	20	
			Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 5; 7; 10; 15; 20	10	20	
141. Эвкалипт ивolistный <i>Eucalyptus salicifolia</i> (Sol.) Cav.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 2; 3; 5; 7; 10	3	10	—
			Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 2; 3; 5; 7; 10	3	10	
142. Эвкалипт пепельный <i>Eucalyptus cinerea</i> F. Muell.	4	—	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 2; 3; 5; 7; 10	3	10	—
			Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 2; 3; 5; 7; 10	3	10	
143. Эвкоммия вязолистная (плоды) <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	4	Семена освобождают от околоплодника, срезают кончик эндосперма около корешка зародыша и намачивают на 18—24 ч	Апп, НБ	20 $\leftrightarrow$ 30	С 3; 5; 7; 10; 15	5	15	—

**Примечания:**

1. Сокращенные обозначения в настоящей таблице означают:

Апп — проращивание производят в аппарате;

Тп — проращивание производят в термостате;

НБ — проращивание производят на бумаге;

П — проращивание производят в песке;

О — проращивание производят в опилках;

К — проращивание производят в торфяной крошке;

С — свет;

Т — темнота;

20 $\leftrightarrow$ 30 — переменная температура: в течение 6 ч ежедневно воду в аппаратах подогревают с 24 до 36°C, соответственно температура ложа повышается с 20 до 30°C. Оставшееся время суток вода в аппаратах остывает с 36 до 24°C и поддерживается на этом уровне, соответственно температура ложа поддерживается на уровне 20°C;

20—24 — постоянная температура: в течение 24 ч ежедневно температуру воды в аппаратах поддерживают на уровне 24°C, соответственно температура ложа поддерживается на уровне 22 $\pm$ 2°C.

2. Для определения всхожести семян по образцам от малых партий проращивают три пробы.

3. Для семян видов, обозначенных \*, условия для анализа выбирают в зависимости от срочности его выполнения и имеющихся возможностей.

4. Для семян видов, обозначенных \*\*: если при переменной температуре проращивания (20 $\leftrightarrow$ 30 °C) всхожесть семян ели (аянской, сибирской, обыкновенной или европейской, Шренка, тяньшанской), лиственницы (всех видов и сосны Банкса окажется ниже предельной нормы кондиционности на 10% и менее, допускается прорастить семена повторно при температуре 20—24°C и документ о качестве выдать по большему показателю всхожести. Во всех случаях в документах о качестве обязательно указывают температуру проращивания.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Дата введения 01.01.91

Приложение. Исключить наименование вида. 17;  
графа «Наименования видов». Пункт 5 после слова «Конолли» дополнить словами, «(акация песчаная)».

Пункты 9, 42 изложить в новой редакции:

«9. Береза повислая.

*Betula pendula* Roth (*B. verrucosa* Ehrh.)

42. Ель Энгельманна *Picea engelmannii* Parry ex Engelm».

Пункт 28. Наименование на русском языке изложить в новой редакции:  
«Гледичия трехколючковая»

Пункты 33, 40, 41а, 44. Латинское наименование изложить в новой редакции

«33. *Picea ajanensis* (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr.

40. *Picea abies* (L) Karst.

41а. *Picea schrenkiana* Fisch. et Mey.

44. *Lonicera maackii* Rupr».

(Продолжение см с 350)

Пункты 25, 43, 51, 62, 68, 74, 84, 86, 89, 95, 105, 116, 118. Заменить слова: 25—«ильм горный» на «горный ильм»; 43—«Wimm» на «Koch»; 51—«акация желтая» на «желтая акация»; 62 — «Sieb. et Zucc.» на «(Sieb. et Zucc.) Endl»; 68—«*glauca* Mayg» на «*menziesii* var *glauca* Schneid»; 74 — «Djil» на «Dyl»; 84—«Turcz» на «(Spach) Turcz. ex Rupr»; 86 — «черная или клейкая» на «клейкая или черная»; 89 — «маслина душистая» на «душистая маслина»; 95 — «Mast.» на «Er. Schmidt»; 105 — «или акация белая» на «(белая акация)»; 116—«*montana* Mill.» на «*mugo* Turra»; 118 — «крымская» на «Палласа (крымская)», «Lamb.» на «D. Don.».

Пункт 75 после слова «*leptolepis*» дополнить словами: «(Sieb et Zucc.) Gord».

Пункты 3, 85, 127, 135. Исключить слова: «3 — «или акация шелковая»; 85 — «или белая»; 127 — «кара-черкез»; 135 — «или гигантская».

Пункт 93 после слова «*perholepis*» дополнить словом: «(Trautv.)».

Пункт 103 после слова «регенсбургский» дополнить словами: «(ракитник двуцветковый)».

Пункт 106. Исключить запятую: заменить слово: «песчаный» на «(песчаный)»; после слова «Bge.» дополнить словами: «ex Boiss. et Buhse».

Пункт 107 после слова «черный» дополнить словом: «или»; исключить слово: «безлистный».

(Продолжение см. с. 351)

Пункт 108 после слова «*semperfirrens*» дополнить словами:  
«(Lamb. ex D. Don)».

Пункт 109 дополнить словами: «(Секвойядендрон гигантский. *Sequoiadendron giganteum* Lindl.)»

Пункт 128. Исключить слова: «черкез, геокчеркез»; заменить слова:  
«*Richteri* Karel.» на «*richteri* Moq. Kar. ex Litv.».

Пункт 129 после слова «дубровколистная» дополнить словами: «(Спирея дубровколистная)».

Пункт 130 после слова «иволистная» дополнить словами: «(Спирея иволистная)».

Пункт 131 после слова «серая» дополнить словами: «(Спирея серая)»

Пункт 132 после слова «японская» дополнить словами: «Спирея японская».

Пункт 137 после слова «Чингиль» дополнить словами: «(чемыш)».

Приложение дополнить наименованиями видов:

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Темпера-тура про-ращива-ния, °С	Осве-щен-ность	Дни очеред-ных учетов результатов проращивания	Срок определе-ния, сут.		Приме-чания
							Энергия прораста-ния	Всхо-жесть	
19а. Вейгела цветущая <i>Weigela florida</i> (Bge.) A.DC.	4	—	Апп, НБ	20→30	С	5, 7, 10, 15, 20	7	20	
31а. Дуб грузинский <i>Quercus iberica</i> Stev.	3	Желуди промы-вают, срезают 1/3 семени со стороны противоположной корешку зародыша и, удалив семенную кожуру, раскладывают поверхностью среза вниз	Апп, НБ	20→30	С	5, 7, 10, 15, 20	10	20	
31б. Дуб каштанолиств-ный <i>Quercus castaneifolia</i> C.A.M.	3	То же	Апп, НБ	20→30	С	5, 7, 10 15, 20	10	20	
91а. Пираканта город-чатая <i>Pyracantha crenulata</i> (D. Don) Roem.	4		Апп, НБ	20→30	С	5, 7, 10 15, 20, 25	10	25	
91б. Пираканта ярко-красная <i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	4		Апп, НБ	20→30	С	5, 7, 10, 15, 20, 25	7	25	

(Продолжение см. с. 353)

Наименование видов	Количество проб по 100 семян для проращивания	Предварительная подготовка перед проращиванием	Ложе для проращивания	Температура проращивания, °C	Освещенность	Дни очередных учетов результатов проращивания	Срок определения, сут.		Примечания
							Энергия прорастания	Всходженность	
100а. Платикладус восточный, плосковетвистник (биота восточная) <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	4	—	Апп, НБ	20—24	С	5, 7, 10, 15, 20	10	20	
100б. Прутняк обыкновенный <i>Vitex agnus-castus</i> L.	4		Апп, НБ	20→30	С	5, 10, 15, 20, 25, 30	20	30	
110а. Сирень венгерская <i>Syringa josikaea</i> Jacq. f.	3		Апп, НБ	20—24	С	5, 10, 15, 20	10	20	
132а. Терескен серый <i>Eurotia ceratoides</i> (L.) C.A.M.	4	При проращивании зародышей терескена серого семена перед извлечением зародышей замачивают в воде при температуре 18—20 °C на 24 ч	Апп, НБ	20→30	С	2, 3, 5, 7 (1, 2, 3)	2 (1)	7 (3)	

(Продолжение см. с. 354)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 13056.6—75)*

дополнить примечанием — 5: «5. В скобках приведены дни очередных учетов результатов проращивания и срок определения всхожести и энергии прорастания семян терескена серого при проращивании извлеченных зародышей».

*(ИУС № 10 1990 г.)*