

Изменение № 3 ГОСТ 13938.11—78 Медь. Метод определения мышьяка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 28.04.88 № 1226

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Первый абзац после слов «в меди» дополнить словами: «марок в соответствии с ГОСТ 859—78»;

второй абзац исключить.

Раздел 1 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13938.11—78)

«1. Общие требования

Общие требования к методам анализа и требования безопасности при выполнении анализов по ГОСТ 13938.1—78.

Раздел 2. Пятый абзац после слов «по ГОСТ 14261—77» дополнить словами: «или по ГОСТ 3118—77»;

заменить значение: 4 н. на 2 моль/дм³ (2 раза).

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Расхождения результатов двух параллельных определений и двух анализов не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.

(Продолжение см. с. 87)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13938.11—78)

Таблица 2

Массовая доля мышьяка, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %, результатов	
	параллельных определений	анализов
От 0,0005 до 0,0010 включ.	0,0003	0,0004
Св. 0,0010 » 0,0030 »	0,0005	0,0007
» 0,0030 » 0,005 »	0,0008	0,0010
» 0,0050 » 0,010 »	0,0015	0,003
» 0,010 » 0,050 »	0,003	0,005
» 0,050 » 0,100 »	0,005	0,008

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Допускается определение мышьяка другими методами».

(ИУС № 7 1988 г.)