

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач

Республики Беларусь

М.И. Римжа

2004 г.



Идентификационный № 81-0904

**Организация контроля и методы
выявления бактерий *Listeria monocytogenes*
в пищевых продуктах**

(инструкция по применению)

Учреждения-разработчики: Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Авторы: к.м.н. Фидаров Ф.М., Федоренчик Л.А., д.м.н. Фионов В.П.,
д.м.н. Коломиец Н.Д., Марейко А.М., Пашкович В.В., Турков Н.А.

Минск 2004

Содержание

1. Общие положения и область применения	5
2. Сущность метода	6
3. Аппаратура, материалы, лабораторная посуда, реактивы и питательные среды	7
3.1. Аппаратура и инструментарий	7
3.2. Лабораторная посуда и материалы	7
3.3. Реактивы и питательные среды	8
4. Подготовка к анализу	9
4.1. Приготовление растворов и реактивов	9
4.2. Приготовление питательных сред	10
5. Отбор и подготовка проб пищевых продуктов для анализа	11
5.1. Общие положения по отбору и подготовке проб	11
5.2. Отбор и подготовка проб молока, молочных продуктов, сыров, мороженого	12
5.3. Отбор и подготовка проб мяса, мясных полуфабрикатов, мяса птицы и птицепродуктов, колбасных изделий и других мясопродуктов	12
5.4. Отбор и подготовка проб плодоовощной продукции	12
5.5. Отбор и подготовка проб рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них	12
5.6. Продукты детского, лечебного питания и их компоненты	13
6. Проведение анализа	13
7. Проведение исследования с использованием кондуктометрического анализатора «Бак Трак»	16
7.1. Предварительное обогащение – 1 этап	16
7.2. Обогащение – 2 этап	16
8. Выявление <i>Listeria monocytogenes</i> в реакции нарастания титра фага (РНФ)	17
9. Биологические исследования	18
10. Требования безопасности	18
11. Библиографический список	20

1. Общие положения и область применения

Настоящая инструкция устанавливает единую методику лабораторного исследования качества продовольственного сырья и пищевых продуктов по выявлению в них бактерий *Listeria monocytogenes*.

Инструкция предназначена для персонала микробиологических лабораторий санитарно-эпидемиологических учреждений Республики Беларусь, осуществляющих контроль качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, в т.ч. импортируемых в Республику Беларусь; гигиеническую оценку и выдачу санитарно-эпидемиологических заключений, а также бактериологическую диагностику заболеваний с пищевым путем передачи в лабораториях других организаций, аккредитованных в установленном порядке на право проведения контроля безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья; в организациях, независимо от форм собственности, осуществляющих производственный контроль продовольственного сырья и пищевых продуктов в процессе их изготовления. Данная инструкция является обязательной при контроле пищевых продуктов в ходе проведения противоэпидемических мероприятий при возникновении вспышек, а также в порядке осуществления санитарно-эпидемиологического надзора.

Проведение контроля на *Listeria monocytogenes* позволит получить реальную картину ситуации в Республике Беларусь, оценить степень загрязненности пищевой продукции и дать оценку эффективности принимаемых мер в целях обеспечения ее безопасности в плане новых и вновь возникающих возбудителей инфекций с алиментарным путем передачи для здоровья и жизни человека.

При контроле пищевых продуктов на загрязненность патогенными микроорганизмами в СанПиНе 11 63 РБ 98 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов" предусматривается новый микробиологический показатель «*Listeria monocytogenes* – не допускаются» в 25г продуктов массового назначения и в 50-100г для продуктов детского и специального питания.

Лабораторный контроль за отсутствием *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах, где нормируется этот показатель, проводится:

- в порядке надзора за соблюдением установленных требований в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов в ходе проверок изготовления и оборота пищевой продукции, оказания услуг в сфере торговли и общественного питания;
- при экспертизе продукции и подтверждении соответствия требованиям нормативных документов для целей гигиенической оценки и выдачи санэпидзаключений;
- при контроле за безопасностью продукции изготовителем (производственный контроль);
- в ходе проведения противоэпидемических мероприятий и при эпидрасследовании заболеваний.

При проведении контроля безопасности по показателю *Listeria monocytogenes* должен осуществляться периодический отбор образцов пищевой продукции.

Порядок контроля и кратность исследований должны устанавливаться в соответствии с методическими и инструктивными документами, утвержденными или согласованными в установленном порядке органами государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь, при этом необходимо учитывать специфику производства, степень его эпидзначимости, материально-техническое оснащение и т.п.

Особого внимания должны заслуживать предприятия, вырабатывающие продукты детского питания, детские молочные кухни, пищеблоки детских лечебно-профилактических учреждений, стационаров для онкологических, гематологических больных, домов ребенка, родильных домов, домов престарелых и инвалидов и т.п.

При проведении текущего надзора рекомендуемая минимальная периодичность выборочного лабораторного контроля пищевой продукции массового потребления – 1 раз в квартал; для детского и диетического питания – 2 раза.

При производственном контроле организация и периодичность лабораторных исследований продукции по показателю *Listeria monocytogenes* должна устанавливаться изготовителем продукции в соответствии с действующими санитарными правилами и согласовываться с учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы по месту расположения предприятия-изготовителя.

Контроль пищевых продуктов по показателю *Listeria monocytogenes* с целью гигиенической оценки для выдачи санитарно-эпидемиологических заключений и подтверждения соответствия установленным требованиям при проведении экспертизы осуществляется в уполномоченных лабораториях центров гигиены и эпидемиологии или других организаций, аккредитованных в установленном порядке.

В пищевых продуктах, предназначенных для непосредственного употребления в пищу, в отношении которых отсутствуют микробиологические нормативы или данные о возможности выделения *Listeria monocytogenes*, контроль *Listeria monocytogenes* не проводится, однако в случае заболеваний людей и/или нарушений в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов образцы таких продуктов должны быть направлены на лабораторное исследование.

Допускается организация лабораторных исследований путем их поэтапного выполнения в лабораториях учреждений санэпидслужбы различных уровней. При отсутствии возможности идентификации выделенных культур последние могут быть переданы в лаборатории, располагающие соответствующей материально-технической базой и квалифицированным персоналом, для выдачи окончательного результата.

2. Сущность метода

Инструкция содержит описание метода выявления бактерий *Listeria monocytogenes*, основанного на высеве определенного количества продукта в жидкие селективные среды, инкубировании посевов, выявлении в этих посевах бактерий, способных расти и образовывать типичные колонии на агаризованных дифференциально-диагностических средах. Принадлежность выделенных культур к *Listeria monocytogenes* определяется по биохимическим, морфологическим и другим свойствам.

Метод выявления *L. monocytogenes* в пищевых продуктах основан на применении специальных селективных и дифференциально-диагностических сред. Селективность сред по отношению к сопутствующей микрофлоре обеспечивается включением в их состав хлорида лития, акрифлавина, циклогексимида, налидиксиновой кислоты, полимиксина или других антибиотиков. Внесение эскулина и цитрата аммония железа позволяет подтверждать наличие листерий по почернению среды за счет гидролиза эскулина в присутствии ионов Fe^{+} . Подтверждающие тесты родовой и видовой идентификации включают окраску по Граму, определение подвижности выделенных на агаризованных средах типичных по физиологическим и морфологическим признакам культур, их способности восстанавливать нитраты до нитритов, сбраживать рамнозу, ксилозу и маннит, способности к гидролизу лецитина на ГРМ-среде с активированным углем, а также определение наличия β -гемолиза на кровяном агаре и дифференциацию *L. monocytogenes* от других гемолизирующих листерий в КАМП-тесте с контрольными штаммами *Staphylococcus aureus* и *Rhodococcus equi*.

При необходимости для выявления *L. monocytogenes* в пищевых продуктах проводится постановка реакции нарастания титра фага (РНФ).

Предлагаемый метод обнаружения *L. monocytogenes*, гармонизированный с Международным стандартом ISO 11290-1:1996, предусматривает определение наличия или отсутствия *L. monocytogenes* в нормируемой массе продукта в соответствии с нормативами СанПин 11 63 РБ 98 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов" и Постановлением № 117 от 2.09.2003 г. "О внесении изменений в санитарные правила и нормы 11 63 РБ 98", выраженными в альтернативной форме и основанной на существующей системе отбора образцов и оценке результатов анализа.

Инструкция также содержит описание методики кондуктометрического определения *L. monocytogenes* в пищевых продуктах с использованием микробиологического анализатора «Бак Трак». Метод кондуктометрического анализа основан на регистрации изменений импеданса – сопротивления питательной среды, которые происходят в процессе роста и метаболической активности микроорганизмов.

3. Аппаратура, материалы, лабораторная посуда, реактивы и питательные среды.

3.1. Аппаратура и инструментарий.

НД (ГОСТ, ТУ)

Анализатор потенциометрический, погрешность измерений $\text{pH} \pm 0,01$	ГОСТ 19881-74
Шкаф сушильный стерилизационный ШСС-80П или других марок, позволяющий поддерживать температуру $(160 \pm 5)^{\circ}\text{C}$	ТУ 64-1-28-70-76
Термостат, позволяющий поддерживать рабочую температуру 37°C с отклонением от заданной $\pm 1^{\circ}\text{C}$	ТУ 64-1-1382-72
Баня водяная с подогревом	ГОСТ 12026-76
Весы лабораторные общего назначения, 2 и 4 класса точности, с наибольшим пределом взвешивания 200г	ГОСТ 24104-2001
Стерилизаторы паровые медицинские или аналогичные	
Дистиллятор, обеспечивающий качество дистиллированной воды в соответствии с	ГОСТ 19569-89 Е
Гомогенизатор перистальтического типа «Стомайкер» или других наименований	ГОСТ 6709-72
Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 или других видов	ТУ 16-535-84
Холодильник бытовой	
Пинцет медицинский	ГОСТ 21241-89 Е
Ножницы медицинские	ГОСТ 21239-93
Скальпель хирургический, 15 см	ГОСТ 21240-89
Штативы для пробирок	
Часы механические сигнальные	ГОСТ 3145-84 Е

3.2. Лабораторная посуда и материалы

Бумага фильтровальная лабораторная	ГОСТ 12026-76
Бутылки стеклянные для химических реактивов	
Кастрюли эмалированные	ГОСТ 24778-81
Марля медицинская	ГОСТ 9412-93
Колбы плоскодонные конические или круглые разной вместимости	ГОСТ 1770-74
Воронки стеклянные	ГОСТ 25336-82 Е
Вата медицинская гигроскопическая	ГОСТ 5556-81
Пипетки вместимостью 1,2,5 и 10 см ³	ГОСТ 29227-91
Полистироловые планшеты U-образные	
Пробирки Уленгута (поплавки)	
Пробирки типов П1, П2	ГОСТ 25336-82 Е
Стекля предметные для микропрепаратов	ГОСТ 6672-75 Е
Спиртовки лабораторные стеклянные	ГОСТ 23932-90 Е
Ступка фарфоровая с пестиком	ГОСТ 9147-80 Е
Термометр ртутный с диапазоном измерения от 0 до 100 ⁰ С (цена деления шкалы 1 ⁰ С)	ГОСТ 13646-68 Е
Чашки биологические (Петри)	ГОСТ 23932-90 Е

3.3. Реактивы и питательные среды

НД (ФС, ТУ), фирма-изготовитель

3.3.1. Реактивы, компоненты сред

Агар микробиологический	ГОСТ 17206-96
Вода дистиллированная	ГОСТ 6709-72
D-глюкоза, ч.	ГОСТ 6038-79
D-лактоза, 1-водная	ТУ 6-09-22-98-79
Маннит	
Ксилоза	
Рамноза	
Калия гидроокись	ГОСТ 24363-80
Калий фосфорнокислый однозамещенный, ч.	ГОСТ 4198-75
Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный	ГОСТ 2493-75
Кислота соляная, х.ч.	ГОСТ 3118-77
Литий хлористый, ч. или х.ч.	ГОСТ 4328-77
Набор реактивов для окраски по Граму	
Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный, 4-водный, ч. или х.ч.	ГОСТ 4170-78
Натрия гидроокись, ч.д.а.	ГОСТ 4328-77
Натрий лимоннокислый, 5,5-водный, ч.д.а.	ГОСТ 22280-76
Натрий хлористый, ч. или х.ч., или ч.д.а.	ГОСТ 4233-77
Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей	ГОСТ 13805-76
Полимиксин «М» или «В» сульфат по 500 000 ед. (медпрепарат)	
Спирт этиловый ректифицированный технический	ГОСТ 18300-87
Спирт этиловый ректифицированный	ГОСТ 5962-67
Железа аммонийного цитрат	
Уксусная кислота	ГОСТ 61-75
Сульфаниловая кислота	
A-нафтол	
Цинк порошкообразный	ГОСТ 3640 - 94
Эскулин	
Экстракт дрожжевой сухой	
Лития хлорид	
Желток куриного яйца	
Крахмал	
Налидиксовая кислота	Lab M, HiMedia
Акрифлавина гидрохлорид (трипафлавин)	Lab M, HiMedia
Цефтазидим	
Циклогексимид	
Тест-штаммы <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Listeria ivanovii</i> , <i>Listeria innocua</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Rhodococcus equi</i> , типичные по культуральным, морфологическим и биохимическим свойствам	

3.3.2. Среда питательные**3.3.2.1. Для культивирования изолятов**

Триптозный ГРМ-агар и ГРМ-бульон

ФС 42-3377-97

(ГНЦ ИМ)

Среда ГРМ № 1

ВФС 42-2988-97

(ГНЦ ИИ)

Питательный бульон и питательный агар

ТУ 10-02-02-789-176-94

Триптоно-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEA)

HiMedia M1214

Триптоно-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEB)

HiMedia M1263

3.3.2.2. Среды селективного обогащения	
Бульон Фрейзера (Fraser Broth)	BioMerieux 42046
Бульон Фрейзера половинной концентрации (Half Fraser Broth)	BioMerieux 42048
Fraser Broth Base, Fraser Supplement, Fraser Selective Supplement	HiMedia M1327, FD 141, FE 1251
Бульон для обогащения <i>Listeria</i> Enrichment Broth	Merck 1.10549, HiMedia M569
Бульон вторичного обогащения для листерий – Fraser Secondary Enrichment Broth Base	HiMedia M1 083
Селективный бульон для листерий – <i>Listeria</i> Selective Broth Base	HiMedia M889
Среды Pre-Media 403A и BiMedia 401A, 402A, 403A	Lab M
3.3.2.3. Дифференциально-диагностические селективные среды	
PALCAM – <i>Listeria</i> Selective Agar Base с селективной добавкой 1.12122	Merck 1.1 1755 BioMerieux 43559
PALCAM-агар – селективная среда для выделения листерий	
Агар для идентификации листерий – <i>Listeria</i> Identification Agar Base (PALCAM)	HiMedia M1 064
Oxford-агар – селективная среда для выделения листерий	BioMerieux 43 560
<i>Listeria</i> Oxford Medium Base и Oxford <i>Listeria</i> Supplement	HiMedia M1 145, FD 071
Среды Гисса с маннитом, ксилозой, рамнозой	ФС (ЦНИИВС им.И.И.Мечникова, НИИ питательных сред)
Среда для определения подвижности листерий (<i>Listeria</i> motility medium)	HiMedia M 1215
SIM-агар (сероводород-индол-подвижность)	Difco
Blood Agar Base – основа кровяного агара	HiMedia M073
Тест-системы биохимические для видовой идентификации API <i>Listeria</i>	BioMerieux

Допускается использование других коммерческих питательных сред и диагностических препаратов аналогичного назначения для проведения исследований в соответствии с данным документом. При их применении следует руководствоваться рекомендациями изготовителя. Питательные среды и биологические препараты импортного производства должны иметь международный сертификат качества ИСО 9000 или EN 29 000. Питательные среды и препараты отечественного производства должны вырабатываться по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

4. Подготовка к анализу

4.1. Приготовление растворов и реактивов

4.1.1. Пептонно-солевой раствор	По ГОСТ 26669
4.1.2. Изотонический (0,85%-ный водный) раствор хлорида натрия	По ГОСТ 26669
4.1.3. Растворы и реактивы для постановки реакции нитратредукции	По ГОСТ 10444.8-99
4.1.4. Приготовление растворов и реактивов для окраски препара- тов по Граму	По ГОСТ 10444.1 или в соответствии с инструкцией по применению
4.1.5. Раствор перекиси водорода для определения каталазы 3%-ный	По ГОСТ 30425

4.2. Приготовление питательных сред

Среды промышленного изготовления, указанные в п. 3.3.2., готовятся согласно прописям на этикетке или в соответствии с рекомендациями фирмы.

Допускается применение сред лабораторного приготовления по п.п. 4.2.1. – 4.2.10.

Приготовление питательных сред Pre-Media 403A и BiMedia 401A, 402A, 403A для определения листерий проводят в соответствии с МУК 11-13-7 РБ99 «Бактериологические исследования с использованием микробиологического экспресс-анализатора «Бак Трак 4100».

4.2.1. Питательный агар с 1% глюкозы и питательный бульон с 1% глюкозы (МПА с 1% глюкозы, МПБ с 1% глюкозы) готовят в соответствии с ГОСТ 10444.1.

4.2.2. Триптоно-соевый бульон с дрожжевым экстрактом (TSYEB) / Триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEA).

Состав среды (г/л): ферментативный гидролизат казеина – 17,0; пептон соевый – 3,0; натрий хлористый – 5,0; фосфат калия однозамещенный – 2,5; глюкоза – 2,5; дрожжевой экстракт – 6,0; агар микробиологический (для TSYEA) – 15,0.

Компоненты растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают рН 7,3±0,2 и автоклавируют при 121 °С в течение 15 мин.

4.2.3. Среды селективного обогащения типа бульона Фрейзера.

Приготовление основы среды (г/л): ферментативный гидролизат казеина – 5,0; пептон – 5,0; мясной экстракт – 5,0; дрожжевой экстракт – 5,0; натрий хлористый – 20,0; калия дигидрофосфат – 1,35; натрия гидрофосфат – 12,0; эскулин – 1,0; литий хлористый – 3,0; железа аммонийного цитрат – 0,25 – растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают рН 7,2±0,2 и автоклавируют при 121 °С 15 мин.

Перед употреблением в основу среды вносят асептически раствор селективных компонентов следующего состава:

Для приготовления среды типа бульона Фрейзера первичного обогащения: налидиксовой кислоты – 10 мг, акрифлавина гидрохлорид – 12,5 мг растворить в 10 см³ стерильного 0,2 N гидроксида натрия.

Для приготовления среды типа бульона Фрейзера вторичного обогащения: налидиксовой кислоты – 20 мг, акрифлавина гидрохлорид – 25 мг растворить в 10 см³ стерильного 0,2 N гидроксида натрия. Готовые среды разливают в стерильные колбы или пробирки и хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С.

4.2.4. PALCAM-агар (полимиксин-акрифлавин-лития хлоридцефтазидим-эскулин-маннитол – агар) – селективная дифференциально-диагностическая среда для выделения листерий.

Приготовление основы среды (г/л): пептон мясной ферментативный – 23,0; дрожжевой экстракт – 3,0; крахмал – 1,0; натрия хлорид – 5,0; эскулин – 0,8; лития хлорид – 15,0; железа аммония цитрат – 0,5; глюкоза – 0,5; маннит – 10,0; феноловый красный – 0,08; агар – 15,0 – растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают рН 7,0±0,2 и автоклавируют при 121 °С 15 мин.

К стерильной расплавленной основе среды добавляют асептически раствор селективных компонентов следующего состава: акрифлавин – 0,005; полимиксин «В» – 100 000 ед.; цефтазидим – 0,02 в 10 см³ стерильной дистиллированной воды.

Готовую среду разливают в стерильные чашки Петри и хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С.

4.2.5. Селективная дифференциально-диагностическая среда для выделения листерий типа Оксфорд-агара.

Приготовление основы среды (г/л): пептон мясной ферментативный – 23,0; крахмал кукурузный – 1,0; натрия хлорид – 15,0; эскулин – 1,0; лития хлорид – 15,0; железа аммония цитрат – 0,5; глюкоза – 0,5; агар – 15,0 – растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды, тщательно перемешивают, устанавливают рН 7,0±0,2 и автоклавируют при 121 °С 15 мин.

К стерильной расплавленной основе среды добавляют асептически раствор селективных компонентов следующего состава: акрифлавина гидрохлорид – 0,005; циклогексимид –

0,4; колистина сульфат* - 0,02; цефатетан* - 0,002; фосфомицин* - 0,01 мг в 10 см³ 50%-ного этилового спирта.

Готовую среду разливают в стерильные чашки Петри и хранят в защищенных от света условиях при температуре не выше 8 °С.

4.2.6. Кровяной агар.

К растопленному и охлажденному до 45-50 °С питательному агару с 1% глюкозы (п. 4.2.1.) добавляют 5% по объему дефибринированной крови животных. Разливают в чашки Петри диаметром 90 мм по 15 см³ среды и подсушивают при 37 °С.

Засев производят в теплые чашки.

4.2.7. Питательный агар с эритроцитами барана.

Дефибринированную или стабилизированную цитратом кровь барана центрифугируют в асептических условиях 30 мин при 900 об/мин. Надосадочную жидкость сливают. Осадок суспендируют в стерильном физиологическом растворе до первоначального объема, добавляют в количестве 5% по объему к растопленному и охлажденному до 45-50 °С питательному агару (п.4.2.1.). Разливают в чашки Петри по 10 см³, подсушивают при 37 °С. Чашки используют для посева теплые.

4.2.8. Среда для определения подвижности.

20 г гидролизата казеина ферментативного, 6 г пептона мясного ферментативного и 5 г агара растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды, устанавливают рН 7,3±0,2, разливают в пробирки по 5-7 см³ и автоклавируют при 121 °С 15 мин.

4.2.9. Среда Гисса по ГОСТ 10444.1. с маннитом, рамнозой, ксилозой.

10 г ферментативного пептона и 5 г натрия хлористого растворяют в 1 000 см³ дистиллированной воды и добавляют 10 г соответствующего углевода. Устанавливают рН 7,1±0,1, вносят 10 мл индикатора Андрее (возможно использование бромкрезолового пурпурного, «ВР» и др.), разливают в пробирки и стерилизуют при 112 °С в течение 20 мин.

4.2.10. Среда для определения лецитиназной активности листерий.

К среде ГРМ № 1 перед стерилизацией добавляют активированный уголь, растертый до порошкообразного состояния, до концентрации 0,5% (вес/объем). Желток куриного яйца разводят в 150 мл физиологического раствора и добавляют 5% по объему к стерилизованному и охлажденному до 40-50 °С питательному агару. Разливают в чашки Петри по 20 см³ и подсушивают при 37 °С. Аналогично готовят среду с добавлением желтка, но без добавления активированного угля.

5. Отбор и подготовка проб пищевых продуктов для анализа

5.1. Общие положения по отбору и подготовке проб.

Отбор и подготовку проб продукции производят в соответствии с ГОСТ 26668-85 «Методы отбора проб для микробиологических анализов», ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов», СанПиН 42-123-4940-88 «Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов», а также в соответствии с действующими ГОСТ и НД на конкретные виды продуктов.

Масса или объем отбираемых проб должны быть достаточными для проведения исследования и минимально вдвое превышать аналитический образец. Из точечных проб составляют навеску массой 25±0,1 г (50-100 г – для продуктов детского, лечебного и специализированного питания).

От продукции в потребительской таре в мелкой фасовке пробы отбирают в количестве одной или нескольких единиц в зависимости от массы или объема потребительской тары, с тем, чтобы количество было достаточным для проведения анализа.

От продукции в транспортной или потребительской таре больших размеров или неупакованной пробы отбирают из разных мест с различной глубины, включая поверхность.

* допускается замена комплекса перечисленных антибиотиков на полимиксин в количестве 500 000 ед/л.

Для микробиологических анализов пробы отбирают до взятия проб на физико-химические и органолептические анализы стерильным инструментом в стерильную посуду. При этом от образца отбирают несколько точечных проб из разных мест, которые измельчают и перемешивают, из них составляют навеску 25 г.

Замороженные продукты предварительно размораживают до температуры внутри продукта 0 – (-1) °С; продукты, содержащие жиры (сливочное масло, мороженное) нагревают до температуры 40-45 °С и перемешивают.

Отобранные образцы перемешивают и измельчают или доводят до однородной консистенции по ГОСТ 26669, из измельченной суспензии готовят навеску необходимой массы.

При посевах высококислотных или щелочных (с рН < 6 или > 7,5) жидких и твердых продуктов для предотвращения снижения рН питательных сред на 0,5 и более, рН продукта перед посевом доводят до (7,0±0,2).

5.2. Отбор и подготовка проб молока, молочных продуктов, сыров, мороженого

Отбор и подготовку проб продуктов проводят согласно ГОСТ 3622-68 «Молоко и молочные продукты. Отбор и подготовка их к испытанию» и 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».

Кисломолочные продукты, сыр, творог, творожные изделия и пастообразные продукты тщательно измельчают с помощью гомогенизаторов перистальтического типа или ножевых и подвергают нейтрализации, масло сливочное и мороженное растапливают до сметанообразной консистенции.

5.3. Отбор и подготовка проб мяса, мясных полуфабрикатов, мяса птицы и птицепродуктов, колбасных изделий и других мясопродуктов

Отбор и подготовку проб мяса, субпродуктов, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и других мясных продуктов проводят по ГОСТ 21237 «Мясо. Методы бактериологического анализа», ГОСТ 4288 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса», ГОСТ 9958, ГОСТ 9792 «Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц».

Массу навески отбирают в соответствии с п. 6.1.

Отбор и подготовку проб мяса птиц, субпродуктов и птичьих полуфабрикатов проводят по ГОСТ Р 7702.0-95 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям».

5.4. Отбор и подготовка проб плодоовощной продукции

Отбор и подготовку к анализу проб плодоовощной продукции проводят согласно ГОСТ 26668, ГОСТ 26669. Для анализа поверхностно-контаминированной продукции готовят суспензию добавлением к навеске массой (100±30) г, отобранной из трех единиц тары или фасовки, 0,1%-ного пептонно-солевого раствора в количестве, равном массе навески. При этом 1 см³ полученной суспензии оценивают как 1 г (см³) продукта.

Из измельченных плодов, овощей, полуфабрикатов и пюреобразных и жидких отбирают раздельно навески массой по (100±30) г из трех единиц тары или фасовки и готовят объединенную пробу массой в соответствии с п. 6.1.

5.5. Отбор и подготовка проб рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, вырабатываемых из них

Отбор и подготовку проб проводят согласно «Инструкции по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных» № 5319-91 от 22.02.91 и ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний».

Отбор проб свежей, охлажденной и мороженой рыбы проводят от 2 точечных образцов, мышечная ткань в которых составляет не менее 25 г по ГОСТ 7631-85. Из каждой точечной пробы стерильным инструментом вырезают спинные мышцы с кожей, перемешивают и отвешивают 25 г, затем измельчают с помощью гомогенизаторов перистальтического типа или ножевых и гомогенизируют в 225 см³ среды накопления.

5.6. Продукты детского, лечебного питания и их компоненты

Отбор и подготовку проб продуктов детского, лечебного питания и их компонентов проводят согласно СанПиН42-123-4940-88 «Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов».

Отобранные пробы продуктов перед исследованием тщательно перемешивают, кисло-молочные продукты нейтрализуют (на 10 см³/г исследуемого продукта или первого разведения для сухих кисломолочных продуктов, напиток или закваски добавляют 1,0 см³ стерильного раствора двууглекислого натрия с массовой концентрацией 100 г/дм³). Сыр, творог, творожные изделия и пастообразные продукты тщательно измельчают и нейтрализуют. Топленое масло или молочный жир расплавляют при температуре 40-45 °С и перемешивают до получения однородной эмульсии.

6. Проведение анализа

6.1. Подготовленную в соответствии с п. 5 навеску исследуемого продукта (гомогената, смыва с поверхности) в количестве 25 г (см³) вносят в одну из сред для первичного обогащения в количестве 225 см³ (по п.п. 3.3.2.2., 4.2.3.1.). При необходимости анализа других масс продукта их посев проводят в среду также в соотношении 1:9 по объему.

Посевы термостатируют при 37 °С в течение (24±2) ч. При росте листерий на средах предобогащения, содержащих эскулин и цитрат железа аммонийного, наблюдается почернение среды за счет гидролиза гликозида эскулина до глюкозы и эскулетина. Эскулетин реагирует с ионами железа, образуя комплекс черного или оливкового цвета. На других средах почернения не отмечается.

6.2. После термостатирования продукта в среде для первичного обогащения 0,1 см³ суспензии пересевают в 10 см³ одной из жидких сред для вторичного обогащения. Посевы термостатируют при температуре (37±1) °С в течение 48 ч. В средах с эскулином отмечают почернение как признак возможного присутствия бактерий рода *Listeria*.

6.3. Из пробирок после термостатирования, независимо от наличия или отсутствия признаков роста, и в т.ч. почернения, делают пересев по 0,1 см³ на поверхность двух чашек Петри с одной из агаризованных дифференциально-диагностических сред по п.п. 3.3.2.3., 4.2.4., 4.2.5. Посевной материал растирают стерильным шпателем. Допускается проводить пересев петлей штрихом. Чашки со средами предварительно подсушивают.

Посевы термостатируют при температуре (37±1) °С в течение 24-48 ч.

6.4. Проведение анализа без этапа вторичного обогащения.

При посеве продуктов с низким исходным уровнем микробной контаминации и при отсутствии признаков роста в жидкой среде (помутнение, почернение и др.) допускается проводить пересев на чашки с агаризованными дифференциально-диагностическими средами сразу после этапа первичного обогащения по п. 6.2.

6.5. При отсутствии роста на чашках с дифференциально-диагностическими средами типа Оксфордского агара и PALCAM-агара анализ прекращают и дают заключение об отсутствии *L. monocytogenes* в исследованной пробе продукта.

6.6. При обнаружении характерного роста на чашках отбирают 3-5 колоний для дальнейшего изучения.

На средах типа PALCAM-агара через 24 ч инкубирования листерии формируют мелкие, серовато-зеленые или оливково-зеленые колонии с черным ореолом, диаметром 0,5-1,0 мм, иногда с черным центром. Через 48 ч колонии диаметром 1,0-2,0 мм приобретают зеленую окраску с углубленными центрами, окруженными черным ореолом. Кокковая микрофлора (бактерии рода *Staphylococcus*, *Enterococcus*) образует желтые колонии за счет ферментации маннита.

На Оксфордском агаре (Oxford agar) листерии, выращенные в течение 24 ч, мелкие (1мм), сероватые, окруженные черным ореолом. Через 48 ч – более темные, около 2 мм в диаметре, с черным ореолом и углубленным центром.

При появлении сплошного роста листерий производят пересев бактериологической петлей из зон наибольшего почернения среды штрихами на 2-3 чашки Петри с селективной

дифференциально-диагностической средой (Оксфордский или PALCAM-агар) для получения изолированных колоний. Посевы термостатируют аналогично п. 6.3.

6.7. Отобранные характерные колонии, подозрительные на принадлежность к *Listeria monocytogenes*, пересевают на среды: МПА с 1% глюкозы (п. 4.2.1.), триптон-соевый агар с дрожжевым экстрактом (TSYEA) по п. 3.3.2.1. или 4.2.2. для получения изолированных колоний, которые подвергают дальнейшему изучению. Посевы термостатируют при температуре 30 °С в течение 24 ч.

6.8. Идентификация выделенных культур

Для определения принадлежности выделенных микроорганизмов к роду *Listeria* полученные на средах культивирования чистые культуры микроскопируют по Граму, определяют наличие у них каталазы, подвижность при двух температурах инкубирования – 22 и 37 °С, способность к ферментации маннита и ставят реакцию нитрат-редукции.

6.8.1. Окраска по Граму. Бактерии рода *Listeria* являются грам-положительными тонкими короткими палочками, спор не образуют.

6.8.2. Каталазную активность культур определяют по способности каталазы разлагать перекись водорода с выделением пузырьков газа. Реакцию ставят с охлажденной до комнатной температуры суточной культурой на стерильном предметном стекле. Изолированную колонию, взятую с поверхности питательной среды, растирают на стекле и пипеткой наносят каплю 3%-ного раствора перекиси водорода. Если через 30-60 с на стекле появляются пузырьки газа, то считают результаты реакции положительными. Параллельно ставят контрольную пробу. Бактерии рода *Listeria* являются каталазоположительными.

6.8.3. Подвижность культур определяют посевом уколом в среды по п. 3.3.2.3. и 4.2.8. и инкубированием при двух температурах – 25 и 37 °С в течение 48-72 ч.

Бактерии рода *Listeria* подвижны при 20-25 °С (образуют характерный рост вокруг линии укола, похожий на зонтик) и неподвижны (или слабоподвижны) при 35-37 °С.

6.8.4. Для определения способности сбраживать углеводы культуры пересевают на пестрый ряд в среды Гисса по п.п. 3.3.2.3. или 4.2.9. Посевы термостатируют 7 дней при 37 °С, наличие ферментативной активности в отношении углеводов определяют по изменению окраски сред за счет образования кислоты. Большинство бактерий рода *Listeria* не утилизируют маннит (за исключением *L. greyi* и *L. grayi* subsp. *mitigaui*).

6.8.5. Постановку реакции нитрат-редукции проводят по ГОСТ 10444.8-88. Бактерии рода *Listeria* не восстанавливают нитраты до нитритов (за исключением *L. greyi* и *L. grayi* subsp. *mitigaui*). Обнаружение в посевах грамположительных коротких тонких палочек, каталазоположительных, не восстанавливающих нитраты до нитритов, не утилизирующих маннит, подвижных при 25 °С и неподвижных при 37 °С, указывает на принадлежность выделенных на дифференциально-диагностических средах культур с характерной морфологией к роду *Listeria*.

Для подтверждения принадлежности выделенных листерий к виду *L. monocytogenes* определяют способность к ферментации рамнозы, ксилозы, наличие лецитиназной и бета-гемолитической активности и проводят постановку КАМП-теста (СAMP-test). Дифференцирующие признаки видов рода *Listeria* указаны в табл. 1.

Для видовой дифференциации выделенных культур листерий допускается использовать биохимические тест-системы API *Listeria* фирмы «BioMerieux». При их применении следует руководствоваться рекомендациями изготовителя.

6.8.6. Способность ферментировать рамнозу и ксилозу – определяют аналогично п. 6.8.4. Бактерии *L. monocytogenes* утилизируют рамнозу с образованием кислоты и не утилизируют ксилозу.

6.8.7. Бета-гемолитическую активность исследуемых культур определяют по образованию зон просветления за счет растворения эритроцитов вокруг колоний при посеве на поверхности кровяного агара, приготовленного с добавлением стерильной дефибрированной крови барана или кролика. Посевы на кровяном агаре (п.п. 3.3.2.3., 4.2.6.) термостатируют при 37 °С в течение 24 ч.

Таблица 1.

Признак	<i>L. monocytogenes</i>	<i>L. ivanovii</i>	<i>L. seeligeri</i>	<i>L. innocua</i>	<i>L. grayi</i>	<i>L. welshimeri</i>
Ферментация:						
• маннита	-	-	-	-	+	-
• ксилозы	-	+	+	-	-	+
• рамнозы	+	-	-	±	±	±
Бета-гемолиз	+	+	+	-	-	-
КАМП-тест (CAMP-test) Усиление гемолиза около штриха:						
• <i>Rhodococcus equi</i>	-	+	-	-	-	-
• <i>Staphylococcus aureus</i>	+	-	+	-	-	-
Лецитиназная активность:						
• на среде с активированным углем	+	+	-	-	-	-
• на среде без угля	-	+	-	-	-	-

Listeria monocytogenes обладают бета-гемолитической активностью (образуют узкие четкие зоны просветления вокруг колоний).

6.8.8. Постановку КАМП-теста проводят для дифференциации *L. monocytogenes* от других видов листерий, обладающих гемолитической активностью.

Для проведения теста 2 – 3-суточные культуры гемолитических штаммов *Staphylococcus aureus* и *Rhodococcus equi* засевают на кровяной агар с эритроцитами барана двумя параллельными штрихами на расстоянии 5,0-5,5 см, как показано на рис. 1.




Рис. 1.

S – посев *Staphylococcus aureus*; R – посев *Rhodococcus equi*.

Между вертикальными штрихами *St. aureus* и *Rh. equi* засевают параллельными штрихами исследуемые культуры листерий на расстоянии друг от друга не менее 1 см и от вертикальных штрихов – 0,5 см. В качестве контрольных используют тест-штаммы *L. monocytogenes* и *L. Ivanovii*. Инкубацию проводят 24 ч при 37 °С. Отмечают форму и размеры зон гемолиза около вертикальных штрихов роста стафилококка и родококка.

Listeria monocytogenes дает расширение зоны гемолиза около штриха *Staphylococcus aureus* (положительный КАМП-тест) и имеет отсутствие изменений зоны гемолиза рядом со штрихом *Rhodococcus equi* (отрицательный КАМП-тест).

6.8.9. Для определения лецитиназной активности дно двух чашек Петри со средой ГРМ №1, содержащих: 1 чашка – желток куриного яйца и активированный уголь, 2 чашка – желток куриного яйца без активированного угля – делят на несколько секторов или квадратов, исследуемые культуры и контрольные штаммы листерий пересевают параллельно короткими штрихами на соответствующие секторы чашек, содержащих и не содержащих уголь. Инкубируют 48 ч при 37 °С. Чашки просматривают в проходящем свете и определяют наличие активности в присутствии и в отсутствии активированного угля, сравнивая с контрольными

высевами музейных штаммов. *Listeria ivanovii* дает плотную зону помутнения шириной 3-6 мм независимо от присутствия активированного угля. *Listeria monocytogenes* дает аналогичную зону помутнения в присутствии активированного угля и не дает при отсутствии угля. Другие виды листерий не дают зоны помутнения.

6.9. Учет результатов.

В образце продукта констатируют присутствие *Listeria monocytogenes*, если при посеве на селективные среды выделены короткие неспорообразующие грамположительные палочки, каталазоположительные, подвижные при 25 °С и неподвижные при 37 °С, утилизирующие эскулин, сбраживающие с образованием кислоты рамнозу и не сбраживающие маннит и ксилозу, не восстанавливающие нитраты до нитритов, обладающие бета-гемолитической активностью, дающие положительную реакцию в КАМП-тесте со *Staphylococcus aureus* и отрицательную – с *Rhodococcus equi*, проявляющие лецитиназную активность на среде ГРМ № 1 с добавлением желтка куриного яйца в присутствии активированного угля.

Результаты выделения *Listeria monocytogenes* в определенной навеске продукта записывают: «*Listeria monocytogenes* обнаружены в 25 г (см³) (в 50-100 – для продуктов детского, лечебного и специализированного питания) продукта» или «*Listeria monocytogenes* не обнаружены в 25 г (см³) (в 50-100 – для продуктов детского, лечебного и специализированного питания) продукта».

Результат оценивают по каждой пробе отдельно.

7. Проведение исследования с использованием экспресс-анализатора «Бак Трак»

7.1. Предварительное обогащение – 1 этап

Для предварительного обогащения используется среда Pre-Media 403A.

Необходимое количество продукта, в котором регламентируется отсутствие *Listeria monocytogenes*, смешивают со средой Pre-Media 403A в соотношении 1/10, затем образец гомогенизируют и инкубируют в течение 24 ч.

7.2. Обогащение – 2 этап

Для обогащения используют одну из сред BiMedia 401A, BiMedia 402A, BiMedia 403A.

Среду BiMedia 403A (401A, 402A) оставляют уравновеситься при комнатной температуре в течение 12 ч. Устанавливают температуру 37 °С на приборе «Бак Трак».

В основном меню программы «Бак Трак» устанавливают следующие параметры:

Параметры для инкубаторного блока (Adjust parameters):

Время исследования (Duration)	36 ч
Масштаб измерений (Scale)	
М-параметр	0-20%
Е-параметр	0-80%
Время задержки (Delay)	1 ч
Пороговые значения (Thresholds)	
М-параметр	5%
Е-параметр	15%
Проводить учет результатов по Е-параметру	
Пороговое значение по времени (Time limit)	30 ч

Добавляют в каждую измерительную ячейку по 10 см³ среды BiMedia и вносят по 0,1 см³ предобогащенного образца, тщательно перемешивают содержимое, вращая ячейку между ладонями (не переворачивая).

Для контроля среды используют одну измерительную ячейку с 10 см³ среды BiMedia (без инокулята).

Выбирают в основном меню программы ЗАПУСК ИЗМЕРЕНИЙ (Start Measurement) и начинают измерения.

После того как каждая позиция в блоке будет отмаркирована как свободная на экране монитора, измерительные ячейки помещают в прибор «Бак Трак». Измерение начинается ав-

томатически через 1 ч после загрузки ячеек в прибор. Рост микроорганизмов и время определения изменения импеданса (IDT) записываются автоматически.

Учет результатов:

Образец загрязнен листериями, если изменение импеданса превышает 15%-ное пороговое значение по E-параметру в течение 30 ч.

Подтверждение *Listeria*-позитивных образцов.

В случае положительного ответа на листерии проводится подтверждение роста и идентификация до *Listeria monocytogenes* с высевом на селективные питательные среды в соответствии с п.п. 6.3-6.8. Высев производится непосредственно из измерительной ячейки.

Выросшие культуры подвергают идентификации по п. 6.8.

Учет результатов и выдача ответа по п. 6.9.

8. Выявление *Listeria monocytogenes* в реакции нарастания титра фага (РНФ)

РНФ может быть использована в качестве дополнительного метода для обнаружения *Listeria monocytogenes* в пищевых продуктах (при проведении противоэпидемических мероприятий или эпидрасследовании). Реакция нарастания титра фага – быстрый специфический метод обнаружения листерий, обеспечивающий выявление возбудителя в исследуемом материале без выделения культуры.

РНФ основана на свойстве индикаторного бактериофага строго специфично размножаться в клетках гомологичного микроба. Размножение бактериофага сопровождается увеличением количества его частиц и повышением титра.

8.1. В реакции применяют листериозные бактериофаги L2A и L4A. Штаммы *Listeria monocytogenes* I (9-127) и II (9-72) серогрупп. Питательные среды, содержащие 0,5% глюкозы: мясопептонный бульон, 1,5%-ный и 0,7%-ный мясопептонный агар.

8.2. При постановке РНФ с пробами пищевых продуктов отвешивают 25 г исследуемого материала, измельчают, помещают в колбу емкостью 1 000 см³ и добавляют 250 см³ МПБ. Смесь в течение 5-10 минут встряхивают, а затем переносят в бактериологическую пробирку № 1 (опыт).

8.3. Бактериофаги используют в рабочем разведении (10 000 фаговых корпускул в 1 см³). Для этого их растворяют в МПБ до исходного объема, указанного на этикетке ампулы, а затем на МПБ отдельными пипетками делают пять последовательных десятикратных разведений (в последнем разведении титр бактериофага составит 1×10^4).

Смесь фагов готовят путем смешивания равных объемов фага L2A и L4A в рабочем разведении.

8.4. Для контроля титра бактериофага, который ставят один на группу анализов, проводимых одновременно, в пробирку № 2 (контроль) вносят 9 см³ МПБ.

8.5. В пробирки № 1 и 2 вносят по 1 см³ смеси фага в рабочем разведении (рис. 2) и выдерживают их в течение 16-24 ч при комнатной температуре, после чего в пробирки добавляют по 1 см³ хлороформа. Содержимое тщательно встряхивают и оставляют при комнатной температуре на 30-40 мин. Хлороформ оседает на дно, надосадочную жидкость подвергают дальнейшим исследованиям.

8.6. При использовании смеси фагов из опытной и контрольной пробирок (№ 1 и 2) берут по 0,2 см³ и переносят по 0,1 см³ в две пробирки, содержащие по 0,9 см³ МПБ (один ряд для обнаружения фага L2A, а другой – L4A), а затем из каждой пробирки готовят еще одно десяти кратное разведение.

8.7. Готовят взвесь штаммов I и II серогруппы по стандарту мутности 10 ед. путем разведения суточной агаровой культуры в физиологическом растворе. Во все пробирки с разведенным материалом добавляют по 0,1 см³ взвеси, штамма I серогруппы для выявления фага L2A или штамма II серогруппы для обнаружения фага L4A.

Содержимое пробирок засевают методом агаровых слоев по Грациа. Для этого накануне дня исследования в бактериологические чашки Петри разливают по 10 см³ 1,5%-ного МПА; МПА можно разлить в чашки Петри в день исследования, но в этом случае поверх-

ность агара необходимо предварительно подсушить в течение 40-50 мин при 37 °С или 2 ч при комнатной температуре. Для второго слоя используют расплавленный и охлажденный до 48-50 °С 0,7%-ный МПА, который следует использовать в течение часа, так как позже он приобретает гелеобразную консистенцию и не пригоден для исследования.

Затем в пробирки пипеткой вносят по 2,5-3 см³ расплавленного и охлажденного до 48-50 °С 0,7%-ного МПА. Содержимое быстро и тщательно перемешивают вращением пробирки между ладонями и выливают в чашку Петри. Смесь легким покачиванием чашки равномерно распределяют вторым слоем на поверхности 1,5%-ного МПА. Чашки оставляют на ровном месте на 20-30 мин (до застывания 0,7%-ного МПА), затем переворачивают и инкубируют при комнатной температуре.

8.8. Учет реакции проводят через 16-24 ч инкубирования посевов.

В опытных пробах и контроле титра фага подсчитывают число негативных колоний во всех чашках. Негативные колонии – округлые, хорошо заметные на фоне бактериального роста, прозрачные участки, образующиеся в результате лизиса бактерий.

При учете результата сравнивают количество негативных колоний на чашках соответствующих разведений.

8.9. Результаты реакции оценивают по увеличению титра бактериофага (количества негативных колоний):

– увеличение количества негативных колоний в опытной пробе по отношению к контролю в 5 и более раз (хотя бы по одному из разведений) оценивается как положительный результат, менее чем в 5 раз – отрицательный;

– сплошной лизис или лизис с островками оценивается как положительный результат.

8.10. При получении положительного результата РНФ дают заключение, что в исследуемом материале (пробе) обнаружены бактерии рода *Listeria*.

9. Биологические исследования

Биологические исследования (постановку биопроб на мышцах) выделенных культур и их серологическую диагностику в реакции агглютинации проводят в ходе противоэпидемических мероприятий и при эпидрасследовании заболеваний в соответствии с методическими рекомендациями «Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики», М., 1987 (утв. 04.09.86) [16].

10. Требования безопасности

Исследования пищевых продуктов на наличие *Listeria monocytogenes* проводят в соответствии с СП 17-129 РБ 2000 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами».




Рис. 2. Схема постановки РНФ для обнаружения листерий.

11. Библиографический список

1. Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23 мая 2000г.
2. СанПин 11 63 РБ 98 «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
3. Постановление № 117 «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПин 11 63 РБ 98».
4. ГОСТ 26668-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических исследований».
5. ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов».
6. ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов».
7. ГОСТ 10444.1-84 «Консервы. Приготовление растворов, красок, индикаторов, питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе».
8. ГОСТ 9225-84 «Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа».
9. ГОСТ 9792-73 «Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб».
10. ГОСТ 9958-81 «Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа».
11. ГОСТ 21237-75 «Мясо. Методы микробиологического анализа».
12. ГОСТ 4288-76 «Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мясаю правила приемки и методы испытания».
13. ГОСТ 7631-85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний».
14. МУК 11-13-7 РБ 99 «Бактериологические исследования с использованием микробиологического экспресс-анализатора «Бак Трак 4100». Минздрав РБ, Минск, 1999.
15. Методические рекомендации «Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики» (утв. Минздравом СССР 04.09.86).
16. СанПин 17-129 РБ 2000 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами».
17. «Инструкция по санитарно-бактериологическому контролю производства маргарина и майонеза на предприятиях маргариновой промышленности» (утв. Госагпромом СССР 21.11.88).
18. СанПиН 420123-4940-88 «Методы микробиологического контроля продуктов детского, лечебного питания и их компонентов».