

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

**ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО БОРЬБЕ С ОБЫКНОВЕННЫМИ
ПОЛЕВКАМИ НА ОВОЩЕБАЗАХ**

Москва, 1984 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

117105, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 19-А

Временные методические указания разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом дезинфекции и стерилизации Минздрава СССР.

Временные методические указания предназначены для работников санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных站ий.

Местным органам здравоохранения предоставляется право размножить временные методические указания в необходимом количестве экземпляров.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель начальника Главного
управления эпидемиологии и инфекций
Министерства ССР

0.Г. Имамальев
13 февраля 1984 г.

№ 28-6/4

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО БОРЬБЕ
С ОБЫКНОВЕННЫМИ ПОЛЕВКАМИ НА ОВОЩЕБАЗАХ

I. Общие положения.

Обыкновенные полевки являются наиболее многочисленными грызунами, обитающими на плодоовощных базах. На этих объектах численность полевых, домовых мышей и серых крыс значительно ниже.

Обыкновенные полевки на плодоовощных базах могут распространять псевдотуберкулез, сальмонеллез и некоторые другие опасные для людей заболевания. Кроме того, в годы высокой численности они повреждают до одной трети всей овощной продукции.

Заселение плодоовощных баз обыкновенными полевками происходит путем активного проникновения грызунов с прилегающих полей, лугов, пустырей. В годы высокой численности особенно часто случаи завоза грызунов с овощами на авто- и железнодорожном транспорте из отдаленных районов.

Наиболее благоприятными для обитания обыкновенных полевок являются плодоовощные базы, окруженные участками с богатой травянистой растительностью или кустарником, или имеющие плохое санитарно-техническое состояние: мусор, отходы овощной продукции и т.д.

2. Обследование плодоовощных баз на наличие грызунов.

Учеты грызунов проводят отделения (отделы) профилактической дезинфекции санитарно-эпидемиологических и дезинфекционных станций (ОПД).

2.1. На территории базы:

– путем оценки числа жилых нор на единицу площади. На площадке 100 м² заражают путем затаптывания все норы. Через сутки учитывают число открытых грызунами нор, определяя численность по следующей системе баллов: I-10 нор – 1 балл (малая численность, II-30 нор – 2 балла (умеренная численность), 31 и более нор – 3 балла (высокая численность); – капканами /33 капкана на 1000 м² в течение 3-х суток/.

2.2. Учет в помещениях складов проводят следующими способами:

- а) капканами /33 капкана на каждые 1000 м² в течение 3-х суток/;
- б) по весу погрызенной продукции на 100 кг овощей, взятых из хранилища. Выборка должна составлять не менее 1000 кг. В хранилище моркови этот способ применяется как основной, в хранилищах других овощей – как подсобный;
- в) по поедаемости пакетов или брикетов с отравленной приманкой, которые раскладывают через 4-5 м вдоль стен и проходов;
- г) по числу заслеженных площадок из талька или муки, а также степени их заслеженности, которую оценивают по проценту посещаемых площадок. Пылевые площадки устраивают в коробках 20x30x1 см³ и расставляют их вдоль стен и проходов через каждые 4-5 м. Этот метод дает возможность в течение первых суток учета выявить обилие грызунов и места их наибольшей концентрации.

Показатели заселения обычными полевками овощехранилищ, суммированы в таблице I.

Т а б л и ц а I

Способ учета	Продолжительность учета: в днях	Масштаб учета	Критерии обилия		
			много	умеренно	мало
Число жилых нор	I	На 100 м ²	3 балла	2 балла	I балл
Число грызунов, поиманных в капканы	3	33 капкана на 1000 м ²	более 1,0	1,0-0,5	менее 0,5
Число заслеженных площадок	I	33 площадки на 1000 м ²	более 5,0%	5,0-1,0%	менее 1,0%
Доля погрызенной продукции	30	На 100 кг	больше 5,0%	5,0-1,0%	менее 1,0%
Число погрызенных пакетов или брикетов овощем	7	На 1000 м ²	более 5,0%	5,0-1,0%	менее 1,0%

3. Санитарно-технические мероприятия

Для профилактики заселения плодовоовощных баз грызунами необходимо поддерживать хорошее санитарно-техническое состояние, обеспечить своевременный вывоз овощной продукции, уничтожать старую тару и другие посторонние предметы, асфальтировать территорию. Участки, заросшие травой на территории базы и вокруг нее, на которых могут закрепляться и рыть норы обыкновенные полевки, должны быть благоустроены. Контроль за соблюдением этих санитарно-технических мероприятий возлагается на санэпидстанции.

4. Истребительные мероприятия.

4.1. Истребительные мероприятия до загрузки плодоовоощных баз овощами.

Наибольшая численность обычновенных полевок отмечается в хранилищах свеклы и моркови, где бороться с ними особенно трудно. Предлагаемые приманки поедаются плохо. В связи с этим целесообразно начинать проведение мероприятий, по крайней мере, за неделю до загрузки плодоовоощных баз овощами и в процессе их заполнения, причем одновременно как на территории базы, так и в помещениях складов.

4.1.1. По территории базы, преимущественно в местах, пороющих травянистой растительностью, в шахматном порядке расставляют искусственные убежища /ящики размером 20x40x50 см³ или трубы из рубероида или трубы из под рулона бумаги длиной 20–30 см и диаметром 5–7 см /.

В гнездовье закладывают сено, солому или любую ветошь, пропыленную зоокумарином /50 г/ или ратинданом /30 г/ на 0,5 кг "гнездового материала". Расстановку гнездовых производят в количестве 30 штук на 1 га **.

Для улучшения эффекта в искусственные гнездовья можно закладывать летом шинкованную морковь из отходов овощной продукции с 1% растительного масла и 3% фосфата цинка или 3% ратиндана к весу при-

** На территории овощебаз полевки часто концентрируются в местах с благоприятными защитными условиями. В связи с этим для их уничтожения целесообразно применять именно этот бесприманочный способ истребления. Гибель полевок наступает в результате попадания препарата на шерсть при последующем слизывании.

малки. В осенний, зимний и ранневесенний периоды можно раскладывать сухую приманку /зерно с 1% растительного масла и 5% зоокумарина или 3% ратиндана/. Загладку и замену гнездового материала и отравленной приманки производят не менее 1 раза в квартал по 50 г отравленной приманки на одно гнездование. Извлеченный гнездовой материал и испорченную приманку сжигают.

4.1.2. В помещениях овощехранилищ также устанавливают искусственные гнездовья с пропыленным антикоагулянтами "гнездовым" материалом и 50 г сухой зерновой приманки содержащей 5% зоокумарина или 3% ратиндана. К приманке следует добавлять 1% растительного масла.

Приименение фосфата цинка в помещениях запрещено. Гнездовья расставляют из расчета 10 штук на 1000 м² стационарно и обеспечивают их неприкосновенность и сохранность путем оформления соответствующих санитарных предписаний. Частные передвижения гнездовых не рекомендуются, т.к. они отпугивают грызунов.

4.2. Истребительные мероприятия после загрузки плодовоовощных баз овощами.

В хранилищах картофеля, лука, капусты, фруктов /в том числе, сухофруктов/ мероприятия проводятся в соответствии с пунктом 4.1.2. В хранилищах моркови искусственные гнездовья с пропыленным антикоагулянтом материалом расставляют как указано в п. 4.1.2., но без приманки.

4.3. Специфика профилактических и истребительных мероприятий с учетом различных способов хранения овощей.

При проведении дератизационных мероприятий необходимо учиты-

вать тип овощехранилищ /бетонные, деревянные/ и способ хранения овощей /в контейнерах, ларях, буртах/. Наименее доступны для грызунов бетонные склады, где заселение происходит через входные ворота при завозе продукции. В этих местах должны быть помещены искусственные гнездовья /п. 4.1.2./, которые выполняют роль "первого убежища" для разбегающихся по незнакомой территории грызунов.

На малых базах, где овощная продукция хранится в ларях, навалом, искусственные убежища с удвоенной нормой сухой отравленной приманки и пропыленным "гнездовым" материалом закладывают под пол, в простенках между ларями, в боковые вентиляционные проходы до загрузки овощами.

Наиболее легко доступны для грызунов овощи, хранящиеся в деревянных складах и буртах. Лучший способ защиты такой продукции – интенсивная борьба с грызунами на территории базы /п. 4.1.1./. Рекомендуют также закладку искусственных гнездовий с пропыленными антикоагулянтами "гнездовым" материалом и удвоенной нормой сухой приманки с антикоагулянтами во внутрь буртов из расчета 1 гнездовье на 100 м² бурта.

5. Учет эффективности дератизационных мероприятий.

Учет эффективности проводят не раньше, чем через 15 дней после обработки. Эффективность считается удовлетворительной, если снижение численности грызунов от изначальной составило не менее 85%. Если эффективность составила менее 85%, обработку следует повторить.

6. Меры предосторожности при работе с ратицидами.

Используемые химические средства для уничтожения грызунов токсичны для человека и полезных животных, в связи с чем при работе с ними необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности.

6.1. Приготовление приманки производится в ОПД, в специально отведенном для этого помещении в соответствии с действующими инструкциями. Приманки, содержащие ратициды, в расфасованном виде выдаются дезинфекторам в строго определенном количестве на данный рабочий день.

6.2. Перевозка препаратов из ОПД на объект осуществляется на машине, специально приспособленной для этих целей, в плотной закрытой, небьющейся упаковке, с этикеткой "ЯД", и указанiem адреса дезинфекционного учреждения. Запрещено перевозить ядовитые приманки и яды совместно с пищевыми продуктами и фуражом.

6.3. Лица, раскладывавшие приманку и проводящие дустацию, обязаны надевать халаты, резиновые перчатки, резиновую обувь; для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку с ватной прокладкой, закрывающие нос и рот, для защиты глаз – очки. При проведении дустации искусственных убежищ на открытом воздухе необходимо вставать с подветренной стороны. Отравленную приманку раскладывают ложками. Во время работы с ядами категорически запрещается курить, принимать пищу. Во время перерыва и после окончания работы спецодежду снимают. Перед приемом пищи, питьем и курением тщательно моют руки с мылом, обмывают лицо, прополаскивают рот. Запрещается уносить домой или хранить в жилых помещениях спецодежду и респираторы, даже на короткое время оставлять без присмотра ядовитые порошки, растворы и отравленные приманки. По окончании работы все остатки ядов собирают и закапывают в землю на глубину не менее 50 см.

Грызунов собирают в резиновых перчатках с помощью щипцов и складывают в специальные мешочки, а затем отправляют в отдел особо-опасных инфекций санитарно-эпидемиологической станции, либо закапывают в землю на глубину не менее 50 см с предварительной обработкой хлорамином.

7. Оказание первой помощи при отравлении ратицидами.

7.1. Зоокумарин, ратиндан и другие антикоагулянты.

Симптомы отравления: головная боль, тошнота, рвота, понос, общая слабость. В дальнейшем появляются кровотечения и кровоизлияния. Первая помощь: прополоскать рот и нос, затем выпить 6-10 стаканов теплой воды, после чего необходимо вызвать рвоту, надавливая на корень языка. Процедуру рекомендуют повторить несколько раз. Противоядие - витамин К (викасол). Дневная доза викасола при приеме внутрь составляет 0,015-0,03 г, для внутримышечного введения - 0,01-0,015 г. Детям в возрасте до одного года назначают по 0,002-0,005 г, до двух лет - 0,006 г, 3-4 лет - 0,008, 5-9 лет - 0,01 г, 10-14 лет - 0,015 г. Препарат назначают в течение 3-4 дней, потом делают перерыв и повторяют курс лечения еще 3-4 дня. Дневную дозу разбивают на 2 приема.

7.2. Фосфид цинка.

Симптомы отравления: жажда, плохой аппетит, тошнота, рвота, понос, тяжесть в голове, боли в области затылка, общая слабость, озноб, стеснение в груди. Пульс учащенный, слабый. Чувство страха, походка неуверенная, лихорадочное состояние, судороги.

Первая помощь: прополоскать рот и нос, вызвать рвоту. Рекомендуют частные повторные (до исчезновения запаха фосфата цинка в промывных водах) энергичные промывания желудка чистой водой или 0,25%

раствором медного купороса или 0,4% раствором перманганата калия. Медный купорос применяют в качестве рвотного средства (0,5 г на 300 мл воды). При сердечной недостаточности – введение под кожу 1 мл 10 или 20% раствора кофеина или 1-2 мл 20% камфорного масла, или 2 мл 25% раствора кордиамина. Введение в вену 10-20 мл 20-50% раствора глюкозы и инсулина (1 единица на 5 г сахара). При резком нарушении дыхания – введение под кожу 0,5 мл – 1 мл 1% раствора лобелина и искусственное дыхание.

Л - 70861 от 26.08.86 г. л. л. Зак. № 269 Тираж 1000
Типография Министерства здравоохранения СССР