

Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА **1937** **ЛЕНИНГРАД**

Редактор *Е. Шибалева*

Техн. ред. *М. Зильберборг*

Уполн. Главл. Б—11930.

Заказ тип. 527.

Тираж 30 000 экз.

4 п. л. 0,4 Уч. авт. л.

Форм. 62 × 94— $\frac{1}{16}$ л.

Сдано в набор 28/II 1937 г.

Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготавливаемая	5
Свекла столовая свежая заготавливаемая	7
Петрушка корневая свежая	9
Сельдерей корневой свежий	11
Пастернак свежий	13
Репка столовая свежая	15
Брюква столовая свежая	17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	19
Огурцы грунтовые свежие заготавливаемые	21
Томаты свежие (помидоры) заготавливаемые	23
Кабачки свежие заготавливаемые	25
Баклажаны свежие	27
Перец стручковый сладкий свежий	29
Перец стручковый горький свежий	31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	33
Дыни свежие	36
Арбузы свежие	38
Тыквы столовые свежие	40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	42
Лук репчатый свежий (продов.) заготавливаемый	44
Чеснок свежий	45
Лук-поррей свежий	48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки	49
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (летнего и осеннего потребления)	51
Капуста белокочанная свежая заготавливаемая (зимнего хранения)	54
Капуста краснокочанная свежая	57
Капуста цветная свежая	59
Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки	61

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ СВЕЖАЯ

ОСТ 5701
КЗ СНК 93

Утвержден 26/V 1933 г.
Срок введения 20/VI 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на свежую краснокочанную капусту. Капуста краснокочанная свежая по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
<p>I. Внешний вид</p> <p>Вполне сформировавшийся, свежий, чистый, цельный, здоровый кочан разнообразной формы, краснофиолетовой окраски, очищенный до плотно облегающих кочан листьев, с ровно обрезанной кочерыгой длиной не более 1 см от кочна</p> <p>Примечание. Для капусты краснокочанной, предназначенной для зимнего хранения, допускаются кочны с 2—3 листьями, не плотно облегающими кочан, т. е. с отстающими краями листьев на верхушке кочна</p> <p>II. Плотность кочна</p> <p>Кочан плотный, при нажиме не вдавливается</p> <p>III. Внутреннее строение кочна</p> <p>Окраска внутренних листьев краснофиолетовая</p>	<p>1. Кочны неправильно зачищенные до 5% по счету</p> <p>2. Кочны с кочерыгой длиной до 2 см до 10% по счету</p> <p>3. Легкая загрязненность кочней до 5% по счету</p> <p>4. Отпавшие от кочна листья не более 1% по весу</p>	<p>1. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету</p> <p>2. То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету</p> <p>3. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету</p> <p>4. То же, что и для 1-го сорта</p>	<p>1. Кочны с неприлегающими листьями</p> <p>2. Кочны с кочерыгой длиной свыше 2 см</p> <p>3. Грязные кочны</p> <p>4. Вялые кочны</p>
	Кочны менее плотные, но не рыхлые до 5% по счету	То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	Рыхлые кочны
	Кочны с недостаточно окрашенными листьями (с пробелью) до 5% по счету	То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	Кочны пестрой окраски (беловатой, сероватой и т. п.)

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Д о п у с к а ю т с я		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
IV. Вес кочна От 400 г и выше	Кочны от 300 до 400 г до 10% по счету	То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету	Кочны менее 300 г
П о в р е ж д е н и я			
	Механические: кочны слегка помятые, треснувшие, с засечкой черешков до 5% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта, по 10% по счету 2. Вредителями: незначительные поверхностные повреждения вредителями не более 10% по счету	1. Битые, мятые, трепанные, лопнувшие (проросшие). Треснувшие для капусты, предназначенной на зимнее хранение 2. Незначительные поверхностные повреждения вредителями в 1-м сорте Примечание. Для капусты, поступающей из зимнего хранения, допускается зачистка поврежденных мест кочна 3. Болезнями: загнившие и ослизлые 4. Кочны запаренные и промороженные свыше 3 слоев листьев

Общее число допускаемых отклонений по совокупности в 1-м сорте по пп. 1 и 3 «Внешнего вида» и по пп. 1 «Повреждений» не должно превышать 10%, а во 2-м сорте по пп. 1 и 3 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» — 20%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы. Капуста краснокочанная свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки капусты краснокочанной свежей указаны в $\frac{\text{ОСТ } 5703}{\text{КЗСНК} - 95}$.