

**3.1.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

**Профилактика холеры.
Организационные мероприятия.
Оценка противоэпидемической
готовности медицинских учреждений
к проведению мероприятий на случай
возникновения очага холеры**

**Методические указания
МУ 3.1.1.2232—07**

Издание официальное

Москва • 2008

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**3.1.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

**Профилактика холеры.
Организационные мероприятия.
Оценка противозидемической готовности
медицинских учреждений к проведению
мероприятий на случай
возникновения очага холеры**

**Методические указания
МУ 3.1.1.2232—07**

- П84 Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры: Методические указания.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008.—63 с.**

ISBN 5—7508—0712—6

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Ю. М. Федоров, Н. Я. Жилина); Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора (Ю. М. Ломов, Э. А. Москвитина, Л. С. Подосинникова, Л. Г. Воронежская, И. Я. Черепашина, Л. М. Смоликова, В. И. Прометный); Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора (А. С. Марамович, А. Ф. Даниленко, Г. А. Воронова, С. А. Косилко, В. И. Погорелов); Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора (А. В. Топорков, А. И. Кологоров); Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Противочумный центр» Роспотребнадзора (В. Е. Безсмертный, С. М. Иванова); Федеральным государственным учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (В. В. Малеев).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол № 2 от 21 июня 2007 г.).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 6 августа 2007 г. и введены в действие с 1 октября 2007 г.

4. Введены взамен МУ 3.1.1096—02 «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры».

ББК 51.9

ISBN 5—7508—0712—6

© Роспотребнадзор, 2008

© Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008

Содержание

1. Область применения	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Общие положения	6
4. Организационные профилактические противохолерные мероприятия	7
4.1. Составление комплексных планов противохолерных мероприятий	7
4.2. Формирование медицинского штаба	7
5. Мероприятия по организации и обеспечению противоэпидемической готовности Управлений (отделов) Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» и лечебно-профилактических учреждений на случай выявления больного (трупа) с подозрением на холеру	9
5.1. Составление оперативных планов проведения первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного (трупа)	9
5.2. Организация и обеспечение противоэпидемической готовности санитарно-карантинных отделов (пунктов)	10
5.3. Мероприятия по обеспечению эпидемиологического надзора за холерой	11
6. Формирование лабораторной базы	12
6.1. Формирование лабораторной базы и порядок ее реализации в очаге холеры	12
6.2. Расчет мощности лаборатории и организация лабораторной службы	12
6.3. Расчет потребности в кадрах	15
6.4. Организация труда	17
6.5. Материально-техническое обеспечение лаборатории	18
7. Противоэпидемическая готовность лечебно-профилактических учреждений	19
7.1. Формирование госпитальной базы – специальных лечебно-профилактических учреждений: инфекционного и провизорного госпиталей, изолятора	19
7.2. Мощности специализированных лечебно-профилактических учреждений, их штатно-организационная структура	19
7.3. Обеспечение специальных лечебно-профилактических учреждений средствами патогенетической и этиотропной терапии, защитной одеждой и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормативными документами	20
7.4. Обеспечение противоэпидемической готовности поликлиник, станций и пунктов скорой медицинской помощи	22
7.5. Организация и обеспечение работы патолого-анатомической службы	23
8. Оценка состояния готовности (критерии оценки) органов и учреждений Роспотребнадзора и лечебно-профилактических учреждений к проведению мероприятий на случай выявления больного (вибриононосителя) холерой	24

8.1. Оценка состояния готовности санитарно-эпидемиологической службы.....	25
8.2. Оценка состояния готовности санитарно-карантинных отделов (пунктов).....	25
8.3. Оценка состояния готовности лабораторной службы	26
8.3.1. Оценка готовности бактериологических лабораторий.....	26
8.3.2. Оценка общей готовности лабораторной базы	27
8.4. Оценка состояния готовности лечебных учреждений специального назначения (инфекционный госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор)	27
8.4.1. Инфекционный госпиталь.....	28
8.4.2. Провизорный госпиталь.....	28
8.4.3. Изолятор.....	29
8.5. Оценка состояния готовности других лечебно-профилактических учреждений (поликлиники, станции и пункты скорой медицинской помощи).....	29
8.6. Оценка состояния готовности прозектур городских и районных больниц, бюро судебно-медицинских экспертиз.....	30
8.7. Оценка состояния общей готовности медицинской службы (на территориальном, региональном уровне) к проведению противозидемических мероприятий при холере	30
<i>Приложение 1. Схема комплексного плана противохолерных мероприятий.....</i>	<i>32</i>
<i>Приложение 2. Укладка для забора материала от больного с подозрением на холеру (для лечебно-профилактических учреждений специального назначения, станций скорой и неотложной медицинской помощи, поликлиник, врачебных амбулаторий, участковых больниц, СКП, СКО, ПСКП)</i>	<i>41</i>
<i>Приложение 3. Укладка для забора проб из объектов окружающей среды на холеру (для ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»).....</i>	<i>42</i>
<i>Приложение 4. Паспорт на стационарную точку отбора проб воды.....</i>	<i>43</i>
<i>Приложение 5. Паспорт микробиологической (бактериологической, особо опасных инфекций) лаборатории для проведения исследований на холеру</i>	<i>45</i>
<i>Приложение 6. Формирование лабораторной базы очага холеры.....</i>	<i>48</i>
<i>Приложение 7. Нормы расхода диагностических препаратов и питательных сред на один анализ при исследовании на холеру.....</i>	<i>49</i>
<i>Приложение 8. Табель оснащения лаборатории мощностью 200, 500 и 1 000 анализов на холеру в сутки (продолжительность работы 30 дней).....</i>	<i>51</i>
<i>Приложение 9. Паспорт госпиталя для больных холерой (провизорного госпиталя, изолятора)</i>	<i>60</i>
<i>Приложение 10. Расчет автотранспорта для работы в очаге холеры</i>	<i>63</i>

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

6 августа 2007 г.

Дата введения: 1 октября 2007 г.

**3.1.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ.
КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

**Профилактика холеры.
Организационные мероприятия. Оценка
противоэпидемической готовности медицинских
учреждений к проведению мероприятий на случай
возникновения очага холеры**

**Методические указания
МУ 3.1.1.2232—07**

1. Область применения

1.1. Методические указания разработаны для внедрения и применения действующих санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» в части, касающейся организации и проведения профилактических противохолевых мероприятий на случай возникновения очага.

1.2. Методические указания предназначены для специалистов органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лечебно-профилактических учреждений, участвующих в организации и проведении противохолевых мероприятий, в обеспечении и оценке противоэпидемической готовности учреждений на территории Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322.

2.3. «Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569.

2.4. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 мая 2005 г. № 376 «О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера».

2.5. Методические указания «Организация, обеспечение и оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международного сообщения» МУ 3.4.1030—01.

2.6. Методические указания «Лабораторная диагностика холеры» МУ 4.2.2218—07.

2.7. Санитарные правила «Безопасность работы с микроорганизмами I—II групп патогенности (опасности)» СП 1.3.1285—03.

2.8. Санитарные правила «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» СП 3.1.1086—02.

2.9. Санитарные правила «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» СП 3.3.2.028—95.

2.10. Санитарные правила и нормы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1074—01.

2.11. Санитарные правила и нормы «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» СанПиН 2.1.4.1175—02.

2.12. Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» СанПиН 2.1.5.980—00.

2.13. Методические указания «Нормы времени на выполнение основных видов микробиологических исследований».—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 1999.—15с.

3. Общие положения

3.1. Организационные мероприятия по профилактике холеры включают комплекс мероприятий на случай выявления больного (тупа) с

подозрением на холеру и предупреждения возникновения очага этой инфекции.

3.2. Организация, обеспечение и оценка противозидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры являются составной частью организационных профилактических противохохерных мероприятий.

3.3. Проведение профилактических противохохерных мероприятий регламентируется действующими санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» и настоящими методическими указаниями.

4. Организационные профилактические противохохерные мероприятия

4.1. Составление комплексных планов противохохерных мероприятий

Управления (отделы) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по субъектам (городам и районам), ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, городах и районах с участием органов управления здравоохранением, противочумных учреждений и других заинтересованных органов и учреждений (Минобороны России, МВД России и др.) разрабатывают комплексные планы противохохерных мероприятий с учетом типа административных территорий (субъекта) по эпидемическим проявлениям холеры сроком на пять лет, ежегодно их корректируют. План утверждает руководитель управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по субъекту. Схема комплексного плана приведена в прилож. 1.

В плане предусмотрена следующая структура с указанием наименования мероприятий, сроков исполнения и ответственных исполнителей по разделам:

- 1) организационные мероприятия;
- 2) подготовка кадров;
- 3) профилактические мероприятия;
- 4) противозидемические мероприятия;
- 5) мероприятия после ликвидации очага холеры.

4.2. Формирование медицинского штаба

Формирование медицинского штаба предусматривают на случай выявления больного (подозрительного на заболевание) холерой, при

выделении из поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды холерных вибрионов O1 или O139 серогрупп с учетом эпидемической обстановки, угрозе распространения инфекции.

Санитарно-противоэпидемической комиссией (СПК) назначается начальник медицинского штаба – руководитель Управления (отдела) Роспотребнадзора в субъекте (муниципальном образовании). Начальник медицинского штаба координирует и контролирует выполнение решений штаба.

В состав медицинского штаба входят специалисты:

1) Управлений (отделов) Роспотребнадзора в субъекте (муниципальном образовании), ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте (филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в муниципальных образованиях) для осуществления:

- сбора и учета информации о профилактических и противоэпидемических противохолерных мероприятиях;
- эпидемиологического обследования очагов холеры;
- текущей и заключительной дезинфекции в очагах (по месту жительства, работы и др.), камерной дезинфекции, а также по эпидпоказаниям (систем водоснабжения, водоотведения, поверхностных водоемов и других объектов);
- организации, проведения и контроля бактериологическим обследованием больных холерой, вибрионосителей и контактировавших с ними, а также населения (по эпидпоказаниям) и исследованием проб из объектов окружающей среды;
- контроля выполнением режима биологической безопасности работы в холерном и провизорном госпитальных, изоляторе, бактериологических лабораториях, патологоанатомических отделениях (моргах) и других медицинских учреждениях, независимо от их ведомственной принадлежности;
- оперативного эпидемиологического анализа;
- санитарно-эпидемиологического надзора и контроля состояния среды обитания и условий проживания населения;
- санитарного надзора;
- санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за питанием населения, предприятиями общественного питания, торговли пищевыми продуктами и другими объектами;
- санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за детскими и подростковыми учреждениями;
- санитарно-эпидемиологического надзора и контроля за промышленными и другими объектами;

2) органов управления и учреждений здравоохранения для организации и проведения противохолерных мероприятий по обеспечению работы:

- по сбору и учету информации о противохолерных мероприятиях в лечебно-профилактических учреждениях;
 - холерного госпиталя с бактериологической лабораторией, провизорного госпиталя и изолятора для госпитализации, клинико-лабораторного, бактериологического обследования, лечения больных холерой и экстренной профилактики вибрионосителей и контактировавших с ними;
 - по госпитализации больных холерой, вибрионосителей и контактировавших с ними;
 - по активному выявлению больных холерой и находившихся с ними в одинаковых условиях по риску инфицирования путем организации подворных обходов;
 - по медицинскому наблюдению за контактировавшими с больными холерой или вибрионосителями, оставленными на дому;
 - по организации и проведению сплошного или выборочного бактериологического обследования на холеру населения;
 - патолого-анатомических отделений (моргов) – по вскрытию умерших, причиной смерти которых явились кишечные инфекции неустановленной этиологии, отбору проб и доставке в бактериологическую лабораторию для исследований на холеру;
 - по текущей и заключительной дезинфекции в холерном госпитале, провизорном госпитале, изоляторе и других объектах;
- 3) противочумных учреждений, консультанты – инфекционисты, эпидемиологи, бактериологи и другие.**

5. Мероприятия по организации и обеспечению противозидемической готовности Управлений (отделов) Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» и лечебно-профилактических учреждений на случай выявления больного (трупа) с подозрением на холеру

5.1. Составление оперативных планов проведения первичных противозидемических мероприятий на случай выявления больного (трупа)

В плане предусматривают:

- порядок передачи информации (в рабочее и нерабочее время) о выявлении подозрительного больного;

- схему оповещения и сбора специалистов (в рабочее и нерабочее время);
- наличие комплектов индивидуальной защиты (противочумные костюмы или другие регламентированные средства индивидуальной защиты);
- наличие и укомплектование укладок для забора материала от больного (с подозрением на заболевание) холерой и проб из объектов окружающей среды (прилож. 2, 3);
- учет имеющихся дезинфекционных камер, определение степени их пригодности к эксплуатации и содержание в постоянной готовности;
- определение функциональных обязанностей и действий каждого специалиста при выявлении больного (трупа) с подозрением на холеру.

5.2. Организация и обеспечение противоэпидемической готовности санитарно-карантинных отделов (пунктов)

Противоэпидемическая готовность санитарно-карантинных отделов (СКО) на водном транспорте, санитарно-карантинных пунктов (СКП) на воздушном и автодорожном, пограничных санитарно-карантинных пунктов (ПСКП) на железнодорожном транспорте проводится согласно оперативному плану первичных противоэпидемических мероприятий, который утверждается руководителем Управления (отдела) Роспотребнадзора и содержит следующие основные мероприятия:

- порядок передачи информации (в рабочее и нерабочее время) о выявлении больного с подозрением на холеру;
- составление и корректировка оперативных планов первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного на транспортном средстве, в здании аэровокзала, морского (речного) вокзала, железнодорожной или автодорожной станции;
- определение приказом руководителя транспортного предприятия места санитарной площадки (причала, тупика, стоянки), мероприятий диспетчерских служб при выявлении больного с подозрением на холеру на транспортном средстве;
- согласование порядка обеспечения вооруженной охраны транспортного средства, багажа пассажиров;
- согласование порядка прохождения пограничного и таможенного контроля больного с подозрением на холеру и пассажиров, контактных с больным, их багажа;
- определение и подготовка необходимого набора помещений:
 - для временной изоляции больного с подозрением на холеру;

- о для хранения багажа больного, пассажиров, контактировавших с больным, подозрительным на заболевание холерой;
- выделение транспорта для эвакуации больного и контактировавших с ним из транспортного средства в помещение для временной изоляции;
- укомплектование укладки для забора материала (прилож. 2, 3);
- наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств;
- взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями специального назначения, со службами транспортного предприятия и противочумными учреждениями.

5.3. Мероприятия по обеспечению эпидемиологического надзора за холерой

Мероприятия включают:

- сбор и анализ заболеваемости холерой за рубежом и на территории России;
- ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости холерой и выявления вибрионосителей, выделения холерных вибрионов O1/O139 из объектов окружающей среды на обслуживаемой территории;
- определение контингентов, подлежащих обязательному бактериологическому обследованию на холеру в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой», осуществление контроля за обследованием людей на холеру;
- определение стационарных точек отбора проб воды на холеру из поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды и осуществление контроля за исследованием на холеру;
- проведение мероприятий при выделении холерных вибрионов O1/O139 серогрупп из объектов окружающей среды.

На стационарные точки отбора проб воды из поверхностных водоемов специалистами ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» составляются паспорта, которые согласовываются и контролируются Управлениями (отделами) Роспотребнадзора (прилож. 4).

Лабораторные исследования на холеру проводят бактериологические лаборатории ФГУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии», лечебно-профилактических и противочумных учреждений, имеющих лицензию на деятельность с возбудителями II—III групп патогенности с обеспечением режима безопасности работы в соответствии с действующими са-

нитарно-эпидемиологическими правилами «Безопасность работы с микроорганизмами I—II групп патогенности (опасности)».

На лаборатории для проведения исследований на холеру составляется паспорт (прилож. 5).

6. Формирование лабораторной базы

6.1. Формирование лабораторной базы и порядок ее реализации в очаге холеры

При выборе лаборатории руководствуются обязательными требованиями, предусматривающими размещение ее в отдельном здании или в изолированных помещениях (в обоих случаях с двумя входами) с наличием водопровода и канализации, силовой электроэнергии, телефонной связи. Планировка здания должна позволять развертывание всех подразделений лаборатории для проведения исследований на холеру с соблюдением требований действующих санитарных правил по режиму биологической безопасности работы.

Все диагностические лаборатории, предусмотренные для работы в очаге холеры, входят в лабораторную базу очага (прилож. 6).

С учетом конкретной ситуации корректируют предусмотренный комплексным планом противохолерных мероприятий порядок перепрофилирования лабораторных помещений, реализации расчетной мощности и кадрового обеспечения лабораторной базы.

6.2. Расчет мощности лаборатории и организация лабораторной службы

Мощность лаборатории определяется максимальным количеством анализов, которое может быть выполнено в сутки. Мощность лабораторной базы очага определяется суммой показателей мощности всех лабораторий. Расчет производственной мощности лабораторий проводят в соответствии с «Нормами времени на выполнение основных видов микробиологических исследований», утвержденными Минздравом России (1999).

Среднее время, затрачиваемое на 1 анализ, выраженное в лабораторных единицах (10 мин), определяется суммой средних показателей времени для каждого вида исследований с учетом вероятной частоты встречаемости его в общем объеме анализов.

Предусмотрены показатели затрат времени на 1 анализ (в лабораторных единицах) всех сотрудников лаборатории (врач, лаборант, санитарка) для разных групп анализов.

Исследование по полной схеме:

материала от людей – 5,0;

воды – 7,5.

Идентификация выделенной культуры:

слайд-агглютинация – 2,0;

реакция иммунофлюоресценции – 6,0;

развернутая агглютинация – 4,5;

биохимическое исследование – 3,0;

чувствительность к фагам – 4,0;

определение токсигенности бактериологическим и биологическим методами – 6,0;

определение токсигенности в ПЦР – 18,0;

определение чувствительности к антибиотикам методом дисков – 2,0;

определение чувствительности к антибиотикам методом серийных разведений – 6,0;

приготовление питательной среды – 0,5;

контроль качества питательной среды – 4,0;

прием, регистрация, выдача ответа – 0,75.

Расчет производственной мощности лабораторной базы проводят совместно эпидемиологическое и лабораторное подразделения с учетом количественных показателей анализов для конкретных контингентов и объектов обследования с определением среднесуточного объема по схеме (табл. 1).

Таблица 1

Расчет производственной мощности лаборатории

№ п/п	Объекты исследования	Количество объектов	Количество анализов	Количество дней работы лаборатории	Среднее количество анализов
1	2	3	4	5	6

В графе «Объекты исследования»: а) больные холерой и вибрионосители (определяется ориентировочно 1 : 1); б) контактные с больными и вибрионосителями (1 : 4—5); в) больные ОКИ; г) обследование на вибрионоительство декретированных и других групп населения; д) объекты окружающей среды (водные объекты, источники водоснабжения, хозяйственно-бытовые стоки, пробы из очага больного и вибрионосителя).

Планируемая мощность лабораторной базы (M) определяется как сумма показателей графы 6.

При планировании целесообразно исходить из следующих положений:

- общее количество анализов на одного больного холерой и вибриононосителя составляет 6;
- число госпитализированных в провизорный госпиталь в день должно быть выше примерно на 15,0 % по отношению к среднесуточному количеству больных ОКИ, вычисленному для данного сезона в конкретном населенном пункте (за счет активного выявления больных);
- среднее число анализов от одного госпитализированного в провизорный госпиталь составляет 3;
- количество лиц, подлежащих обследованию на вибриононосительство, определяется противоэпидемической службой очага.

Объем и продолжительность работы лабораторной базы после ликвидации очага холеры рассчитывают в соответствии с конкретными задачами, определяемыми противоэпидемической службой.

Необходимо предусмотреть планирование обследований (в сутки) по контингентам и регулирование нагрузки лабораторий в соответствии с их расчетной мощностью.

Расчетная мощность лаборатории может быть превышена (иногда) не более чем на 20 %. Ответственность за регулирование нагрузки лабораторий возлагается на руководителя лабораторной службы очага.

В зависимости от территории очага, объема исследований и имеющихся возможностей лабораторная база очага может состоять из одной, двух или более лабораторий.

Целесообразно следующее распределение анализов между лабораториями по контингентам с учетом особенностей их исследования:

- анализы из холерного и провизорного госпиталей, изолятора и обсерватора;
- анализы от остальных групп населения, обследуемых по эпидемиологическим показаниям (декретируемые контингенты, обследуемые в соответствии с эпидемиологическим надзором, и другие);
- исследование объектов окружающей среды.

Указанные группы анализов целесообразно вести и учитывать раздельно, независимо от их распределения в одной или более лабораториях.

При большом объеме исследований основные питательные среды готовят и контролируют централизованно в специально организованной лаборатории. Целесообразно централизованно осуществлять розлив 1 %-й пептонной воды по флаконам и пробиркам, доставляя их в лабо-

раторию стерильными. Также целесообразно организовывать дополнительные формирования, обеспечивающие централизованную стерилизацию лабораторной посуды для всех очаговых лабораторий и обеззараживание посевов.

При работе в очаге нескольких диагностических лабораторий идентификацию культур вибрионов в каждой из них проводят по сокращенной схеме или ограничиваются слайд-агглютинацией.

Полную идентификацию холерных и других видов вибрионов, с характеристикой чувствительности к антибиотикам и токсигенности, проводит специально организованная лаборатория или группа в составе одной из действующих лабораторий. Она же осуществляет контроль питательных сред. При необходимости в составе этой же лаборатории организуют группу серологических исследований.

Группы отбора проб входят в состав противоэпидемической службы. Обеспечение их необходимыми средствами для отбора проб осуществляет лабораторная служба.

Менее рациональным является принцип организации лабораторной службы в очаге холеры – распределение анализов по территориальному признаку.

6.3. Расчет потребности в кадрах

Особенностью работы лабораторий в очаге холеры является необходимость круглосуточной и ежедневной работы лабораторий. Предлагается следующая формула расчета потребности в кадрах, необходимых для реализации расчетной производственной мощности лаборатории в очаге холеры:

$$M = \frac{P \cdot C}{H_{\text{сп}}}, \quad C = \frac{M \cdot H_{\text{ф}}}{P}, \text{ где}$$

M – производственная мощность лаборатории (количество анализов в сутки);

P – средняя продолжительность работы 1-го сотрудника в сутки (ч);

C – общее число сотрудников лаборатории;

$H_{\text{ф}}$ – норма времени на 1 анализ (человеко-час).

Под нормой времени здесь принята сумма средних показателей рабочего времени врача, лаборанта, санитарки, необходимого для качественного выполнения одного анализа в условиях рациональной организации труда.

Для удобства расчета показатель времени вычисляют как сумму средних показателей времени, затрачиваемого на производство анализа

– на основные манипуляции, вспомогательные, подготовительно-заключительные работы и личные нужды.

Следует иметь в виду зависимость нормы времени анализа от производственной мощности лабораторий – чем больше мощность лаборатории, тем больше (при правильной организации труда) возможности увеличения производительности за счет максимальной дифференциации выполняемых операций и экономии времени на вспомогательных и подготовительно-заключительных работах.

При расчете мощности лаборатории учитывают, что сотрудники лабораторий в очаге холеры не выполняют внелабораторную работу, как это имеет место в обычное время.

При таком расчете нормы времени одного анализа показатель P (средняя продолжительность времени работы одного сотрудника в сутки) можно учитывать полностью, т. е. как 100 %. Величина показателя P определяется в зависимости от принятого графика двух- или трехсменной работы лаборатории в сутки.

Показатели H_{cp} для анализов от людей (H_A) и проб воды (H_B) существенно различаются за счет удвоенного количества анализов для воды (1 проба – 2 анализа) и сравнительного преобладания числа анализов, требующих отбора колоний с последующей дифференциацией.

Соответственно для лабораторий, сочетающих эти виды анализов, расчет производится по формуле:

$$C = \frac{(M_A \cdot H_A) + (M_B \cdot H_B)}{P}$$

Показатель H_{cp} для анализов пищевых продуктов, смывов и другого приравнивается к анализам от людей.

При расчете потребности кадров для таких лабораторий следует считать, что анализы проб воды в показателе производственной мощности (M) для очаговых лабораторий составляют не более 20 %.

При наличии обосновывающих данных расчет конкретизируют с учетом значений H_{cp} при массовом исследовании на холеру (табл. 2).

Таблица 2

Значение H_{cp} при массовых исследованиях на холеру

Объекты исследования	Производственная мощность (M)					
	< 100	> 100	> 200	> 300	> 500	> 1 000
Люди	0,45	0,40	0,35	0,30	0,23	0,2
Вода	1,40	1,20	1,0	0,9	0,75	0,6

При этом следует принять за оптимальное соотношение врач—лаборант—санитарка при $M = 200—500$ как $1 : 2 : 1$. При M более $500—3\ 000$ — $1 : 3 : 3$ и при M более $3\ 000$ — $1 : 4 : 4$.

Нормы времени на один анализ не предусматривают работу лабораторий средоварения. Потребность в кадрах для лаборатории средоварения определяется дополнительно в зависимости от исходного продукта приготовления основных сред (полное средоварение, приготовление из сухих готовых сред и т. д.).

Расчет потребности лабораторных работников для осуществления контроля питательных сред определяется не только в зависимости от потребности в средах для расчетного объема лабораторных исследований, но и от производственной мощности емкостей для средоварения.

В соответствии с расчетной мощностью лабораторий, входящих в состав лабораторной службы, определяют потребность в лабораторных работниках для каждой из них. Потребность лабораторной базы очага в кадрах определяется суммой этих показателей для каждой из лабораторий. Производить такой расчет, исходя из мощности всей лабораторной базы, нельзя, т. к. сумма лабораторных работников, необходимых для работы в очаге нескольких лабораторий, будет больше, чем для одной, производственная мощность которой равна сумме мощностей этих лабораторий.

Централизация лабораторных исследований в очаге холеры позволяет наиболее эффективно использовать привлеченные малоквалифицированные по этой инфекции кадры лабораторных работников за счет максимальной дифференциации выполняемых операций.

6.4. Организация труда

Максимальная производительность труда лаборатории может быть достигнута в результате предельно узкой специализации выполняемых операций.

В каждой лаборатории должны быть созданы следующие функциональные подразделения — группы:

- приема материала;
- пересевов;
- просмотра посевов и отбора колоний;
- идентификации, ускоренной диагностики и определения антибиотикограмм;
- обеззараживания материала;
- мойки посуды, заготовки и стерилизации;

- розлива сред и подготовки их к посевам;
- регистрации и выдачи ответов;
- материально-технического обслуживания.

Количественный состав групп функционального подразделения определяется объемом выполняемых исследований.

Примерное распределение лабораторных работников по функциональным группам в лабораториях, работающих круглосуточно, дано в табл. 3.

Таблица 3

**Примерное распределение работников по функциональным группам
в лаборатории мощностью 1 000 анализов в сутки
(700 – от людей и 300 – воды)**

№ п/п	Функциональная группа	Врачи	Лаборанты	Младший медицинский персонал
1	Группа приема материала	–	7	–
2	Группа пересевов	–	6	–
3	Группа просмотра посевов	7	3	–
4	Группа идентификации, ускоренной диагностики и определения антибиотикограмм	7	9	–
5	Группа обеззараживания	–	5	–
6	Группа мойки, стерилизации и подготовки посуды	–	3	22
7	Группа розлива сред	–	8	–
8	Группа регистрации	1	3	–
9	Группа материально-технического обеспечения и хозяйственных работ (не считая специалистов по оборудованию, электрика, сантехника и т. д.)	–	1	8
Итого:		15	45	30

6.5. Материально-техническое обеспечение лаборатории

Расчет потребности в оборудовании, лабораторной посуде, спецодежде, питательных средах и диагностических препаратах проводят с учетом норм их расходов на 1 анализ (прилож. 7).

Примерный табель оснащения лаборатории мощностью 200, 500 и 1 000 анализов на холеру с продолжительностью 30 дней дан в

прилож. 8. В соответствии с табелем определяют наличие и дополнительную потребность.

7. Противоэпидемическая готовность лечебно-профилактических учреждений

7.1. Формирование госпитальной базы – специальных лечебно-профилактических учреждений: инфекционного и провизорного госпиталей, изолятора

Выбор и набор помещений специальных лечебных учреждений: инфекционного госпиталя для больных холерой, провизорного госпиталя, изолятора осуществляют в соответствии с действующими санитарными правилами по биологической безопасности работы. Лечебно-профилактические учреждения, предусмотренные для использования под госпитальную базу, должны иметь:

- паспорта на госпиталь для больных холерой, провизорный госпиталь и изолятор (прилож. 9);
- оперативные планы первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на холеру;
- схему оповещения при выявлении больного с подозрением на холеру;
- укладку для забора материала от больного (прилож. 2);
- запас средств экстренной профилактики, дезинфицирующих средств, защитной одежды.

7.2. Мощности специализированных лечебно-профилактических учреждений, их штатно-организационная структура

При планировании госпитальной базы необходимо учитывать, к какому типу по эпидемическим проявлениям холеры относится административная территория.

Мощность холерного госпиталя должна быть предусмотрена на единичные и групповые случаи заболеваний холерой и вибриононосительства (более пяти больных холерой и вибриононосителей). Мощность провизорного госпиталя в очаге холеры определяется в зависимости от уровня заболеваемости острыми кишечными инфекциями в данном населенном пункте в месяц сезонного подъема и рассчитывается по формуле:

$$П_{нз} = 1,15 \cdot P \cdot K, \text{ где}$$

$П_{нз}$ – потребность в койках;

1,15 – поправочный коэффициент;

P – среднее число больных ОКИ за месяц сезонного подъема (по данным за предыдущие 3 года);

K – продолжительность пребывания больного на койке (7 дней).

Мощность изолятора определяется на основании предполагаемого количества больных холерой и вибрионосителей и средней численности состава семьи на конкретной территории, определяется по формуле:

$$P_{из} = B \cdot H, \text{ где}$$

$P_{из}$ – потребность в койках для изоляции контактных;

B – предполагаемые количества больных холерой и вибрионосителей;

H – средняя численность семьи на данной территории.

7.3. Обеспечение специальных лечебно-профилактических учреждений средствами патогенетической и этиотропной терапии, защитной одеждой и дезинфицирующими средствами в соответствии с действующими нормативными документами

В лечебных учреждениях, на базе которых в соответствии с комплексным планом предусматривается развернуть специализированные учреждения на единичные случаи холеры, должен быть резервный запас средств патогенетической и этиотропной терапии, защитной одежды (противочумные костюмы IV типа, резиновые перчатки и респираторы) и дезинфицирующих средств.

При регистрации групповых случаев холеры недостающие средства обеспечиваются из фонда Министерства (департамента, отдела, управления) здравоохранения субъекта РФ.

Лечебными учреждениями, на базе которых планируется развертывание холерного госпиталя, должны быть предусмотрены необходимое оборудование, запас медикаментов для проведения патогенетической и этиотропной терапии (табл. 4).

В обязательном порядке должно быть предусмотрено наличие оборудования для оснащения реанимационно-регидратационной палаты (отделения), определены источники дооснащения (электрокардиограф, центрифуга и др.) (табл. 5).

Таблица 4

Оснащение холерного госпиталя на 100 больных

№	Наименования медикаментов и других материалов	Количество
Для патогенетической терапии (регидратационные растворы)		
1	Глюкосалан	650 пакетов (на 1 л раствора каждый)
2	Молочно-кислый раствор Рингера или другой регидратационный раствор типа трисоль, дисоль, квартасоль, дакский раствор 5 : 4 : 1	300 флаконов по 400 мл
3	Апирогенные системы для внутривенного введения	50 шт.
4	Наборы для введения жидкости в вены головы у детей или подключичную вену	10 шт.
5	Интраназальный катетер, внешний диаметр 2,7 мм, внутренний диаметр 1,5 мм, длина 38 см (для детей)	3 шт.
Другие предметы и материалы для организации лечения		
1	Бак с краном (с отметкой уровней на 5 и 10 л) для приготовления больших количеств растворов глюкосалана	2
2	Сосуд емкостью на 1 л для раствора глюкосалана	20
3	Стаканы на 200 мл для питья	100
4	Чайные ложки	20
5	Вата	5 кг
6	Лейкопластырь	3 катушки
7	Бинты разные	20 шт.
8	Шприцы одноразовые на 2, 5, 10 и 20 мл	400 шт.
9	Шприцы обычные, разного объема	20 шт.
10	Иглы к шприцам № 16—18	30 шт.
11	Стерилизатор	1
12	Перчатки хирургические 6—9 размера	50
13	Марля	20 м
14	Жгуты для сдавливания вен конечностей	3 шт.
15	Термометр максимальный	5 шт.
16	Штатив для внутривенной трансфузии	5
17	Емкости для сбора выделений	50
18	Емкости для приготовления дезсредств, 10 л	4

Таблица 5

Оснащение реанимационно-регидратационной палаты

№	Наименования медикаментов и других материалов	Количество
1	Специальная или приспособленная холерная кровать	2
2	Градуированное или приспособленное ведро	4
3	Таз для рвотных масс	2
4	Емкость для обеззараживания выделений больных (20—30 л)	1
5	Емкость для замачивания горшков, подкладных суден (10—15 л)	1
6	Емкость для замачивания белья (10—15 л)	1
7	Емкость для обеззараживания столовой посуды больного (5—10 л)	1
8	Емкость для замачивания спецодежды персонала (20—30 л)	1
9	Емкость для замачивания аптечной посуды (10—15 л)	1
10	Ведро с тряпками для мытья полов	1
11	Бутыль для приготовления маточного раствора 10 %-й хлорной извести	1
12	Емкость для мытья (дезинфекции) рук персонала	1
13	Дезковрик	1
14	Стерилизатор, электроплитка	1 + 1
15	Укладка для забора материала от больного, бикс для его транспортирования	1
16	Рабочий стол или тумбочка	1
17	Центрифуга на 3 000 об./мин	1
18	Набор флаконов для определения удельного веса плазмы	1
19	Штатив для внутривенной трансфузии	2
20	Грелка	5
21	Тонометр с фонендоскопом	1
22	Электрокардиограф портативный с автономным питанием	1
23	Клеенчатый мешок для хранения и отправки вещей больного и постельных принадлежностей	2

7.4. Обеспечение противоэпидемической готовности поликлиник, станций и пунктов скорой медицинской помощи

В целях обеспечения противоэпидемической готовности поликлиник, станций и пунктов скорой медицинской помощи эти учреждения должны иметь:

- оперативный план проведения первичных противозидемических мероприятий на случай выявления больного (трупа), подозрительного на холеру;

- схему оповещения вышестоящих организаций;

- противочумные костюмы IV типа (комбинезон или пижама, носки, тапочки, шапочка или малая косынка, противочумный или хирургический халат) + РП (респиратор) не менее 3 комплектов;

- укладки для забора материала от больных (прилож. 2);

- солевые растворы для пероральной регидратации – не менее 5 л, система разовая для внутривенного введения – 2 комплекта;

- аптечка для неотложной помощи больному в критическом состоянии;

- у всех специалистов, ведущих прием больных, у ответственного дежурного врача смены станции (пункта) скорой медицинской помощи должны быть памятки по основным клиническим симптомам холеры и действию врача при выявлении больного, мерам личной профилактики и правилам забора материала для лабораторного исследования на холеру.

7.5. Организация и обеспечение работы патолого-анатомической службы

Для вскрытия умерших с подозрением на холеру должно быть предусмотрено патолого-анатомическое отделение. Вскрытие трупа с подозрением на холеру проводит бригада, включая патологоанатома (судмедэксперта), имеющего специальную подготовку с соблюдением требований биологической безопасности работы.

Штатное расписание патолого-анатомической службы определяется мощностью госпитальной базы административной территории.

В патолого-анатомическом отделении должны быть:

- оперативный план противозидемических мероприятий на случай подозрения на холеру при вскрытии трупа;

- схема оповещения;

- памятка по технике вскрытия и забора материала для бактериологического исследования;

- защитная одежда (противочумный костюм II типа, 2-я пара резиновых перчаток, фартук, нарукавники);

- укладка для забора материала (прилож. 2);

- стерильный секционный набор;

- запас дезинфицирующих средств и емкости для их приготовления.

8. Оценка состояния готовности (критерии оценки) органов и учреждений Роспотребнадзора и лечебно-профилактических учреждений к проведению мероприятий на случай выявления больного (вибриононосителя) холерой

Под готовностью подразумевается способность к оперативному проведению комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах холеры.

Организационные мероприятия включают составление оперативных планов противоэпидемических мероприятий, обеспечение лечебно-профилактических учреждений со стороны Управлений (отделов) Роспотребнадзора или противочумных учреждений сведениями о заболеваемости холерой в мире, странах СНГ и России, теоретическую и практическую подготовку медицинского персонала.

Готовность лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов, здравпунктов, СКП, СКО к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий определяется возможностями диагностировать (заподозрить) заболевание с симптомами холеры по месту жительства, работы, на транспортном средстве в пути следования, по прибытии в пункт назначения, в гостинице, поликлинике, стационаре, морге. Большое значение имеет умение оперативно осуществить первичные действия со стороны медицинских работников в местах выявления подозрительного больного.

Показателем готовности госпитальной и лабораторной базы является фактическая способность к оперативному развертыванию специальных стационаров, изоляторов, бактериологических лабораторий, а также обеспеченность их оборудованием, защитной одеждой, диагностическими средствами, дезинфекционными препаратами.

Из всех возможных способов проверки готовности учреждений наиболее действенным и эффективным являются тренировочные занятия, если они проведены в условиях, максимально приближенных к реальным.

Наиболее целесообразно оценивать готовность учреждений, используя балльную шкалу, где каждому критерию соответствует определенное количество баллов (в диапазоне от 0 до максимального значения для данного критерия), которые выводятся экспертным путем. Сумма баллов, превышающая 75 из 100, указывает на удовлетворительную готовность проверяемого учреждения.

**8.1. Оценка состояния готовности
санитарно-эпидемиологической службы**

Таблица 6

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Наличие комплексного плана противохолерных мероприятий и кратность его корректировки: а) ежегодно б) раз в два года	15 10
2	Наличие схемы взаимодействия: а) в режиме повседневной готовности б) в чрезвычайном режиме	5 10
3	Степень подготовленности специалистов ФГУЗ «Центров госсан-эпиднадзора» по холере: а) 75 % специалистов центра имеют подготовку б) 50 % специалистов имеют подготовку	15 5
4	Наличие укладок	15
5	Укомплектованность укладок	15
6	Мониторинг за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями в регионе (наличие информационно-аналитической базы)	30
Итого (максимум)		100

**8.2. Оценка состояния готовности
санитарно-карантинных отделов (пунктов)**

Таблица 7

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Укомплектованность кадрами	10
2	Наличие и готовность помещения транспортного предприятия для временной изоляции подозрительного на холеру больного	10
3	Наличие и реальность оперативного плана, наличие схемы оповещения, функциональных обязанностей медработников, расчета сил и средств, обеспеченность памятками по холере	25
4	Число медицинских работников, прошедших теоретическую подготовку по холере с учетом 75 %-го охвата	10
5	Число сотрудников, участвовавших в практических тренировочных занятиях по холере с учетом 75 %-го охвата	10
6	Знание медработниками эпидемиологии, клиники, диагностики холеры (система экзаменов, зачетов)	5*
7	Наличие у медработников практических навыков в пользовании укладками для забора материала, дезинфицирующими средствами	15
8	Наличие дезинфицирующих средств, емкостей для их приготовления	5
9	Наличие, количество и укомплектованность укладок для забора материала, средств личной профилактики	10
Итого		100

8.3. Оценка состояния готовности лабораторной службы

Готовность бактериологических лабораторий определяется наличием плана перепрофилирования на случай проведения лабораторной диагностики в очаге холеры, исследований ускоренными и классическими методами материала от больных, подозрительных на заболевание холерой, от контактных с больным, проб из объектов окружающей среды, пищевых продуктов. Каждая лаборатория выполняет определенный объем исследований (с учетом ее мощности), предусмотренный комплексным планом. Непременным условием готовности этих учреждений является достаточная производственная площадь для соблюдения точности движения заразного материала и режим работы согласно действующим санитарным правилам, укомплектованность квалифицированными кадрами, обеспеченность необходимым оборудованием, средами и диагностическими препаратами.

8.3.1. Оценка готовности бактериологических лабораторий

Таблица 8

№ п/п	Критерии оценки	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в краях, областях и городах	ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в районах	Лечебно-профилактические учреждения
		баллы	баллы	баллы
1	2	3	4	5
1	Наличие и реальность плана перепрофилирования лаборатории, ее расчетной мощности	5	10	10
2	Укомплектованность кадрами а) врачами-бактериологами б) лаборантами	5 5	10 10	10 10
3	Наличие схем оповещения, графика работы	5	5	5
4	Наличие и укомплектованность укладок для забора материала от больного	5	5	—
5	Подготовка медработников по лабораторной диагностике холеры (специальные курсы, семинары, решение практических задач)	10	10	10
6	Обеспеченность питательными и дифференциальными средами, диагностическими препаратами, реактивами, антибиотиками, дезинфицирующими средствами	10	10	15

Продолжение табл. 8

1	2	3	4	5
7	Обеспеченность термостатами, холодильниками, микроскопами, автоклавами, сушильными шкафами, центрифугами	10	10	10
8	Наличие люминесцентных микроскопов	10	10	10
9	Реальность проведения исследований: а) методом флюоресцирующих антител; б) ускоренными методами; в) посев на питательные среды и выделение чистой культуры; г) определение чувствительности к антибиотикам; д) идентификация выделенной культуры до определения вида и оценки эпидемической значимости комплексным методом; е) ПЦР* (для лабораторий в административных центрах)	5 5 5 10 10 10	10 — 10 — — —	5 — 10 5 — —
Всего баллов		100 (110*)	100	100

8.3.2. Оценка общей готовности лабораторной базы

Готовность лабораторной базы оценивается по совокупности критериев на основании экспертной оценки каждой лаборатории.

Таблица 9

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	План работы лабораторной службы при возникновении очага холеры	25
2	Расчет мощности лабораторной базы	10
3	План и порядок перепрофилирования лабораторных помещений	20
4	Кадровое обеспечение лабораторной базы	10
5	План регулирования нагрузки лабораторий	10
6	План работ по материально-техническому обеспечению лабораторий	25
Итого (максимум)		100

8.4. Оценка состояния готовности лечебных учреждений специального назначения (инфекционный госпиталь, провизорный госпиталь, изолятор)

Готовность госпитальной базы определяется способностью лечебно-профилактических учреждений, определенных комплексным планом, к развертыванию стационаров различного профиля. Существенное значение имеет обеспеченность этих учреждений квалифицированными,

теоретически и практически подготовленными кадрами, достаточным запасом необходимых медикаментов, диагностическим и другим лабораторным оборудованием, мягким и твердым инвентарем, средствами для дезинфекции. Готовность каждого учреждения госпитальной базы оценивается в баллах по 100-балльной шкале.

8.4.1. Инфекционный госпиталь

Таблица 10

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Наличие и реальность схемы перепрофилирования лечебно-профилактического учреждения для приема и лечения больных	20
2	Укомплектованность кадрами	17
3	Подготовленность основного и дублирующего персонала ЛПУ к работе в условиях госпиталя (уровень теоретической и практической подготовки)	17
4	Коечный фонд (количество и возможность его приспособления)	13
5	Обеспеченность оборудованием, медикаментами и другими материалами, необходимыми для проведения диагностики, патогенетического и этиотропного лечения, защитной одеждой	23
6	Готовность учреждения к проведению дезинфекционных мероприятий (наличие необходимых дезинфицирующих средств и инвентаря)	10
Итого		100

8.4.2. Провизорный госпиталь

Таблица 11

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Наличие и реальность схемы перепрофилирования лечебно-профилактического учреждения в провизорный госпиталь	20
2	Укомплектованность кадрами	20
3	Подготовленность основного и дублирующего персонала ЛПУ к работе в условиях госпиталя (уровень теоретической и практической подготовки)	16
4	Достаточность коечного фонда	12
5	Обеспеченность оборудованием, медикаментами и другими материалами, необходимыми для проведения диагностики, патогенетического и этиотропного лечения, защитной одеждой	20
6	Готовность учреждения к проведению дезинфекционных мероприятий (наличие необходимых дезинфицирующих средств и инвентаря)	12
Итого		100

8.4.3. Изолятор

Таблица 12

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Наличие и реальность схемы перепрофилирования лечебно-профилактического учреждения в изолятор	30
2	Укомплектованность кадрами	30
3	Подготовленность основного и дублирующего персонала ЛПУ к работе в условиях изолятора (уровень теоретической и практической подготовки)	16
4	Достаточность коечного фонда	12
5	Готовность учреждения к проведению дезинфекционных мероприятий (наличие необходимых дезинфицирующих средств и инвентаря)	12
Итого		100

**8.5. Оценка состояния готовности других
лечебно-профилактических учреждений (поликлиники,
станции и пункты скорой медицинской помощи)**

Таблица 13

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Наличие и реальность оперативного плана, наличие схемы оповещения, функциональных обязанностей медработников, обеспеченность памятками по холере	40
2	Число медицинских работников, прошедших теоретическую подготовку по холере, с учетом процента охвата	10
3	Число работников, участвовавших в практических тренировочных занятиях по холере, с учетом процента охвата	10
4	Знание медработниками основ клиники, диагностики холеры	5
5	Наличие у медработников практических навыков в пользовании защитной одеждой, укладками для забора материала, дезинфицирующими средствами	10
6	Количество и укомплектованность упаковок защитной одежды	10
7	Наличие дезинфицирующих средств, емкостей для их приготовления	5
8	Наличие, количество и укомплектованность упаковок для забора материала, средств личной профилактики	10
Итого		100

8.6. Оценка состояния готовности прозектур городских и районных больниц, бюро судебно-медицинских экспертиз

Таблица 14

№ п/п	Критерии	Баллы
1	Наличие и реальность оперативного плана, схемы оповещения, обеспеченность памятками	20
2	Число прозекторов, судмедэкспертов, лаборантов, прошедших теоретическую (на семинарах) подготовку по холере (с указанием процента охвата)	15
3	Число работников, участвовавших в практических тренировочных занятиях по холере, с учетом процента охвата	15
4	Знание патолого-анатомической картины холеры	5
5	Практические навыки медработников в пользовании защитной одеждой, укладками для забора материала, дезинфицирующими средствами	5
6	Количество и укомплектованность укладок защитной одежды	10
7	Наличие дезинфицирующих средств, емкостей для их приготовления	10
8	Наличие, количество и укомплектованность укладок для забора материала, стерильного секционного набора, средств личной профилактики	20
Итого		100

8.7. Оценка состояния общей готовности медицинской службы (на территориальном, региональном уровне) к проведению противоэпидемических мероприятий при холере

Готовность учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и лечебно-профилактических учреждений, т. е. в целом медицинской службы территории, складывается из степени готовности отдельных подразделений, которая определяется методом экспертной оценки по 100-балльной шкале для каждого учреждения.

Наиболее удобно оценивать степень готовности, рассчитывая ее полуколичественным методом, используя формулу G. Astoldi, L. Verga

$$ПГ = \frac{3a + 4b + 5c}{N}, \text{ где}$$

ПГ — показатель готовности,

a — количество учреждений, набравших от 50 до 74 баллов;

b — количество учреждений, набравших от 75 до 80 баллов;

c – количество учреждений, набравших более 80 баллов;

N – число обследованных учреждений.

Показатель ниже 4,0 свидетельствует о неудовлетворительной готовности медицинской службы, при этом внимание в повышении готовности должно обращаться на учреждения, получившие менее 75 баллов.

Пример. Всего проверено 10 учреждений лечебно-профилактического профиля, а также органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, из них 3 получили более 80 баллов, 5 – от 75 до 80 баллов, а 2 – менее 75 баллов:

$$ПГ = \frac{3 \times 2 + 4 \times 5 + 5 \times 3}{10} = 4,1$$

Таким образом, показатель готовности территориальной медицинской службы равен 4,1, то есть готовность удовлетворительная.

Приведенная методика расчета позволяет оценить готовность к проведению противозидемических мероприятий в очагах холеры как отдельных учреждений, так и территории в целом.

Пример. Проверена готовность органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, к проведению мероприятий в очагах холеры, всего 21 учреждение. В результате проверки установлено, что готовность 10 из них по 100-балльной шкале превышает 80 баллов, в пяти – от 75 до 80 баллов, в шести менее – 75 баллов:

$$ПГ = \frac{3 \times 6 + 4 \times 5 + 5 \times 10}{21} = 4,2$$

Показатель готовности равен 4,2 – готовность удовлетворительная.

Методика количественной оценки может быть использована для комиссионной проверки и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и лечебно-профилактических служб, по итогам которой руководитель Управления Роспотребнадзора, главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и руководитель органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации объективно оценивают состояние готовности медицинской службы, в том числе структурных подразделений, к работе в очагах холеры и принимают обоснованное решение.

Схема
комплексного плана противохолерных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
1.1	Утвердить состав межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии	январь календарного года	Руководители органов исполнительной власти. Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
1.2	Определить и утвердить состав медицинского штаба	январь календарного года	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель органа управления здравоохранением
1.3	Обеспечить передачу информации в вышестоящие органы и учреждения о выявлении подозрительного больного. Составить и утвердить схему оповещения (в рабочее и нерабочее время) специалистов о выявлении больного холерой (вибриононосителя), выделении токсигенных и атоксигенных штаммов холерного вибриона из объектов окружающей среды в соответствии с действующими распорядительными документами	немедленно при выявлении больного, подозрительного на заболевание холерой, или выделении холерных вибрионов из объектов окружающей среды	Руководители управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений
1.4	Разработать (откорректировать) оперативные планы первичных противозидемических мероприятий на случай выявления больного холерой в лечебно-профилактических учреждениях, СКО, СКП, ПСКП	ежегодно	Руководитель лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
1.5	Определить медицинские учреждения для перепрофилирования на случай выявления больного холерой (вибрионосителя), обеспечить готовность госпитальной базы (инфекционный, провизорный госпитали, изолятор) и лабораторной базы (бактериологические лаборатории), провести их паспортизацию. Определить резерв кадров врачей-инфекционистов и среднего медицинского персонала с учетом мощности учреждений специального назначения	ежегодно	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
1.6	Определить резерв кадров врачей: эпидемиологов, бактериологов, лаборантов, помощников эпидемиологов и лаборантов	ежегодно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
1.7	Обеспечивать и осуществлять контроль противозидемической готовности лечебно-профилактических учреждений специального назначения, а также учреждений Роспотребнадзора	в соответствии с планом проверки готовности	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель противозидемического учреждения
1.8	Провести примерный расчет автотранспорта для работы в очаге холеры (прилож. 10)	1 раз в год	Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
1.9	Определить группы консультантов по организации и проведению противохолиерных мероприятий, клинике, лечению и диагностике, порядок их оповещения и сбора	1 раз в год	Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель противозидемического учреждения

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
1.10	Отработать порядок взаимодействия служб и ведомств, которые задействованы в выполнении комплекса противохолерных мероприятий	1 раз в год	Руководители всех служб и ведомств, включенных в комплексный план
1.11	Заслушивать на заседаниях межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии материалы по выполнению профилактических противохолерных мероприятий	ежегодно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель противочумного учреждения
2. ПОДГОТОВКА КАДРОВ			
2.1	Проводить теоретическую и практическую подготовку медицинских работников СКО, СКП, ПСКП в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации и медицинских пунктах железнодорожных, авиа-, авто-, морских и речных вокзалов; заместителей главных врачей лечебно-профилактических учреждений, заведующих врачебными участками и фельдшерско-акушерскими пунктами; врачей-инфекционистов, терапевтов и других специалистов, приписанных к стационарам специального назначения (инфекционный, провизорный госпитали, изолятор); врачей станций (пунктов) скорой медицинской помощи, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов; патологоанатомов патолого-анатомических отделений больниц и бюро судебно-медицинских экспертиз; медицинских работников психоневрологических стационаров, центров социальной реабилитации и других учреждений, заместителей руководителей управлений (отделов) Роспотребнадзора и главных врачей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», врачей эпидемиологов, бактериологов, дезинфекционистов	ежегодно	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель противочумного учреждения

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
2.2	Проводить теоретическую и практическую подготовку работников гражданской авиации, железнодорожного транспорта, речного и морского флота (бортпроводников, проводников, командиров экипажей, помощников капитанов, сотрудников контрольно-пропускных пунктов, таможи, управлений внутренних дел на транспорте и др.), УВД, туристических фирм, гостиниц, санаторно-курортных учреждений	ежегодно	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
2.3	Проводить тренировочные учения и практические занятия для всех категорий обучаемых с отработкой функциональных обязанностей и практических навыков на случай выявления больного с подозрением на холеру	ежегодно	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
3.1	Регулярно информировать территориальные отделы Роспотребнадзора о заболеваемости холерой за рубежом и на территории России	по мере поступления данных	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
3.2	Осуществлять мониторинг заводов холеры на административную территорию, заболеваемости холерой и выявления вибрионосителей, выделения холерных вибрионов O1/O139 серогрупп из объектов окружающей среды	ежегодно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель противочумного учреждения
3.3	Проводить бактериологическое обследование на холеру больных с диареей и рвотой при тяжелом течении болезни и выраженном обезвоживании; граждан России и иностранных граждан (с их согласия), заболевших острыми кишечными инфекциями в течение пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере стран, а также других контингентов, подлежащих обязательному обследованию на холеру при эпидемиологическом надзоре за холерой	в течение всего года	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
3.4	Проводить бактериологические исследования на холеру проб из поверхностных водоемов и других объектов окружающей среды согласно перечню стационарных точек отбора проб на административной территории	в соответствии с типом территории	Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель противочумного учреждения
3.5	Проводить паспортизацию точек отбора проб воды из поверхностных водоемов (прилож. 4)	апрель-май	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
3.6	Проводить оценку качества воды на соответствие санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов, систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения	постоянно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
3.7	Осуществлять контроль условий и режима обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных вод в поверхностные водоемы	постоянно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
3.8	Осуществлять контроль за санитарным состоянием административной территории, соблюдением санитарных норм и правил в местах торговли, отдыха, на железнодорожном и автовокзалах, морских, речных, аэропортах и других местах массового скопления людей, в пунктах приема беженцев и выезжающих переселенцев, принимать административные меры к устранению выявленных санитарных правонарушений	в течение всего периода	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
3.9	Проводить гигиеническое обучение и воспитание населения	ежегодно	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель органа управления здравоохранением

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
4. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ			
4.1	Обеспечить работу межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии и медицинского штаба по локализации и ликвидации очага холеры	при выявлении первого больного (вибриононосителя) холерой	Руководители органов исполнительной власти. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель противочумного учреждения
4.2	Решением межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, по представлению медицинского штаба, объявить статус очага холеры (завозной, местный) и его границы	при выявлении первого больного холерой	Начальник медицинского штаба
4.3	Разработать план оперативных противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага холеры	при выявлении первого больного холерой	Начальник медицинского штаба
4.4	Обеспечить организацию информационного обеспечения о выявлении больных (вибриононосителей) холерой, смертельных исходах от холеры и принятых первоочередных противоэпидемических мерах	немедленно	Начальник медицинского штаба
4.5	Обеспечить организацию и проведение бактериологических обследований больных холерой, вибриононосителей, контактировавших с ними, других контингентов населения, подлежащих обследованию при эпидемиологическом надзоре за холерой, а также по эпидпоказаниям	в период существования очага	Начальник медицинского штаба. Руководитель органа управления и главные врачи лечебно-профилактических учреждений специального назначения
4.6	Обеспечить организацию медицинского наблюдения за контактировавшими с больными (вибриононосителями) холерой, оставленными на дому, а также организацию подворных обходов для активного выявления больных ОКИ и находившихся в одинаковых условиях по риску инфицирования	в период существования очага	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений специального назначения

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
4.7	Привлечение консультантов для проведения противохолерных мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага	по показани- ям	Главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководители противочумных учреждений
4.8	Осуществлять комплекс противоэпидемических мероприятий в зависимости от токсигенности (эпидемической значимости) выделенных культур холерных вибрионов O1 и O139 серогрупп и с учетом эпидобстановки	в период существования очага	Начальник медицинского штаба
4.9	Обеспечить активное выявление и госпитализацию больных холерой, вибрионосителей, а также выявление и изоляцию контактировавших с ними	в период существования очага	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений
4.10	Обеспечить выявление умерших от неизвестных причин, патолого-анатомическое вскрытие трупа, взятие материала на лабораторное исследование на холеру с соблюдением правил транспортирования и захоронения	по показани- ям	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений
4.11	Обеспечить охрану холерного и провизорного госпиталей, изолятора, бактериологических лабораторий, патолого-анатомических отделений	в период существования очага	Руководитель органа управления и лечебно-профилактических учреждений
4.12	Обеспечить эпидемиологическое обследование каждого случая заболевания холерой или вибриононосительства	в период существования очага	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
4.13	Обеспечить проведение заключительной и профилактической дезинфекции в очаге	в период существования очага	Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Руководители учреждений дезинфекционного профиля

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
4.14	Осуществлять бактериологическое исследование на холеру проб из объектов окружающей среды с учетом стационарных точек отбора проб, а также определенных по эпидпоказаниям	в период существования очага	Главные врачи ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
4.15	Предусмотреть введение ограничительных мероприятий (карантина)	по показаниям	Руководитель органов исполнительной власти. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
4.16	Обеспечить проведение экстренной профилактики антибиотиками отдельных контингентов населения (по эпидпоказаниям)	по показаниям	Руководитель органа управления здравоохранением и главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
4.17	Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: <ul style="list-style-type: none"> • к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, организации питания, пищевым продуктам, содержанию территории городских и сельских поселений; • к организации рыночной и уличной торговли; • к функционированию железнодорожных вокзалов, пассажирских поездов, стоянок туристических поездов, аэровокзалов, речных, морских, и автодорожных вокзалов, а также объектов общественного питания на транспорте 	в период существования очага	Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора
4.18	Проводить работу по гигиеническому воспитанию и обучению населения мерам профилактики холеры и других острых кишечных инфекций с использованием всех форм и способов	в период существования очага	Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Продолжение прилож. 1

1	2	3	4
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА ХОЛЕРЫ			
5.1	Организовать диспансерное наблюдение за перенесшими холеру или вибрионоительство в соответствии с требованиями санитарных правил	в течение 3-х месяцев	Руководитель органа управления и главные врачи учреждений здравоохранения
5.2	Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение причин возникновения возможных эпидемиологических осложнений	после ликвидации очага	Руководитель органа управления здравоохранением. Руководитель управления (отдела) Роспотребнадзора. Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

Приложение 2
(обязательное)**Укладка для забора материала от больного с подозрением на холеру (для лечебно-профилактических учреждений специального назначения, станций скорой и неотложной медицинской помощи, поликлиник, врачебных амбулаторий, участковых больниц, СКП*, СКО*, ПСКП*)**

- | | |
|---|--------|
| 1. Банки стерильные широкогорлые с крышками или притертыми пробками, емкостью не менее 100 мл..... | 2 шт. |
| 2. Емкость эмалированная 10 л..... | 1 шт. |
| 3. Клеенка медицинская подкладная..... | 1 м |
| 4. Полиэтиленовые пакеты* | 5 шт. |
| 5. Марлевые салфетки | 5 шт. |
| 6. Направление на анализ (бланки) | 3 шт. |
| 7. Лейкопластырь | 1 уп. |
| 8. Карандаш простой | 1 шт. |
| 9. Карандаш по стеклу | 1 шт. |
| 10. Бикс (металлический контейнер) | 1 шт. |
| 11. Инструкция по забору материала | 1 шт. |
| 12. Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л 3 %-го раствора, и сухая хлорная известь в пакете из расчета 200 г на 1 кг выделений | 1 уп. |
| 13. Перчатки резиновые | 2 пары |
| 14. Контейнеры для испражнений 30 мл с ложкой, полипропиленовые | 2 шт. |
| 15. Пробирки для мазков с деревянными или алюминиевыми зондами, стерильные с добавлением транспортных сред или без них | 2 шт. |
| 16. Штатив на шесть гнезд | 1 шт. |
| 17. Пептонная вода 1 %-я во флаконах по 50 мл, закрытых резиновыми пробками или завальцованных металлическими колпачками | 4 шт. |

* В соответствии с приказом от 18.09.06 № 320 «О Регламенте оснащения санитарно-карантинных пунктов».

**Укладка для забора проб из объектов окружающей среды на холеру
(для ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»)**

1. Ящик тарный на 20 гнезд.....	1 шт.
2. Ящик металлический – укладка.....	1 шт.
3. Бутылки 0,5 л с ватно-марлевыми пробками и с пергаментными бумажными колпачками.....	20 шт.
4. Спирт 96°.....	100 мл
5. Вата.....	100 г
6. Карандаш по стеклу.....	2 шт.
7. Карандаш простой.....	1 шт.
8. Бумага писчая.....	10 листов
9. Направление на анализ (бланк).....	10 листов
10. Бумага копировальная.....	5 листов
11. Пинцет.....	1 шт.
12. Банка 0,5 л с матерчатыми салфетками (15 шт.) для обработки проб со сточными водами.....	1 шт.
13. Термометр до 50 °С.....	1 шт.
14. Бумага индикаторная для определения pH (1—12).....	1 упак.
15. Банка с притертой крышкой с ватными тампонами.....	1 шт.
16. Пробирки с тампонами для взятия смывов.....	20 шт.
17. Штатив на 20 гнезд.....	1 шт.
18. Батометр.....	1 шт.
19. Шпагат – мотки по 5, 10 и 30 м.....	45м
20. Хлорамин в пакетах по 30,0 г, рассчитанный на получение 1 л 3 %-го раствора.....	2 шт.
21. Емкость на 1 л для приготовления раствора хлорамина.....	1 шт.
22. Пакеты полиэтиленовые.....	5 шт.
23. Халат медицинский с шапочкой.....	2 шт.
24. Перчатки резиновые.....	2 пары
25. Фартук и нарукавники клеенчатые.....	1 шт.

П А С П О Р Т*

На стационарную точку № _____ отбора проб воды

_____ республика, область (край), район, населенный пункт

_____ тип (река, озеро, море, водохранилище) и наименование водосма

Место расположения точки отбора (основные ориентиры) _____

Обоснование выбора точки: обязательная, по санитарно-эпидемиологическим показаниям (нужное подчеркнуть, заполнить)

1. Характер водопользования в точке отбора:

- источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, зона санитарной охраны водозабора: _____

- использование для хозяйственно-бытовых целей (да, нет);
- водозабор для технического водопровода (для какого предприятия) _____

- массовый организованный и неорганизованный отдых (купание, рыболовство, водный спорт) _____

2. Санитарно-гигиенические условия:

- сброс сточных вод (хозяйственно-бытовых, промышленных, смешанных), подвергшихся очистке (биологической, механической) или без очистки;

- место сброса сточных вод:

- в точке отбора
- выше точки отбора (по течению реки) на _____ км;
- ниже точки отбора по течению реки на _____ км;
- на расстоянии _____ км от точки отбора (для стоячих водоемов);

- объем сбрасываемых сточных вод (по характеру их очистки) (м³ в сутки) _____

- наличие мусорных свалок:

- расстояние от водоема _____ км;
- от точки отбора _____ км;

- аварийные и неорганизованные стоки (где, какие, частота, объем) _____

3. Гидрологическая характеристика:

- глубина водоема в точке отбора (м) _____
- скорость течения (м/с) _____
- сгонно-нагонные явления (сезонность, частота) _____

- площадь озера (пруда) _____ га.

4. Результаты бактериологического исследования на холеру. Санитарно-микробиологические и физико-химические показатели воды водоема в точке отбора (в период отбора проб в соответствии с действующими СанПиН):

Показатели	Результаты и даты исследований за каждый год (по месяцам)				
	май	июнь	июль	август	сентябрь
Термотолерантные коли- формные бактерии					
Общие колиформные бактерии					
Колифаги					
Патогенная микрофлора (по видам)					
Шигеллы					
Сальмонеллы					
Холерные вибрионы O1/O139 серогрупп					
Холерные вибрионы не O1/не O139 серогрупп					
Температура воды					
pH					

* Заполняется врачом-эпидемиологом совместно с санитарными врачами и другими специалистами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Главный врач ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в субъекте, городе, районе

Подпись

Ф.,И.,О.

Заведующий отделом эпидемиологии
и паразитарных болезней

Подпись

Ф.,И.,О.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией

Подпись

Ф.,И.,О.

Дата составления

Дата корректировки

**Паспорт микробиологической
(бактериологической, особо опасных инфекций)
лаборатории для проведения исследований на холеру**

I. Общие сведения

Почтовый адрес лаборатории _____
 Ведомственная принадлежность _____
 Паспорт составлен « _____ » _____ 20__ г.
 Паспорт корректирован « _____ » _____ 20__ г.
 Производственная мощность лаборатории (количество анализов в сутки) _____
 В том числе на холеру от людей _____
 В том числе на холеру из объектов окружающей среды _____
 Планируемая мощность лаборатории при исследовании на холеру в сутки _____
 в том числе от людей _____
 в том числе из объектов окружающей среды _____

II. Характеристика лаборатории

Тип здания (типовой проект, приспособленное) _____
 Этаж _____
 Количество входов _____
 Общая площадь _____
 Полезная площадь _____
 Вентиляция (тип) _____
 Водоснабжение (тип) _____
 Канализация (тип) _____
 Отопление _____
 Освещение _____
 Газоснабжение _____
 Число помещений (всего) _____
 Набор помещений и их площади (перечислить)
 1. _____
 2. _____
 3. _____

и т. д.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на право работы с ПБА (№, дата получения) _____

План-схема лаборатории с указанием предназначения помещений, их площадей и потока движения заразного материала (прилагается).

План-схема перепрофилирования лаборатории для работы на холеру (прилагается)

III. Штаты лаборатории и приписной состав

№ п/п	Ф.,И.,О.	Должность	Квалификационная категория	Наличие сертификата специалиста	Откуда приписан (название учреждения)
1	2	3	4	5	

IV. Материально-техническое обеспечение лаборатории

Боксы биологической безопасности II класса (количество, марки) _____

Автоклавы (приложение 1) _____

Термостаты (приложение 2) _____

Иономеры, pH-метры (количество, марки, аттестация) _____

Холодильники (количество, марки) _____

Весы (количество, марки, аттестация) _____

Электроплиты (количество, марки) _____

Дистилляторы (количество, марки) _____

Сухожаровые шкафы (количество, марки) _____

Микроскопы (количество, марки) _____

Центрифуги (количество, марки) _____

Амплификаторы (количество) _____

Комплекты оборудования для проведения электрофореза (количество) _____

Комплекты оборудования для визуализации (количество) _____

Бактерицидные лампы (количество, марки) _____

Пипеточные дозаторы (количество) _____

Другое оборудование _____

**V. Необходимое материально-техническое обеспечение лаборатории,
в том числе на случай перепрофилирования**

№ п/п	Вид и наименование имущества	Количество		Источник получения недостающего имущества при перепрофилировании				
		тре- бует- ся	име- ется	из ре- зерва	из других лабора- торий	из тор- гующих органи- заций	из других источ- ников	основа- ние
1	Автоклавы							
2	Термостаты							
3	Защитная одежда							
4	Лабораторная посуда							
5	Питательные среды							
6	Диагностические препараты							
7	Антибиотики							
8	Дезинфицирующие средства							
9	Другое оборудование							

VI. Транспорт

№ п/п	Вид транспорта	Откуда выделяется (наименование учреждения)	Назначение транспорта	Основание
1	2	3	4	5

Приложение 1

Характеристика автоклавов

Общее количество	№ п/п	Марка	Год выпуска	Гидравлические испытан- ия (дата, год)
1	2	3	4	5

Приложение 2

Характеристика термостатов

Общее количество	№ п/п	Марка	Год выпуска	Аттестация (дата, год)
1	2	3	4	5

Подписи

Главный врач (наименование учреждения) подпись Ф.,И.,О.

Зав. лабораторией подпись Ф.,И.,О.

Формирование лабораторной базы очага холеры

№ п/п	Наименование учреждения	Виды выполняемых исследований*	Производственная мощность**	Наименование стационаров (групп направивших пробы)	Обеспечение кадрами								
					врачи			лаборанты			младший медперсонал		
					расчетное количество	наличие	требуется дополнительно	расчетное количество	наличие	требуется дополнительно	расчетное количество	наличие	требуется дополнительно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Примечание.

* 1. Анализы на холеру: от больных и вибрионосителей, от контактировавших с больными и вибрионосителями, от населения на вибрионосительство, объекты окружающей среды. 2. Идентификация культур холерных вибрионов. 3. Серологические исследования на холеру больных, переболевших, других контингентов. 4. Контроль питательных сред. 5. Анализы на другие кишечные инфекции.

** Расчет производственной мощности и потребности в кадрах производится в соответствии с разделами 6.2 и 6.3 настоящих МУ. Объем исследований на другие кишечные инфекции не входит в расчет производственной мощности и определяется дополнительно.

Приложение 7
(рекомендуемое)

**Нормы расхода диагностических препаратов и
питательных сред на один анализ при исследовании на холеру**

Наименование	Ед. измерения	Нормы расхода при исследовании			
		с выделением культуры		без выделения культуры	
		1*	2*	1*	2*
1	2	3	4	5	6
Сыворотка диагностическая холерная О1	мл	0,1	0,1	0,05	0,1
Сыворотка диагностическая холерная Огава	мл	0,1	0,1	—	—
Сыворотка диагностическая холерная Инаба	мл	0,1	0,1	—	—
Сыворотка диагностическая холерная РО	мл	0,1	0,1	0,05	0,01
Сыворотка диагностическая холерная О139 для РА на стекле	мл	0,2	0,2	0,1	0,1
Бактериофаги холерные диагностические: • классические • эльтор	мл	0,1 0,1	0,1 0,1	— —	— —
Иммуноглобулины холерные диагностические люминесцирующие	мл	0,05	0,05	—	—
Бактериофаги диагностические холерные ТЭПВ 1—7	мл	по 0,05 каждого	по 0,05 каждого		
Холерные фаги ctx^+ и ctx^-	мл	по 0,1	по 0,1		
Питательные среды					
Агар питательный щелочной: • сухой • готовый	г мл	3,0 150,0	3,0 150,0	2,5 120,0	2,5 120,0
Среда элективная диагностическая для выделения холерного вибриона сухая (СЭДХ)	г	0,5	0,5	0,5	0,5
Питательная среда для определения чувствительности к антибиотикам	г	25,0	25,0	—	—
		на одно определение			
Пептон: • сухой • основной (10 %-й раствор)	г мл	1,2 12,0	1,2 120,0	1,2 12,0	1,2 120,0
Бульон питательный pH 7,0—7,2	мл	10,0	10,0	—	—

Продолжение прилож. 7

1	2	3	4	5	6
Углеводы, аминокислоты					
Углеводы:					
сахароза	г	0,2	0,2	—	—
манноза	г	0,2	0,2	—	—
арабиноза	г	0,2	0,2	—	—
маннит	г	0,2	0,2	—	—
лактоза	г	0,2	0,2	—	—
инозит	г	0,2	0,2	—	—
дульцит	г	0,2	0,2	—	—
салицин	г	0,2	0,2	—	—
крахмал	г	0,2	0,2	—	—
глюкоза	г	0,5	0,5	—	—
Аминокислоты:					
лизин	г	0,02	0,05	—	—
орнитин	г	0,02	0,05	—	—
аргинин	г	0,02	0,05	—	—
Теллурид калия	мл	0,01	0,015	0,01	0,015
Примечание: 1* – от людей; 2* – из объектов окружающей среды.					

**Табель
оснащения лаборатории мощностью 200, 500 и 1 000 анализов
на холеру в сутки (продолжительность работы 30 дней)**

№ п/п	Наименование	Ед. изме- рения	Мощность лабора- тории (анализов)		
			200	500	1 000
1	2	3	4	5	6
I. Оборудование					
1	Автоклав вертикальный электрический	шт.	1	2	3
2	Автоклав горизонтальный	"	1	1	2
3	Аппарат для инактивирования сыворотки	"	1	1	1
4	Бикс металлический разного размера	"	7	10	20
5	Баллончик резиновый № 0 или 1	"	7	10	15
6	Весы технические (до 1 кг) с разновесами	"	1	1	1
7	Весы аптечные с разновесами	"	1	1	1
8	Гидропулт	"	1	1	1
9	Дистиллятор электрический переносной ДП-3	"	1	1	1
10	Иглы к шприцам разные	"	50	50	50
11	Зажим для резиновых трубок пружинящий	"	3	5	10
12	Лабораторный pH-метр	"	1	1	1
13	Корипанг	"	3	3	3
14	Лампы запасные для МЛД	"	1	2	2
15	Лула ручная 1 × 10, 1 × 2,5	"	2	3	5
16	Микроскоп МБР-1	"	2	3	5
17	Микроскоп (лула) с устройством для косого освещения	"	1	1	1
18	Микроскоп люминесцентный МЛД-1 или МЛД-2	"	1	1	1
19	Ножницы	"	3	3	3
20	Осветители к микроскопам ОИ-19	"	3	3	3
21	Насос водоструйный	"	1	1	1
22	Облучатель бактерицидный настенный	"	1	2	3
23	Термостатирующее устройство	"	1	1	2
24	Петледержатели	"	6	8	15
25	Петли бактериологические диаметром 0,3—0,5 мм	"	10	20	30

Продолжение прилож. 8

1	2	3	4	5	6
26	Петли алюминиевые для забора материала	шт.	600	1 500	3 000
27	Пинцет анатомический	"	5	5	5
28	Пластины асбестовые к фильтрам Зейтца 30 мм	"	15	20	50
29	Пипетки автоматические	"	3	5	5
30	Пробки резиновые разного размера	кг	1,5	3	5
31	Пробки корковые разного размера	"	0,3	0,5	0,5
32	Пластины полистироловые для РНГА	шт.	10	15	30
33	Сушильный шкаф стерилизационный 2В-151	"	1	2	3
34	Стерилизатор электрический разных размеров	"	2	2	2
35	Стерилизационная коробка 39,5 × 19,5	"	2	2	2
36	Стандарт мутности для приготовления микробной взвеси № 10 и 5	"	по 1	по 2	по 2
37	Скальпель	"	5	5	5
38	Термометр химический на 200—250 °С	"	2	2	2
39	Термометр химический на 100 °С	"	2	2	2
40	Термостат электрический	"	1	2	3
41	Термометр медицин. максимальный	"	5	5	5
42	Устройство фазово-контрастное	"	1	1	2
43	Фильтры Зейтца 30 мм с устройством для фильтрации	"	2	2	3
44	Холодильник бытовой, емк. 220 л	"	1	2	3
45	Центрифуга лабораторная настольная ЦПН-2	"	1	1	1
46	Часы песочные	"	1	1	2
47	Штатив большой на 40—60 гнезд	"	15	30	50
48	"- на 10—20 гнезд	"	5	5	5
49	"- Буизена	"	1	1	1
50	Шпатель металлический	"	5	5	5
51	"- деревянный	пачка	1	2	3
II. Стекло лабораторное					
1	Ампула емк. 1—2 мл	шт.	500	1 000	1 000
2	Банка материальная белого стекла с притертой пробкой на 250,0 мл	"	8	10	12
3	Банка материальная белого стекла с притертой пробкой на 500,0 мл	"	5	5	7
4	"- на 100,0 мл	"	10	10	10
5	Банка материальная, емк. 2—3 л	шт.	5	5	7
6	Бутыль, емк. 1 л	"	150	350	700

Продолжение прилож. 8

1	2	3	4	5	6
7	Бутыл, емк. 3 л	"	5	1	5
8	Бутыл, емк. 3 л с нижним тубусом	"	1	0,1	2
9	Бусы стеклянные	кг	0,1	0,1	0,1
10	Бюретки градуированные, емк. 25—20 мл	шт.	2	2	2
11	Воронки химические разных размеров	"	2	2	2
12	Колба конич. плоскодонная, емк. 100 мл	"	10	10	10
13	-"- 250 мл	"	10	10	10
14	-"- 500 мл	"	10	10	10
15	-"- 1 000 мл	"	5	5	5
16	Кристаллизатор или эмалированная миска	"	5	5	10
17	Мензурка градуированная разной емкости	"	3	3	3
18	Мембранные фильтры № 2, 3, 4, 5	"	400	400	400
19	Пипетки градуированные на 1 мл	"	300	500	700
20	-"- 2 мл	"	50	70	100
21	-"- 5 мл	"	50	70	100
22	-"- 10 мл	"	15	30	50
23	-"- 0,1 мл	"	3	5	5
24	Пипетка пастеровская	"	2 000	2 000	2 000
25	Пробирки бактериологические 12 × 120 с ватно-марлевыми пробками	"	2 000	5 000	10 000
26	Пробирки агит. с ватно-марлевыми пробками	"	100	200	400
27	Поплавки	кг	0,2	0,3	0,5
28	Пробирки центрифужные	шт.	10	20	30
29	Стекло предметное	"	400	1 000	2 000
30	Стекло с луночкой	"	5	5	5
31	Стекло покровное	кор.	5	10	20
32	Стаканы фарфоровые или граненые	шт.	10	15	20
33	Ступки фарфоровые с пестиком разных размеров	"	5	7	10
34	Спиртовки	"	4	6	10
35	Флаконы 100,0 мл с ватно-марлевыми пробками	"	600	1 500	3 000
36	Флаконы 200,0 мл	"	50	100	150
37	Флаконы 500,0 мл	"	30	50	100
38	Цилиндр мерный	"	2	2	2
39	Чашки Петри для выращивания бактериальных культур	"	2 000	5 000	10 000
40	Шприцы 1,0; 2,0; 5,0	"	5	7	10
41	Шприцы-дозаторы	"	5	10	10

1	2	3	4	5	6
III. Питательные среды, краски, реактивы					
Среды					
1	Агар-агар	кг	0,3	0,7	1,5
2	Агар щелочной сухой	"	20	50	70
3	Питательная среда для определения чувствительности к антибиотикам	"	1	1,5	2
4	Бульон мясопептонный	л	4	10	20
5	Среда элективная диагностическая для выделения холерного вибриона сухая – СЭДХ	кг	5	10	20
6	Пептон основной сухой	"	42	105	210
7	Пептон сухой	"	0,25	0,5	1
8	Углеводы и спирты: манноза	г	5	10	20
	арабиноза	"	5	10	20
	сахароза	"	50	125	250
	манит	"	5	10	20
	инозит	"	1	2	5
	глюкоза	"	50	100	200
	лактоза	"	20	50	100
	салицин	"	1	2	5
	дульцит	"	1	2	5
9	Системы индикаторные бумажные для идентификации микроорганизмов: • № 1 – для вибрионов • № 2 – межродовой дифференциации энтеробактерий	набор	2	5	10
			1	2	2
10	Микротест-система для биохимической идентификации вибрионов (МТС-V)	набор	2	5	10
11	Микротест-система для ускоренного определения групп вибрионов по Хейбергу (МТС-X)	"	1	2	2
12	Эритроциты барана отмытые	мл	5	10	10
13	Эритроциты куриные отмытые	"	5	10	10
14	Физиологический раствор	л	готовится на месте		
Реактивы, краски					
15	Бромтимоловый синий	г	3	5	5
16	Бумага лакмусовая красная	"	20	50	100
17	-"-" синяя	"	20	50	100
18	Генцианвиолет	"	10	25	50
19	Глицерин	кг	2	3	5

Продолжение прилож. 8

1	2	3	4	5	6
20	Диметил-парафенилендиамин дигидрохлорид или тетраметил-парафенилендиамин дигидрохлорид, или аминодиметил-анилин гидрохлорид (оксалат)	г	2	5	10
21	Иод кристаллический	г	5	10	20
22	Калий фосфорно-кислый двузамещенный (K_2HPO_4)	"	1	3	5
23	Калий фосфорно-кислый однозамещенный (KH_2PO_4)	"	5	10	20
24	Калий азотно-кислый	"	5	10	20
25	Калий едкий	"	30	100	150
26	Крахмал растворимый	"	10	25	50
27	Калий йодистый	"	3	5	10
28	Кислота щавелевая	мл	50	100	100
29	Кислота соляная	"	50	100	100
30	Кислота серная	"	50	100	100
31	Лизин	г	1	2,5	5
32	Орнитин	"	1	2,5	5
33	Аргинин	"	1	2,5	5
34	Масло иммерсионное	г	50	100	150
35	Масло иммерсионное нефлуоресцирующее	"	10	30	50
36	Диметилфталат	фл.	1	1	1
37	Натрий хлористый	г	600	1 500	3 000
38	Натрий едкий	"	50	100	150
39	Натрий углекислый	"	50	125	250
40	Натрий двууглекислый	"	300	500	1 000
41	Натрий серноватисто-кислый	"	50	100	200
42	Натрий лимонно-кислый	"	50	100	200
43	α -нафтол	"	15	35	70
44	Свинец уксусно-кислый	"	10	20	50
45	Тимоловый синий	"	3	5	5
46	Теллурид калия	"	5	15	30
47	Фуксин основной Цзя	мл	20	50	100
48	Фуксин кислый	"	10	30	50
49	Фуксин по Синеву	лист	300	750	1 500
50	Феноловый красный	г	0,05	0,01	0,2
51	Хлороформ	фл.	5	5	5
52	Диметилсульфоксид (ДМСО)	"	2	2	2

1	2	3	4	5	6
IV. Диагностические препараты					
1	Диагностикум холерный О1 иммуноглобулиновый суспензионный (эритроцитарный или полимерный)	кор.	1	1	2
2	Комплемент сухой	амп.	100	250	500
3	Бактериофаги холерные диагностические классический и эльтор	мл	10	25	50
4	Бактериофаги диагностические холерные ТЭПВ 1—7 (типизирующие энтеропатогенные вибрионы)	кор.	1	1	1
5	Бактериофаги диагностические холерные эльтор ctx ⁺ и ctx ⁻	"	1	1	1
6	Сыворотка агглютинирующая холерная «О»	мл	25	50	100
7	Сыворотка агглютинирующая холерная «Инаба»	"	20	40	75
8	Сыворотка агглютинирующая холерная «Огава»	"	20	40	75
9	Сыворотка агглютинирующая холерная «RO»	"	5	20	40
10	Сыворотка агглютинирующая холерная O139	"	5	10	20
11	Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие холерные O1	"	10	50	100
12	Сыворотка кроличья нормальная	"	40	100	200
13	Ген-Хол Тест-система для выявления ДНК V. Cholerae (ctx A ⁺) методом ПЦР	набор	1	1	2
V. Медикаменты и дезинфицирующие средства					
Антибактериальные препараты для определения антибиотикограммы возбудителя					
1	Доксициклин	капс.	10	10	10
2	Тетрациклин	табл.	20	20	20
3	Левомецетин	"	10	10	10
4	Налидиксовая кислота	капс.	5	5	5
5	Ципрофлоксацин	табл.	5	5	5
6	Фуразолидон	"	10	10	10
7	Ампициллин	фл.	20	20	20
8	Цефотаксим	"	1	1	2
9	Рифампицин	капс.	5	5	5
10	Стрептомицин	фл.	2	2	2
11	Гентамицин	"	2	2	2

Продолжение прилож. 8

1	2	3	4	5	6
12	Канамицин	"	2	2	2
13	Сульфаметоксазол/триметоприм или сульфамонетоксин/триметоприм	табл.	10	10	10
14	Полимиксин «М» или «В»	табл.	10	10	10
Растворители для антибактериальных препаратов					
15	Димексид (диметилсульфоксид, ДМСО)	фл.	2	2	2
16	Едкий калий (КОН)	табл.	10	10	10
Для экстренной профилактики на случай аварии необходимо предусмотреть: доксициклин, левомецетин, ципрофлоксацин, фуразолидон, канамицин (таблетки), сульфаметоксазол/триметоприм или сульфамонетоксин/триметоприм по количеству работающих в лаборатории.					
Прочие медикаменты, дезинфицирующие средства					
1	Вазелин	г	50	50	50
2	Вазелиновое масло	"	300	750	1 500
3	Спирт ректификат	л	75	150	300
4	Спирт нашатырный	"	2	3	5
5	Хлорамины	"	20	30	50
6	Хлорная известь	"	10	15	15
7	Хлорофос	"	3	3	3
VI. Оборудование для ПЦР диагностики					
1	Автоматический ридер (флюориметр)	шт.	1	1	1
2	Видеосистема результатов электрофореза	шт.	1	1	1
3	Источник постоянного тока	шт.	2	2	2
4	Компьютер Pentium	шт.	1	1	1
5	Комплект для проведения электрофореза	шт.	1	1	1
6	Программируемый термодиклер (амплификатор)	шт.	2	2	2
7	Пробирки пропиленовые Эпиндорф 0,6 мл	шт.	4 000	4 000	4 000
8	Пробирки пропиленовые Эпиндорф 1,5 мл	шт.	4 000	4 000	4 000
9	Твердотельный термостат	шт.	1	1	1
10	Ультрафиолетовый трансиллюминатор 310—320 нм фильтр 20 × 20 см	шт.	1	1	1
11	Фотоаппарат цифровой с комплектом свето-фильтров	шт.	1	1	1
12	Центрифуга лабораторная настольная	шт.	1	1	1
13	Микроцентрифуга лабораторная настольная 1200g	шт.	1	1	1

1	2	3	4	5	6
VII. Хозяйственное оборудование					
1	Бумага фильтровальная	кг	5	7	15
2	Бумага писчая	"	2	3	5
3	Бумага папиросная или полупергамент	"	3	5	10
4	Бумага оберточная	"	20	30	50
5	Бачки металлические для автоклавов	шт.	5	7	10
6	Вата гигроскопическая белая	кг	30	40	60
7	Ведро оцинкованное	шт.	3	3	3
8	Ведро эмалированное с крышками	"	5	7	10
9	Ёрш для мытья посуды	"	15	20	30
10	Веревка бельевая	кг	5	5	5
11	Воронка металлическая	шт.	1	1	1
12	Калоши глубокие	пар	5	5	5
13	Журналы канцелярские	шт.	5	7	10
14	Кипятильник электрический	"	2	3	5
15	Карандаш по стеклу	кор.	3	5	10
16	Карандаши канцелярские	шт.	15	20	30
17	Клеенка подкладная	м	20	30	50
18	Кюветы эмалированные разного размера	шт.	3	3	5
19	Кастриולי эмалированные на 10 л	"	3	5	10
20	Кастриולי эмалированные на 20 л	"	2	2	3
21	Кастриולי алюминиевые на 30 л	"	1	1	2
22	Керосин	л	10	10	10
23	Корыто оцинкованное	шт.	1	1	1
24	Кружка эмалированная	"	2	2	2
25	Канистра на 20 л	"	2	2	2
26	Косынки или шапочки медицинские	"	50	110	170
27	Лампы электрические	"	5	10	10
28	Лампы электрические настольные	"	3	3	3
29	Лампы керосиновые	"	2	5	5
30	Лампа паяльная	"	1	1	1
31	Линейка канцелярская	"	1	1	1
32	Лейкопластырь	упак.	5	8	10
33	Марля	м	40	60	100
34	Моющие средства: «Прогресс»	л	1	3	5
	-"- порошки	кг	2	5	10

Продолжение прилож. 8

1	2	3	4	5	6
35	Мешок тарный	шт.	5	5	5
36	Миска эмалированная	"	6	8	10
37	Мыло хозяйственное	кус.	20	30	60
38	Мыло туалетное	"	20	30	45
39	Мешковина	м	15	20	25
40	Нитки суровые в бабинах	шт.	5	8	10
41	Носки	пар	50	110	170
42	Нарукавники	"	2	4	6
43	Перчатки хирургические	"	30	50	70
44	Перчатки анатомические	"	20	30	50
45	Полотенца	шт.	30	50	75
46	Простыни	"	3	3	3
47	Пижама	"	50	110	170
48	Плитка электрическая	"	2	3	5
49	Прищепки бельевые	"	50	50	50
50	Пластин	пал.	10	10	10
51	Печать металлическая	шт.	1	1	1
52	Пеналы для пипеток	"	5	15	10
53	Пеналы для 10 чашек	"	60	125	125
54	Свечи стеариновые	"	10	10	20
55	Стеклограф	"	7	10	20
56	Таз эмалированный	"	3	5	8
57	Тальк	г	750	1 000	1 500
58	Тапочки	пар	25	55	90
59	Трубка резиновая диаметром 0,5 см	кг	0,7	1	1,5
60	Учетные формы в соответствии с инструкцией				
61	Фартук клеенчатый	шт.	2	4	6
62	Халат медицинский	"	50	110	170
63	Шпагат	кг	5	5	5

**Паспорт госпиталя для больных холерой
(провизорного госпиталя, изолятора)**

область (край, республика) _____ район _____
 Наименование населенного пункта, где развернут госпиталь _____

Составлен « ____ » _____ 200__ г.

Корректирован « ____ » _____ 200__ г.

1. Количество коек в развертываемом стационаре _____
2. База развертывания (больница, школа, гостиница и т. п.) _____
3. Основание (решение органа управления здравоохранением или органа местного самоуправления).
4. Помещения, выделяемые для развертывания холерного госпиталя (провизорного госпиталя, изолятора):

№ п/п	Предназначение помещения		№ помещения	Площадь (м ²)	Количество коек (для палат)
	обычное	при развертывании холерного госпиталя (провизорного госпиталя, изолятора)			
1	2	3	4	5	6

5. План-схема развертывания холерного госпиталя (провизорного госпиталя, изолятора) – помещения и территория (прилагается).
6. План перевода больных в другие медицинские учреждения (прилагается).
7. Штаты медицинского персонала холерного госпиталя (провизорного госпиталя, изолятора)

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество	Специальность	Откуда выделяется
1	2	3	4	5

8. Материально-техническое и коммунально-бытовое обеспечение.

8.1. Материально-техническое обеспечение

№ п/п	Вид и наименование имущества	Количество		Источник получения недостающего имущества				
		требуется	имеется в наличии	из резерва	из других лечебных учреждений	из торгующих организаций	из предприятий и учреждений	основание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Постельное белье _____

Мебель _____

Холодильники _____

Предметы ухода за больным и т. д. _____

8.2. Коммунально-бытовое обеспечение

№ п/п	Вид обеспечения	Кто и как обеспечивает, в каком объеме		Основание
		в обычных условиях	при развертывании спец. стационара	
1	2	3	4	5

Водоснабжение _____

Отопление _____

Энергоснабжение _____

Канализование _____

Стирка белья _____

Организация питания больных _____

9. Транспорт

№ п/п	Вид транспорта	Откуда выделяется (наименование учреждения)	Назначение транспорта (перевозка больных, для хозяйственных нужд и т. д.)	Основание
1	2	3	4	5

9.1. Место и условия обработки транспорта (наличие площадки, кто проводит) _____

10. Медицинское имущество и средства лечения

№ п/п	Перечень имущества и средств лечения	Количество		Источники получения недостающего количества						
		требуется	фактически имеется	текущее довольствие лечеб. учезд.	неснижаемый запас учреждения	из резерва	из местных аптек	из других ведомств	прочие источники	основание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный врач медицинского учреждения,
на базе которого планируется развертывание
холерного госпиталя (провизорного, изолятора)
Ф.,И.,О.

Подпись

Главный санитарный врач
в городе, районе
Ф.,И.,О.

Подпись

Паспорт составлен:
Должность
Ф.,И.,О.

Подпись

Дата корректировки
Занимаемая должность
Ф.,И.,О.

Подпись

Расчет автотранспорта для работы в очаге холеры

№ п/п	Марка авто-транспорта	Имеющийся в наличии авто-транспорт	Необходимое количество автотранспорта на предполагаемое количество больных	Наименование организаций, выделяющих дополнительный автотранспорт	Количество и марка выделяемого автотранспорта	Подпись руководителя учреждения, выделяющего автотранспорт
1	Для перевозки больных					
2	Для перевозки контактных					
3	Для обслуживания групп эпидобследования, очаговой дезинфекции, контроля противэпидемического режима					
4	Для обслуживания патолого-анатомической группы (захоронение)					

Примечание: для расчета количества транспорта используются примерные данные: одна машина в ... час может вывезти одного больного.

**Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка
противоэпидемической готовности медицинских учреждений к
проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры**

**Методические указания
МУ 3.1.1.2232—07**

Редакторы Н. Е. Аكوпова, Н. В. Кожока
Технический редактор Е. В. Ломанова

Подписано в печать 27.02.08

Формат 60х88/16

Тираж 500 экз.

Печ. л. 4,0
Заказ 11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18/20

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом информационно-издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а
Отделение реализации, тел./факс 952-50-89