



СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

**СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 4251-83**

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДРОЖЖЕЙ
И ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ**

Цена 3 коп.

1985

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 апреля 1984 г. № 1440 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4251—83 «Пищевые продукты. Метод определения количества дрожжей и плесневых грибов» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.07.85

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 4251—83
	ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ Метод определения количества дрожжей и плесневых грибов	Взамен РС 4869—75 и РС 4870—75
Группа Н09		

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на высеве определенного количества продукта или его разведений в селективную агаризованную среду, культивировании посевов при (24 ± 1) °C в течение 5 d, подсчете всех видимых колоний дрожжей и плесневых грибов, типичных по макро- и (или) микроскопической морфологии.

2. ПРОБЫ

2.1. Пробы отбирают и подготавливают к анализу по СТ СЭВ 3013—81 и СТ СЭВ 3014—81.

2.2. Масса (объем) навески, предназначенной для приготовления разведения, должна составлять не менее (10 ± 1) g (cm^3), а предназначенной для непосредственного высева в питательные среды — не менее 1 g (cm^3).

3. АППАРАТУРА

Для проведения анализа применяют аппаратуру по СТ СЭВ 3014—81 со следующим дополнением:

- 1) микроскоп;
- 2) термостат на (24 ± 1) °C;
- 3) чашки бактериологические с внутренним диаметром (90 ± 2) или (100 ± 2) mm;
- 4) пипетки вместимостью 1 и 10 cm^3 ;
- 5) стекла предметные;
- 6) петли бактериологические;
- 7) фильтры мембранные со средним диаметром пор 0,5—0,8 μm ;
- 8) палочки стеклянные с загнутым концом.

Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству
в области стандартизации
Дрезден, декабрь 1983 г.

4. РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ

4.1. Для проведения анализа применяют:

- 1) дрожжевой экстракт в порошке сухой;
- 2) глюкозу;
- 3) агар;
- 4) сусло солодовое неохмеленное или виноградное, с массовой долей сухих веществ 7—8%;
- 5) кислоту лимонную, 20%-ный водный раствор;

6) бенгальскую красную, 0,15%-ный раствор; готовят следующим образом: 0,15 г бенгальской красной растворяют в 100 см³ дистиллированной воды и стерилизуют в течение 15 min при температуре (121±1) °C. Стерильный раствор хранят в герметически закрытом сосуде не более двух недель при температуре (4±1) °C;

7) основу для агаризованных питательных сред с антибиотиками; готовят следующим образом: 5 g дрожжевого экстракта, 20 g глюкозы, 20 g агара добавляют к 1000 см³ дистиллированной воды. Смесь подогревают, периодически помешивая, до расплавления составных частей, охлаждают до 45—55 °C, устанавливают pH таким образом, чтобы после стерилизации он составлял при 25 °C 6,5±0,1, стерилизуют в течение 15 min при (121±1) °C. Основу среды хранят при температуре (4±1) °C не более 14 d;

8) среду агаризованную с хлортетрациклином и хлорамфениколом; готовят следующим образом: к 950 см³ расплавленной и охлажденной до 45—47 °C основы добавляют по 25 см³ свежеприготовленных и стерилизованных путем мембранный фильтрации растворов хлорамфеникола и хлортетрациклина;

9) среду агаризованную с окситетрациклином; готовят следующим образом: к 900 см³ расплавленной и охлажденной до 45—47°C основы добавляют 100 см³ свежеприготовленного и стерилизованного путем мембранный фильтрации раствора окситетрациклина;

10) среду агаризованную с хлорамфениколом; готовят следующим образом: к 975 см³ расплавленной и охлажденной до 45—47°C основы добавляют 25 см³ свежеприготовленного и стерилизованного путем мембранный фильтрации раствора хлорамфеникола (допускается хлорамфеникол стерилизовать вместе с основой в течение 15 min при (121±1) °C);

11) среду агаризованную с окситетрациклином и гентамицином, готовят следующим образом: перед применением к 1000 см³ расплавленной и охлажденной до 45—47°C основы добавляют 100 см³ раствора окситетрациклина и 10 см³ раствора гентамицина свежеприготовленных и стерилизованных путем мембранный фильтрации.

Среды с антибиотиками хранению не подлежат. В случае необходимости для ингибирования развития воздушного мицелия плесневых грибов, к среде с антибиотиками добавляют раствор

красной бенгальской так, чтобы ее окончательная концентрация была 150 mg на 1000 см³ готовой среды;

12) солодовое неохмеленное сусло; готовят следующим образом: к 1000 см³ водопроводной воды, подогретой до (50±1) °C, прибавляют 200 g молотого ячменного солода. Смесь тщательно перемешивают в течение 30 min, подогревают на водяной бане со скоростью 1 °C в min до (55±1) °C, выдерживают паузу 15 min, затем вновь с той же скоростью поднимают температуру до 63—65 °C идерживают ее на этом уровне в течение 1 h. Температуру поднимают со скоростью 1 °C в 1 min до (72±1) °C и выдерживают сусло при этой температуре до полного осахаривания. Степень осахаривания сусла проверяют раствором Люголя. Для этого каплю сусла переносят в фарфоровую чашку и осторожно прибавляют к нему каплю раствора Люголя. Окончательно осахаренное сусло не должно менять окраску в присутствии индикатора. Полученное сусло фильтруют через полотно или фильтровальную бумагу, доливают до 1000 см³ и стерилизуют 30 min в автоклаве при 107—110 °C. Затем сусло декантируют. Прозрачное сусло разбавляют водой до получения раствора с массовой долей сухих веществ 7—8%, разливают в стерильную посуду, стерилизуют в течение 20 min при (116±1) °C. Солодовое сусло можно заменить виноградным суслом, доводя массовую долю сухих веществ в растворе до 7—8%;

13) сусло солодовое агаризованное; готовят следующим образом: к 1000 см³ солодового неохмеленного или виноградного сусла с массовой долей сухих веществ 7—8% прибавляют 20 g агара. Среду нагревают на водяной бане до полного расплавления агара и фильтруют через гигроскопическую вату или фильтровальную бумагу. Фильтрат разливают в стерильные колбы или пробирки и стерилизуют в течение 15—20 min при (116±1) °C. Охлаждают до (45—55) °C и устанавливают pH 3,6±0,1, добавляя 2—3 см³ стерильного 20%-ного раствора лимонной кислоты. Готовую среду хранят в холодильнике при температуре (4±1) °C не более 7d;

14) гентамицин, 0,5%-ный водный раствор;

15) окситетрациклин, основание или гидрохлорид, 0,1%-ный водный раствор;

16) хлортетрациклин, гидрохлорид, 0,4%-ный водный раствор;

17) хлорамфеникол (левомектицин), 0,4%-ный водный раствор.

4.2. Для приготовления растворов антибиотиков, перечисленных в позициях 14, 15, 16, 17, используют дистиллированную или бидистиллированную воду с pH от 6,8 до 7,0.

4.3. Перед применением растворы антибиотиков, перечисленных в позициях 14, 15, 16, 17, стерилизуют методом мембранный фильтрации.

Стерильные растворы антибиотиков для инъекций допускается использовать без предварительной мембранный фильтрации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

5.1. Из навески продукта готовят исходное и ряд десятикратных разведений до такой степени, чтобы можно было определить предполагаемое количество дрожжей и плесневых грибов в 1 g (cm^3) исследуемого продукта.

5.2. Высевают по 1 cm^3 продукта и (или) его соответствующих разведений параллельно в две стерильные чашки Петри. В каждую чашку Петри, содержащую инокулум, добавляют не позднее чем через 15 min (14 ± 1) cm^3 агаризованной среды, охлажденной до (45 ± 1) °C. Среду немедленно тщательно перемешивают и оставляют для застывания.

5.3. Для ориентировочных исследований пищевых продуктов допускается посев на поверхность плотных питательных сред по СТ СЭВ 3015—81, п. 2.4.

5.4. Для пищевых продуктов, в которых предполагают содержание небольшого количества дрожжей, допускается использовать метод мембранный фильтрации по СТ СЭВ 3015—81, п. 2.6.

5.5. При разногласии в оценке качества продукта используют агаризованную среду с хлорамфениколом и (или) хлорамфениколом и хлортетрациклином. Инокуляция проводится глубинным методом по п. 5.2.

5.6. После застывания сред посевы инкубируют крышкой вверх при (24 ± 1) °C в течение 5 d. Через 3 d инкубирования проводят предварительный учет типичных колоний, а через 5 d — окончательный, наблюдая за ростом дрожжей и плесневых грибов визуально, а при необходимости и микроскопически (методом нативной микроскопии).

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

6.1. Результат оценивают по каждой пробе отдельно.

6.2. Для подсчета отбирают чашки с посевами, где выросло от 15 до 150 колоний дрожжей и (или) от 5 до 50 колоний плесневых грибов.

6.3. Результаты обрабатывают, пересчитывают и записывают в соответствии с СТ СЭВ 3015—81 отдельно для дрожжей и плесневых грибов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — Делегация НРБ и ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области пищевой промышленности.
2. Темы 20.010.09—81 и 20.010.10—81.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Июль 1986 г.	
ВНР	Июль 1986 г.	—
СРВ		
ГДР	Июль 1985 г.	Июль 1985 г.
Республика Куба	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.
МНР		
ПНР		
СРР	Январь 1985 г.	—
СССР	Июль 1985 г.	
ЧССР	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.

5. Срок проверки — 1988 г.

Сдано в наб. 29.01.85 Подп. в печ. 25.03.85 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,32 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 168